



ФГБУ «ВИМС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-БЮЛЛЕТЕНЬ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРР
И ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ ПИ**

**ЧЕРНЫЕ (Fe, Cr, Mn, Ti, CaF₂ и др.),
ЦВЕТНЫЕ (Cu, Mo, W, Sn, Al и др.),
НЕРУДНЫЕ (графит, кремнезем, уголь и др.)
РАДИОАКТИВНЫЕ (U, Th)
РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ (Zr, Nb-Ta, Be, Li и др.)**

№ 356

сентябрь 2026г.

Редактор-составитель: В.В. Коротков

СОДЕРЖАНИЕ:

Сырье	РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	Стр
Cu Au	1. HOT CHILI LIMITED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ LA VERDE Cu-Au В РЕГИОНЕ АТАКАМА, ЧИЛИ.....	4
VMS	2. SUN PEAK METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ SAFRA VMS В САУДОВСКОЙ АРАВИИ.....	4
PGE	3. NI-CO ENERGY INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ PGE КРЕМЕР В КВЕБЕКЕ.	6
Ti	4. EUREKA METALS CORP - ВЫЯВИЛА ПЯТЬ НОВЫХ М-НИЙ ТИТАНА НА ПРОЕКТЕ ТАЙИ В КВЕБЕКЕ.....	7
Cu Mo	5. KODIAK COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ MRD В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.....	9
Ni Cu	6. PERSEVERANCE METALS INC. – ОБНАРУЖЕНА NI-CU СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩАЯ УЛЬТРАМАФИТОВАЯ ИНТРУЗИЯ НА ПРОЕКТЕ VOYAGEUR, МИЧИГАН США.....	9
Cu	7. SUPER COPPER CORP. - ПРИСТУПАЕТ К ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ МЕТОДАМИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ CASTILLA, ЧИЛИ.....	10
PGE	8. VISIONARY METALS CORP. - ГРП НА ПРОЕКТЕ PGE KING SOLOMON В ВАЙОМИНГЕ.	11
Cu	9. OSISKO METALS INCORPORATED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ GASPÉ COPPER В РУДНОМ РАЙОНЕ КОППЕР-МАУНТИН, ВОСТОЧНЫЙ КВЕБЕК.....	12
Cu Ti	10. GREEN BRIDGE METALS CORPORATION – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ТИТАС (CU, TI, V) В РАЙОНЕ САУТ, МИННЕСОТА.....	13
Cu	11. OROCO RESOURCE CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ МЕДНОГО ПРОЕКТА САНТО-ТОМАС, ШТАТ СИНАЛОА, МЕКСИКА.....	13
Cu Au	12. PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ И ЭСКАЛИБУР НА СЕВЕРЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ....	14
PGE	13. FATHOM NICKEL INC. - ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА Ni-Cu-Co ГОЧАГЕР, САСКАЧЕВАН.....	15
Cu Au	14. ALGO GRANDE COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ ADELITA, В СЕРРО-ГРАНДЕ, МЕКСИКА.....	16
Sb	15. ANTIMONY RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА СУРЬМЯНОМ ПРОЕКТЕ БОЛД-ХИЛЛ В НЬЮ-БРАНСУИКЕ, КАНАДА.....	17
W	16. GUARDIAN METAL RESOURCES PLC - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ PILOT MOUNTAIN В НЕВАДЕ.....	18
Cu Au	17. GOLDEN SKY MINERALS CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА МЕДЬ НА УЧАСТКЕ МОУИЧ В РАМКАХ ПРОЕКТА РЭЙФИЛД-ГЪОЛЛ НА ЮГЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.....	19
PGE	18. BRAVO MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА PGM НА ПРОЕКТЕ В ЛУАНГЕ В ПРОВИНЦИИ КАРАХАС, БРАЗИЛИЯ.....	21
Cu	19. GETTY COPPER INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ УЧАСТКЕ GETTY SOUTH ПРОЕКТА GETTY В ОКРУГЕ ХАЙЛЕНД-ВЭЛЛИ В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.....	22
Cu	20. EDGE COPPER - РЕЗУЛЬТАТЫ ОКСИДНОГО БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ZONIA В АРИЗОНЕ.....	23
VMS	21. FIREWEED METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ VMS В РАМКАХ ПРОЕКТА МАКПАСС, ЮКОН, КАНАДА.....	23
Cu Au	22. GLADIATOR METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА Cu-Au ПРОЕКТЕ CUB EAST В УАЙТХОРСЕ, ЮКОН.....	24
Cu Mo	23. СЗ METALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ КХАЛИСИ, ПЕРУ.....	25
VMS	24. SILVER ACADIA EXPLORATION INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS НИКОЛАС-ДЕНИ В НЬЮ-БРАНСУИКЕ, КАНАДА.....	27
Cu Mo	25. FORGE RESOURCES CORP - ВЫЯВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО ПОРФИРОВЫХ ЦЕНТРОВ НА ПРОЕКТЕ АЛОТТЕ, РУДНЫЙ ПОЯС ДОУСОН-РЕЙНДЖ, ЮКОН.....	27
W	26. GOLDHAVEN RESOURCES CORP. - ДОБЫВАЕТ ВОЛЬФРАМ В РАМКАХ ПРОЕКТА МАГНО, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.....	28
Cu Mo	27. SANKAMAR METALS INC. – БУРЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ КУМА, НА СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВАХ.....	29
Cu Mo	28. HERCULES METALS - ПРОДВИГАЕТ ПРОЕКТ НООК В АЙДАХО ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОРФИРА.....	31
Cu Au	29. ATEX RESOURCES - ОБНАРУЖИВАЕТ НОВУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ В2В НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ ВАЛЕРИАНО В ВАЛЬПАРАИСО, ЧИЛИ.....	32
Cu	30. STERLING METALS CORP. - РАСШИРЯЕТ МЕДНУЮ ЗОНУ ПРОЕКТА CORE MEPS, ОНТАРИО.....	33
Fe	31. HIGH TIDE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА LABRADOR WEST IRON PROJECT.....	34
	НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
H	32. QUEBEC INNOVATIVE MATERIALS CORP - ПРОВОДИТ 2D-СЕЙСМОРАЗВЕДКУ НА ПРИРОДНЫЙ ВОДОРОД В КВЕБЕКЕ И НОВОЙ ШОТЛАНДИИ.....	35

Mn	33.	UNION POWER METALS - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МАРГАНЦЕВОМ ПРОЕКТЕ МИХАЛОВА, СЛОВАКИЯ.....	35
		РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
RZM	34.	APEX CRITICAL METALS CORP. РАСШИРЯЕТ ЗОНУ TRINITY НА ПРОЕКТЕ RIFT ПО ДОБЫЧЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ НЕБРАСКЕ.....	36
U	35.	ATHA ENERGY CORP. - О РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ АНГИЛАК В НУНАВУТЕ.....	36
U	36.	ISOENERGY LTD. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ LAROCQUE EAST (м-ние ХАРРИКЕЙН), АТАБАСКА.....	37
U	37.	TERRA BALCANICA RESOURCES CORP. - ВЫЯВИЛА РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ НАД ОЗЕРОМ ШАРЛО-НИЛИ В САСКАЧЕВАНЕ.....	38
U V	38.	DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ MOBILEMT, НА УЧАСТКАХ ÖSTERKÄLEN И MALGOMAJ ПРОЕКТА ALUM SHALE В ШВЕЦИИ.....	39
U	39.	PUREPOINT URANIUM GROUP INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ DORADO NOVA TARGET БАСЕЙН АТАБАСКА, ПРОВИНЦИЯ САСКАЧЕВАН, КАНАДА.....	40
U	40.	MYRIAD URANIUM CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА COPPER MOUNTAIN URANIUM PROJECT В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШТАТА ВАЙОМИНГ.....	41
RZM	41.	IMC RARE EARTHS LTD - ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИИ ТЕРБИЯ НА ПРОЕКТЕ ITARANTIM В БРАЗИЛИИ.....	42
RZm	42.	MEDARO MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ РЗЭ BASTNAS, ШВЕЦИЯ...	42
Nb	43.	STEADRIGHT CRITICAL MINERALS – ГРП НА ПРОЕКТЕ РЗЭ-НИОБИЕВОГО КАРБОНАТИТА ПЕРИБОНКА, КВЕБЕК.....	44
Ga	44.	ATLANTICO ENERGY METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ГАЛЛИЙ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ПРОЕКТЕ NOVO CRUZEIRO В БРАЗИЛЬСКОЙ ЛИТИЕВОЙ ДОЛИНЕ.....	44
RZM	45.	GREENLAND MINES LTD - РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ VTM СКЕРГААРД и RZM САРФАРТОК В ГРЕНЛАНДИИ.....	45
U	46.	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЗАЯВЛЯЕТ О НАХОДКЕ 110 МЛН Т УРАНОСОДЕРЖАЮЩЕЙ РУДЫ.....	46
U	47.	АВСТРАЛИЙСКИЕ УРАНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ - ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К ШАХТАМ В НАМИБИИ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.....	46
RZM	48.	VOLTA METALS LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЕКТЕ SPRINGER, ОНТАРИО, КАНАДА.....	47
Nb	49.	AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА НИОБИЙ НА ПРОЕКТЕ БАРДИ В КВЕБЕКЕ.....	48

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

НОТ CHILI LIMITED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ LA VERDE Cu-Au В РЕГИОНЕ АТАКАМА, ЧИЛИ.

8 сентября 2026 г.

Три высококачественных пересечения на небольшой глубине стали результатом последнего бурения на Ла-Верде, что подтверждает непрерывность широких минерализованных зон по всему проекту (рис. 1).




Рис. 1 Расположение Ла-Верде по отношению к Коста-Фуэго, прибрежный хребт Чили (а); карта Ла-Верде с результатами бурения (б) и поперечные разрезы с результатами буровых скважин (в).

Дальнейшие ГРР включают (но не обязательно ограничиваются) программой алмазного бурения с целью расширения минерализованной зоны на проекте Ла-Верде.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

SUN PEAK METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ SAFRA VMS В САУДОВСКОЙ АРАВИИ.

8 сентября 2026 г.

Проект «Сафра» занимает площадь 93 км² в перспективном поясе формации Вакиф Аравийско-Нубийского щита (рис. 1).




Рис. 1 Схема расположения проектов Sun Peak.

В ходе картирования, отбора проб и бурения на участке «Сафра Мейн» были выявлены многочисленные субпараллельные зоны минерализации, связанные с формацией Вакиф, в том числе две зоны госсана и измененных пород размером 600 x 40 м и 200 x 20 м.

Все семь скважин, пробуренных на Сафра-Мейн, вскрыли минерализованные интервалы с вкраплениями сульфидов или массивными сульфидами, что подтверждает, что минерализованная система, выявленная на поверхности, продолжается под землей и остается открытой на глубине и по простираению.

На проекте были протестированы совпадающие геологические, геохимические и геофизические объекты, выявленные в ходе картирования и отбора проб с поверхности, проходки траншей, гравиметрической съемки и съемки методом TDEM. В трех скважинах на Сафра-Саут, расположенном в 1,5 км к югу от Сафра-Мейн, были протестированы проводящие объекты, выявленные методом TDEM. Значительная часть минерализованных участков, геофизических объектов и их глубинных частей остаются не изученными. Результаты показывают, что комплексный подход Sun Peak, сочетающий геологическое картирование и интерпретацию с наземной гравиметрией и наземной электроразведкой во временной области (Time Domain Electromagnetics, TDEM), позволяет успешно разрабатывать геологические модели и определять цели для бурения, повышая уверенность компании в реализации многочисленных дополнительных проектов в Саудовской Аравии.

Основная зона Safra остается открытой для расширения как на север к цели Safra North, так и на юг вдоль простирания, а также в глубину (рис. 2).




Рис. 2 Карты целей Safra с гравиметрическими данными и точками бурения (а), результаты бурения в целевой зоне Safra (б) и поперечные разрезы скважин (в).

Важно отметить, что дополнительные гравитационные аномалии, включая Северную Сафру, возникают вдоль прогнозируемого простираия минерализованной системы, обеспечивая убедительные цели для последующих ГРП и бурения. Эти аномалии подчеркивают потенциальную возможность расширения основной минерализованной системы Сафра за пределы, проверенные бурением на сегодняшний день, и/или возникновения дополнительных зон сульфидной минерализации вдоль более широкого перспективного тренда.

Восточная зона Сафра, параллельный тренд VMS, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от основной зоны, до сих пор не исследован с помощью бурения. Образцы госсанитовых эксхалатов, связанные с VMS, собранные в этой зоне, содержат до 1,38% меди, а в других образцах содержание меди составляет 1,08% и 0,22%. Важно отметить, что поверхностная минерализация пространственно связана с сильной гравитационной аномалией, что делает ее

привлекательным геохимическим и геофизическим объектом. Сочетание богатой медью минерализации в стиле VMS на поверхности и гравитационного поля, залегающего под ней, делает участок Сафра-Ист приоритетным объектом для будущих буровых испытаний и открывает возможности для дальнейших исследований за пределами уже пробуренной основной зоны Сафра.

Ранее проведенный отбор проб с поверхности показал содержание до 6,72% меди, 19,05% цинка, 9,89% свинца, 3,34 г/т золота и 864 г/т серебра. В результате вскрышных работ было извлечено 22,5 м породы со средним содержанием 0,20% меди, 1,21% цинка, 1,83% свинца, 0,90 г/т золота и 35,6 г/т серебра, в том числе 1,5 м породы со средним содержанием 0,32% меди, 1,62% цинка, 11,7% свинца, 8,23 г/т золота и 118 г/т серебра.

Программа бурения обеспечила прочную геологическую основу для последующих ГРП, а также позволила выявить значительные участки с минерализацией, геофизические цели и глубину залегания минерализованных зон для проведения дополнительных исследований.

При бурении был вскрыт сложный комплекс кислых и основных вулканических пород и интрузий, в том числе диоритовые дайки и повторяющиеся интервалы доломитов. Альтерации характеризуются переменным окремнением и карбонатным изменением, локально развиты хлорит, эпидот и гематит. Ассоциация доломитов, измененных диоритов и вулканических пород с сульфидной минерализацией связывает особенности, выявленные при вскрытии поверхности, с минерализованной системой, обнаруженной при бурении.

Сульфидная минерализация варьируется от вкрапленных сульфидов и сульфидов, связанных с трещинами, до более развитых зон и местами полумассивных сульфидов. Минерализация состоит в основном из халькопирита, сфалерита и пирита с обычным магнетитом и местами пирротинном. В нескольких скважинах также были обнаружены более широкие зоны вкрапленной и связанной с трещинами халькопирит-пирит-магнетитовой минерализации.

Sun Peak сопоставляет результаты анализа с данными геологического каротажа, структурной интерпретации, геохимии поверхности, гравиметрии и TDEM, чтобы уточнить геологическую модель м-ния Сафра и определить приоритетность дальнейшего бурения. В рамках запланированных работ будет проведена оценка распространения минерализованных зон по простиранию и на глубину в районе Сафра-Мейн, а также в районах Норт, Саут и Ист.

Sun Peak Metals Corp - портфель активов расположен на Аравийско-Нубийском щите — перспективном докембрийском рудном поясе, где находятся многочисленные золотоносные системы, связанные с вулканогенно-осадочными, интрузивными и орогенными процессами, в том числе м-ния Джабаль-Сайид и Мансура в Саудовской Аравии, а также рудник Биша и проекты в Асмэре в Эритрее. Стратегия ГРП компании направлена на систематическое продвижение проектов от регионального выявления перспективных участков до бурения.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

NI-CO ENERGY INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ PGE КРЕМЕР В КВЕБЕКЕ.

8 сентября 2026 г.

Проект «Кремер» представляет собой систему сульфидной минерализации, содержащей никель, медь и кобальт, расположенную в анортозите Морин, вблизи его контакта с грэнвилльскими метаосадочными породами. ГРП, проведенные на участке «Кремер-1», подтвердили наличие сульфидов, содержащих никель, медь и кобальт, при бурении и на поверхности.

Программа бурения в зоне протяженностью 7500 м на выявленных электромагнитных проводниках и детальное бурение участков, которые считаются наиболее перспективными. Первые скважины будут пробурены в проводниках TDEM в районах, где на поверхности также наблюдались массивные сульфидные зоны и где присутствуют магнитные и гравитационные аномалии. На большинстве скважин планируется провести скважинные электромагнитные исследования (СЭМИ).

На пр-нии Кремер-1 также будет проведено бурение с близким интервалом между скважинами, чтобы точнее определить истинную ширину, геометрию и непрерывность минерализованных зон.

Участок «Кремер-2», расположенный к юго-востоку от «Кремер-1», до начала текущей программы никогда не подвергался бурению. Приоритетность этого района определялась сочетанием нескольких факторов: подтвержденной анализом сульфидной минерализацией на нескольких участках на поверхности, электромагнитными проводниками, а также магнитными и гравиметрическими аномалиями. В рамках программы будет протестирована часть перспективного геолого-геофизического коридора протяженностью около 8 км.

После завершения этой программы предстоит оценить несколько проводников, ответвлений и участков, в том числе пр-ние Кремер-3 (рис. 1).




Рис. 1 Карта перспективного коридора 8 км, участки Кремер-1, Кремер-2 и Кремер-3, оси TDEM и места отбора проб с поверхности.

Первоначальное дистанционное зондирование с помощью TDEM, выполненное с борта вертолета, охватило коридор в масштабе проекта. Детальные наземные TDEM-исследования, гравиметрическая и магнитная съемки с помощью дронов, завершенные в 2024 и начале 2025 года на участках, которые тогда назывались «Кремер-1» и «Кремер-2», также охватывают юго-восточную часть, которая теперь называется «Кремер-3». Участок «Кремер-3» остается непроверенным и изучен в меньшей степени, чем «Кремер-2».

Комплексные геолого-геофизические работы позволили определить перспективный коридор протяженностью около 8 км, содержащий несколько отдельных электромагнитных проводников, а также магнитные и гравитационные аномалии. Медно-никелево-кобальтовая минерализация была подтверждена бурением на участке Кремер-1 и отбором проб на нескольких участках Кремер-2.

Ni-Co Energy Inc. — компания, специализирующаяся на геологоразведке в Квебеке, которая развивает никелево-медно-кобальтовый проект Кремер

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

EUREKA METALS CORP - ВЫЯВИЛА ПЯТЬ НОВЫХ М-НИЙ ТИТАНА НА ПРОЕКТЕ ТАЙИ В КВЕБЕКЕ.

8 сентября 2026 г.

В рамках программы ГРП было обнаружено пять новых м-ний титана с содержанием более 35% TiO_2 , что существенно увеличило количество объектов с высоким содержанием титана на Тайи. Результаты анализа показали содержание 36,87% TiO_2 , при этом в девяти образцах, отобранных содержание TiO_2 превысило 35%.

Как показано на рисунке 1, в рамках программы ГРП были получены высококачественные результаты по нескольким направлениям проекта, что расширило распределение известных м-ний высококачественного титана на Тайи.




Рис. 1 План проекта Тайи и пробоотбор горных пород.

В девяти образцах было обнаружено более 35% TiO₂, при этом содержание варьировалось от 35,13% до 36,87% TiO₂. В девяти образцах с содержанием более 35% TiO₂ также было обнаружено одинаковое содержание ванадия — от 0,26% до 0,30% V₂O₅.

Пять новых м-ний расширяют ареал распространения высококачественной титановой минерализации за пределы основных участков, выявленных в ходе предыдущих исследований на м-ниях Биг-Тио, NS Trend и Ист-Наггет.

Eureka сравнивает новые м-ния с недавно завершенным аэромагнитно-электромагнитно-низкочастотным исследованием с высоким разрешением протяженностью 2300 погонных км, чтобы определить приоритетные участки для дальнейших исследований.

Была выявлена высококачественная титановая минерализация в нескольких основных районах, в том числе в Биг-Тио, НС-Тренд и Ист-Наггет. Результаты показывают, что титановая минерализация встречается не только в этих ранее выявленных районах.

Проект Тайи расположен в анортозитном комплексе Гавр-Сен-Пьер на северном побережье Квебека, в районе залежей железо-титановых оксидов. Согласно геологическим исследованиям озера Тио, содержание титана в нем обычно составляет от 32% до 38% TiO₂. Этот региональный контекст свидетельствует о высоком содержании титана в ильменитовой минерализации анортозитового комплекса Гавр-Сен-Пьер и дает представление о результатах анализа титансодержащего минерала Тайи до 36,87% TiO₂.

«Лак Тио» — это действующий горнодобывающий проект, а «Тайи» — проект на ранней стадии ГРП. Наличие минерализации в «Лак Тио» не обязательно указывает на наличие минерализации в «Тайи». Компания не подтвердила наличие минеральных ресурсов в «Тайи», а ГРП были проведены в недостаточном объеме, чтобы определить непрерывность, размеры, тоннаж, минералогию, металлургические характеристики или экономический потенциал минерализации в рамках проекта.

Компания Eureka недавно завершила аэромагнитную съемку с высоким разрешением и низкочастотную электромагнитную съемку на Тайи протяженностью 2,3 тыс погонных км с шагом 50 м.

В настоящее время компания сравнивает расположение новых м-ний титана с результатами аэрогеофизических исследований, чтобы определить приоритетные участки для дальнейших ГРП. В ходе этой работы будет установлено, соответствуют ли вновь обнаруженные м-ния на поверхности геофизическим объектам, и это поможет определить, на каких участках компании Eureka следует сосредоточить усилия на следующем этапе ГРП.

Eureka Metals Corp. — владеет проектом Thio Titanium в Квебеке, перспективного с точки зрения обнаружения титано-ванадий-скандиевой минерализации

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

KODIAK COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ MPD В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

9 сентября 2026 г.

Проект представляет собой приповерхностную щелочную медно-порфировую золотоносную систему, выявленную с помощью геофизических методов (аэромагнитной съемки и метода индуцированной поляризации), геологических исследований, отбора проб горных пород и бурения. Текущее бурение нацелено на участки, входящие в оценку минеральных ресурсов ("MRE") и прилегающие к ним, для расширения блоковой модели.

Ниже представлены результаты бурения восьми скважин общей протяженностью 1665 м на пр-нии Кетчан (рис. 1).




Рис. 1 Проект MPD - карта местоположения и залежи полезных ископаемых.

Эти результаты бурения подтверждают наличие высокосортной минерализации на пр-нии Кетчан и позволяют его улучшить и расширить. Ожидается, что все обнаруженные минерализованные интервалы внесут вклад в рост запасов (рис. 2).




Рис. 2 План (а) и Разрез (б) скважин на пр-нии Кетчан.

Все семь месторождений, включенных в оценку минеральных ресурсов, открыты для расширения, и результаты программы бурения будут учтены в обновленной оценке MRE,

Kodiak Copper Corp. - сосредоточена на развитии медно-золотого порфирового проекта MPD в рудном районе Квеснел в южно-центральной части Британской Колумбии, MPD обладает всеми признаками крупного многоцентрового порфирового района

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

PERSEVERANCE METALS INC. – ОБНАРУЖЕНА NI-CU СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩАЯ УЛЬТРАМАФИТОВАЯ ИНТРУЗИЯ НА ПРОЕКТЕ VOYAGEUR, МИЧИГАН США.

9 сентября 2026 г.

Четыре скважины были пробурены для проверки геофизической цели, три из которых пересекли мафическо-ультрамафическую интрузию по составу аналогичную интрузии, в которой расположен медно-никелевый рудник Eagle.

Ультрамафическая интрузия, по составу аналогичная интрузиям, в которых расположены медно-никелевый рудник Игл (Мичиган) и медно-никелевое месторождение Тамарак

(Миннесота), пересечена в нескольких скважинах на участке Оспри. Обнаружена слепая залежь магматических сульфидов, содержащих никель и медь.

Предварительные результаты бурения свидетельствуют в пользу программы дальнейших ГРП для выявления и определения участков интрузии, содержащих массивные сульфиды. Интрузия мощностью 50 м и состоит из трех фаз, включая базальную, крупнозернистый перидотит, локально содержащий 3-8% магматических сульфидов, как промежуточных, так и в виде халькопирит-пирротинсульфидных вкраплений и глобул (рис. 1).




Рис. 1 Геологическая и инфраструктурные карты Верхнего п-ва Мичиган и С-В Миннесоты, территории проекта Voyageur (красный).

Подтверждена никелевая и медная минерализация — на ранних этапах ГРП. Были обнаружены рассеянные и шаровидные магматические сульфиды, в том числе халькопирит, пирротин и, возможно, пентландит. На первом участке бурения пробурено четыре скважины. Наличие этих магматических сульфидов, содержащих никель и медь, подтверждает продуктивность интрузии и ее способность генерировать и вмещать медно-никелевые м-ния.

***Perseverance Metals** — портфель ее проектов стратегически расположен в ключевых североамериканских регионах добычи никеля, меди, кобальта, платиноидов и лития в твердых породах, в том числе в рудном районе Джеймс-Бей в Квебеке и в продуктивном Среднеконтинентальном разломе в Мичигане.*

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

SUPER COPPER CORP. - ПРИСТУПАЕТ К ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ МЕТОДАМИ ИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ CASTILLA, ЧИЛИ.

8 сентября 2026 г.

Программа IP была разработана после того, как компания недавно завершила магнитную и гиперспектральную съемку с помощью дронов на проекте, в ходе которой были выявлены многочисленные зоны изменений в масштабе нескольких километров, магнитные тела и ряд кварц-магнетит-медных жильных систем на поверхности. Следующий шаг — это IP: она напрямую связана с содержанием сульфидов в жилах и их потенциальным источником и призвана помочь определить цели для бурения на проекте.

Двенадцать IP-линий, протяженностью 22 линейных км, проложенных над шестью приоритетными целевыми участками с залежами в жилах по всему проекту.

Глубоко проникающая полосно-дипольная антенная решетка с использованием 50-м диполей, разнесенных на расстояние до 20 единиц ($n = \text{от } 1 \text{ до } 20$), обеспечивает разрешение относительно узких, круто падающих жильных структур при визуализации более крупных тел минерализации на глубине.

Испытание градиентной антенной решетки запланировано над первым целевым участком с залежами, чтобы сравнить результаты с антенной решеткой «полюс-диполь». Если градиентная антенная решетка окажется эффективной, она позволит быстрее и с меньшими затратами обследовать дополнительные системы залежей.

Полностью интегрированная с существующими наборами данных, инвертированная в 2D модель удельной электропроводности и удельного сопротивления будет объединена с 3D-

моделью инверсии магнитного вектора (MVI), гиперспектральным картированием изменений и поверхностным отбором проб для ранжирования перспективных участков.

На первом этапе геофизических исследований получили данные о структуре проекта Кастилья, о телах км масштаба, которые соответствуют модели IOCG, которую тестируют. Следующий этап геофизических исследований, IP, — это инструмент, который позволяет определить, какие из жильных систем, которые исследовали на поверхности, связаны с потенциальной сульфидной минерализацией на глубине. Проводятся исследования сразу на шести целевых участках, чтобы приступить к первой программе бурения на Кастилья с ранжированными, геофизически обоснованными целями.

Программа включает в себя двенадцать линий, каждая длиной от 1,8 до 1,9 км, ориентированных перпендикулярно преобладающим жильным структурам и сгруппированных в шести целевых районах, выявленных в ходе программ отбора образцов горных пород, а также в ходе магнитной съёмки с помощью дронов. Количество и длина строк могут быть изменены в ходе опроса в зависимости от его результатов.

В исследовании используется полосково-дипольная конфигурация во временной области с расстоянием между диполями 50 м, увеличенным до 20 раз, что обеспечивает эффективную глубину исследования порядка нескольких сотен метров. Данные будут получены с помощью передатчика GDD мощностью 5,0 кВт и 10-канального приемника ElRec Pro. Рельеф на исследуемой территории умеренный, доступ возможен к большинству целевых участков, а состояние грунта, как ожидается, будет благоприятным для проведения интрузивных сейсмических исследований.

Результаты будут включать в себя псевдорезрезы по кажущемуся удельной электропроводности и удельной поляризуемости, двумерные инвертированные разрезы по удельной электропроводности и удельной поляризуемости для каждой линии, трехмерную воксельную модель инвертированных разрезов и планы на выбранных глубинах. Инвертированные данные будут интегрированы с моделью MVI и гиперспектральными данными о нарушениях, чтобы сформировать сводный рейтинг перспективных участков для Castilla.

Super Copper Corp. — горнодобывающая геологоразведочная компания, специализирующаяся на приобретении, развитии и консолидации мировых медных активов — от ранних стадий до поздней разработки. В настоящее время компания развивает свои медные проекты в Атакаме, Чили

<https://www.canadianminingjournal.com/press-release>

VISIONARY METALS CORP. - ГРП НА ПРОЕКТЕ PGE KING SOLOMON В ВАЙОМИНГЕ.

10 сентября 2026 г.

Начались работы по алмазному бурению и наземной электромагнитной съёмке с фиксированной петлёй во временной области (FLTEM). Visionary планирует провести бурение скважин и дополнительные наземные исследования методом FLTEM, чтобы проверить возможность распространения предполагаемой массивной сульфидной минерализации.

Наземная электроразведка методом поперечных волн и электроразведка в скважинах будут снова проведены компанией Dias Geophysical в соответствии с результатами ранних исследований. Смоделированные пластины дискретны и соответствуют проводящим магматическим сульфидам; однако аномалии проводимости носят лишь индикативный характер, могут иметь несколько источников и не гарантируют наличие промышленных залежей.

Visionary Metals Corp. — развивает два проекта добыче никеля и медных сульфидов на территории площадью 40 км² в Гранитных горах штата Вайоминг;

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

OSISKO METALS INCORPORATED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ GASPE COPPER В РУДНОМ РАЙОНЕ КОППЕР-МАУНТИН, ВОСТОЧНЫЙ КВЕБЕК.

10 сентября 2026 г.

Новые результаты - 28 минерализованных интервалов из 12 пробуренных скважин. Интервалы, заполненные «инфилдом», расположены в пределах модели MRE, направленной на повышение категории предполагаемых минеральных ресурсов до категории измеренных или выявленных, в зависимости от ситуации. «Расширительные» интервалы расположены за пределами модели и включают в себя либо 1) расширение в пределах карьера, что дает возможность превратить отходы в дополнительные ресурсы в пределах карьера Уиттл, согласно модели MRE, либо 2) расширение за пределами карьера, состоящее из минерализации, расположенной за пределами карьера Уиттл, что потенциально может привести к открытию новых ресурсов. Некоторые из указанных интервалов могут включать в себя как более мелкое заполнение, так и более глубокое расширение (обозначено как «и то, и другое») (рис. 1).




Рис. 1 План (а) и разрез (б) результатов бурения на проекте Gaspe.

Медно-порфировая/скарновая минерализация на Гаспе представлена вкраплениями и жилами халькопирита с пиритом или пирротинном, а также борнитом и молибденитом. На Коппер-Маунтин были обнаружены одна прямая и как минимум пять обратных жильных/вкрапленных минерализаций, которые перекрывают более раннюю пластообразную карбонатно-сменную скарновую минерализацию и минерализацию в порцелланитах по всей системе Гаспе. Порцелланит — исторический горнодобывающий термин, использовавшийся для описания выветренных, от бледно-зелёных до белых калиевых роговиков. В районе Коппер-Маунтин преобладает субвертикальная штоковая минерализация, в то время как в районе нижней части Коппер-Маунтин, Нидл-Маунтин, Нидл-Ист и Коппер-Брук преобладает горизонтальная минерализация, в основном стратиграфически обусловленная. В скарнах зон С и Е вдали от Коппер-Маунтин были обнаружены м-ния с высоким содержанием молибдена (до 0,5% Mo).

Программы бурения Osisko Metals были направлены на определение ресурсов для открытых разработок в пределах медно-колчеданной минерализации. Расширение ресурсной модели к югу от Коппер-Маунтин на плохо изученную часть системы, состоящую из скарнов и порцелланитов, впоследствии привело к значительному увеличению запасов, в основном в категории предполагаемых, а дополнительное бурение привело к ещё одному значительному увеличению запасов, в основном в категориях измеренных и предполагаемых.

Текущая программа бурения направлена на перевод большей части предполагаемых ресурсов в категории Measured и Indicated, а также на проверку возможности расширения общей ресурсной базы в западном направлении и на юг/юго-запад в сторону Иглы-Ист и Иглы-Маунтин соответственно.

Osisko Metals Incorporated — осваивает медный проект Гаспе на полуострове Гаспе в Квебеке.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GREEN BRIDGE METALS CORPORATION – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ТИТАС (CU, TI, V) В РАЙОНЕ САУТ, МИННЕСОТА.

10 сентября 2026 г.

На участке Титак-Саут на глубине 195 м были обнаружены 0,25% Cu и 10,18% TiO₂, в том числе на глубине 62,0 м — 0,29% Cu и 10,54% TiO₂. Керн пересек юго-западную часть минерализованной зоны с юго-востока на северо-запад и подтвердил наличие минерализации (рис. 1).




Рис. 1 а. - Схема проекта Титак, б. - Геофизические объекты (красные многоугольники), программа бурения справа, слева — смоделированное м-ние меди, снизу - региональная 3D-модель инверсии данных VTEM.

Результаты подтверждают эффективность 3D-инверсионного моделирования VTEM в качестве инструмента определения местоположения ультрамафитовых интрузий оксида на объекте, при этом 5 из 8 идентифицированных объектов остаются непроверенными и доступными для будущих программ бурения.

Скважина, пробуренная на ранее не исследовавшемся геофизическом участке, дала 12 м породы с содержанием 0,20% Cu, 8,33% TiO₂, 0,15% V₂O₅, пересекая минерализацию, связанную с геофизической аномалией.

Была протестирована ранее не исследованная геофизическая аномалия, выявленная с помощью трехмерного инверсионного моделирования методом вертикального электрического зондирования. Скважина пересекла минерализацию меди и диоксида титана, связанную с ультраосновным интрузивным комплексом. Вмещающая порода, подтверждающая правильность выбора цели и поддерживающая дальнейшие исследования на предмет возможных дополнительных минерализованных зон на других участках компании на проекте Титак.

По оценкам, предполагаемые минеральные ресурсы Titac South составляют 46,6 млн т с содержанием 15% TiO₂

Green Bridge Metals Corporation — проект компании в Южной контактной зоне в Миннесоте связан с титано-медно-ванадиевой минерализацией в Дулутском комплексе.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

OROCO RESOURCE CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ МЕДНОГО ПРОЕКТА САНТО-ТОМАС, ШТАТ СИНАЛОА, МЕКСИКА.

10 сентября 2026 г.

В зоне между Северной и Южной зонами ведутся работы по бурению. Завершено бурение 42 скважин общей пробуренная длина составила 12 649 м. На сегодняшний день в рамках второго этапа отобрано 11 431 м керна, что составляет 7543 образца, из которых 6255 — керн, а 1288 — образцы для контроля качества (рис. 1).




Рис. 1 План пробуренных скважин

«Фаза 2» предназначена в первую очередь для обеспечения плотности бурения и получения технических данных, необходимых для оценки потенциального перевода предполагаемых минеральных ресурсов в категорию выявленных в Южной зоне. Программа ГРП занимается сбором геотехнических, гидрогеологических и металлургических данных для поддержки планирования на уровне предварительного технико-экономического обоснования (Pre-feasibility study, PFS).

Oroco Resource Corp. —реализует медный проект Санто-Томас в мексиканском штате Синалоа.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ ЭСКАЛИБУР НА СЕВЕРЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

10 сентября 2026 г.

Программа бурения была сосредоточена на двух крупных высокоприоритетных объектах магнитного поля и заряжаемости, определенных наземными геофизическими исследованиями, подтвержденных аномальными значениями содержания меди и золота в почве (рис. 1, 2).




Рис. 1 Расположение проекта Excalibur и прилегающих проектов (а); план завершённого бурения, геофизические и геохимические данные (б).

Текущие местоположения буровых площадок обозначены голубыми кругами. Магнитные аномалии отмечены красными многоугольниками.




Рис. 2 а. – 3D разрез бурения и подтверждающие геофизические данные целевых объектов на проекте Excalibur; б. – поперечное сечение современной модели медно-золотого порфира.

На Excalibur находится по меньшей мере 12 перспективных магнитных аномалий в одних и тех же геологических породах. Там, где доступны данные о почве и почвенном покрове, эти аномалии подтверждаются откликами на заряд, совпадающими с аномалиями меди/золота в почве.

Prospect Ridge Resources Corp. — развивает свои проекты *Golden Horseshoe* и *Cariboo* в северо-центральной части Британской Колумбии — высокопотенциальные медно-золотые системы, расположенные в одном из наименее изученных, но богатых полезными ископаемыми минеральных поясов Канады.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

FATHOM NICKEL INC. - ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА Ni-Cu-Co ГОЧАГЕР, САСКАЧЕВАН.

10 сентября 2026 г.


Общие выявленные минеральные ресурсы составляют 858,7 тыс т при содержании 0,41% Ni, 0,12% Cu и 0,03% Co (0,57% NiEq¹), что соответствует 7,7 млн фунтов никеля, 2,2 млн фунтов меди и 0,6 млн фунтов кобальта.

Общие предполагаемые минеральные ресурсы составляют 3, млн т при содержании 0,32% Ni, 0,09% Cu и 0,03% Co (0,45% NiEq¹), что соответствует 22,1 млн фунтов никеля, 6,3 млн фунтов меди и 1,8 млн фунтов кобальта.

В пределах выявленных минеральных ресурсов находится более богатая часть проекта с содержанием 0,78% Ni, 0,21% Cu и 0,06% Co (1,07% NiEq¹) при пороговом значении 0,75% NiEq¹, содержащая 3,3 млн фунтов никеля, 0,9 млн фунтов меди и 0,3 млн фунтов кобальта.

В предполагаемых минеральных ресурсах более качественная часть в количестве 234 тыс т с содержанием 0,71% Ni, 0,18% Cu и 0,06% Co (0,97 % NiEq¹) выше порогового значения 0,75% NiEq¹ содержит 3,7 млн фунтов никеля, 0,9 млн фунтов меди и 0,3 млн фунтов кобальта.

Модель MRE была составлена на основе базы данных из 17 недавно пробуренных скважин общей протяженностью 60 тыс м. Из 17 скважин 14 пересекаются и используются для построения блочной модели, что составляет 1,5 тыс м керна (рис. 1).






Рис. 1 а. - План расположения скважин при расчете MRE; б. - Вид сбоку модели Гочагер; в. - Разрез блоковой модели,

Минерализованное тело простирается на 300 м по простиранию, имеет мощность от 40 до 75 м и уходит на глубину примерно на 450 м.

Оруденение остается открытым по простиранию и на глубине, а совпадающие почвенные геохимические и геофизические аномалии простираются за пределы пробуренной площади, определяя цели для потенциального расширения ресурсов.

4811 образцов почвы определяют согласованную аномалию содержания никеля в почве с максимумом в 1650 ppm Ni, которая охватывает пр-ние и простирается в виде коридора с северо-востока на юго-запад, параллельного вмещающему вторжению, оставаясь открытой вдоль простирания в обоих направлениях (рис. 2).




Рис. 2 Схема положения карьера на Гочагер - прямая корреляция с геохимией почв и цели геохимической разведки почв, содержащих никель, вдоль простирания.

Аномалии никеля совпадают с повышенными содержаниями меди, кобальта, хрома и магния, а также с магнитными аномалиями. Геологическое картирование и отбор проб позволили выявить перспективные габброидные литологии на протяжении 3,5 км по простиранию. В совокупности эти данные определяют основные неразведанные цели в масштабе проекта.

Fathom Nickel Inc. —занимается поиском магматических м-ний сульфидов никеля. Компания располагает портфелем из трех высококачественных геологоразведочных проектов, расположенных в рудном Трансгудзоновом коридоре в Саскачеване, Канада

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ALGO GRANDE COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ ADELITA, В СЕРРО-ГРАНДЕ, МЕКСИКА.

11 сентября 2026 г.

Результаты анализа, полученные в рамках программы на проекте Adelita, подтверждают высокосортное многогоризонтное медно-серебряно-золотое скарновое оруденение в Серро-

Гранде. Скважина пересекла 30,23 м с содержанием 1,5% CuEq (0,83% Cu, 47,3 г/т Ag, 0,40 г/т Au) от 146,7 м, в том числе 3,55 м с содержанием 9,4% CuEq (5,26% Cu, 311,8 г/т Ag, 2,22 г/т Au) и интервалом 1,2 м с содержанием 15,8% CuEq (9,84% Cu, 638 г/т Ag, 0,95 г/т Au).

Высокосортный керн также содержит локально аномальный цинк, до 1,88% Zn в пределах интервала 1,2 м, что совпадает с максимальными содержаниями меди, серебра и золота и интерпретируется как отражающий сфалеритовый компонент скарновой ассоциации.

Минерализация была зарегистрирована в пределах скарна и, впервые в программе, в пределах андезитово-порфировой интрузии, содержащей халькопирит; преобладающая в гранате скарновая ассоциация с борнитом, халькопиритом и большим количеством халькоцита предполагает, что скважина может приближаться к ближайшей части системы минерализации (рис. 1).




Рис. 1 План (а) и поперечный разрез (б) целевого коридора на проекте Adelita.

Система остается открытой на северо-западе, западе и юго-востоке. известняковой вмещающей породе, вблизи предполагаемого питающего интрузива и контакта гранодиорита с известняком. Минерализация остается открытой по простиранию (на северо-запад) и по падению; скважина вышла из известняковой толщи в гранодиорит ниже минерализованного интервала и была закончена на глубине 661,8 м.

В ходе бурения было пройдено 36 м с содержанием меди более 1,0% и 14,79 метра с содержанием меди 1,4% в более широком интервале минерализации.

Минерализация в скарновом горизонте происходит в массивном коричнево-гранатовом скарне (гранат >пироксен), который Компания интерпретирует как высокотемпературный прогрессивный скарн, впоследствии покрытый богатой Cu минерализацией. Ассоциация скарна с преобладанием граната с борнитом, халькопиритом и обильным содержанием халькоцита предполагает, что буровая скважина, возможно, приближается к ближайшей части системы минерализации или к главному каналу гидротермального флюида. Ожидается, что контакты будут становиться все более размытыми по мере приближения к источнику по мере углубления скважины.

Algo Grande Copper Corp. —разрабатывает проект «Аделита» — многосистемное м-ние меди, серебра и золота районного масштаба, расположенное в богатом медном поясе Аризоны и Соноры. Проект «Аделита» площадью 5,9 тыс га основан на медно-золото-серебряном скарновом проекте Серро-Гранде, которое демонстрирует сильную геофизическую преемственность вдоль коридора протяженностью более 6 км.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ANTIMONY RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА СУРЬМЯНОМ ПРОЕКТЕ БОЛД-ХИЛЛ В НЬЮ-БРАНСУИКЕ. КАНАДА.

11 сентября 2026 г.

Программа бурения, направлена на расширение минерализации в основной зоне и восполнение пробелов в данных. На рисунке 1 ниже показано расположение буровых скважин в Главной зоне и протяженность проекции минерализации на поверхность. Зона открыта с севера и юга




Рис. 1 Основная зона Болд-Хилл (а) и расположение буровых скважин в Центральной зоне (б).

Завершается бурение в недавно выявленной Центральной зоне, где при рытье траншей была выявлена сурьмянистая стибнитовая минерализация. В этой зоне не проводилось бурение, и текущая программа будет представлять собой предварительную проверку минерализации под поверхностными траншеями.

Болд-Хилл — известное месторождение сурьмы с высоким содержанием металла в южной части Нью-Брансуика, Канада.

Анализы показывают, что Болд-Хилл — объект сурьмы с самым высоким содержанием металла в Северной Америке, пригодный для разработки, что подтверждается результатами бурения. Бурение выявило м-ние сурьмы в основной зоне протяженностью более 600 м и глубиной не менее 350 м. Минерализация простирается во всех направлениях.

Ширина минерализации составляет от 4 до 5 м, а содержание сурьмы — от 3% до 4%.

Antimony Resources Corp. — компания, занимающаяся геологоразведкой и добычей сурьмы.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GUARDIAN METAL RESOURCES PLC - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА
ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ PILOT MOUNTAIN В НЕВАДЕ.

14 сентября 2026 г.

Бурение в недавно обнаруженной зоне Тремор и ранее непроверенной зоне Гуд-Хоуп подтверждают возможность расширения минерализации, выявленной на Pilot Mountain, за пределы минеральных ресурсов, учтенных в недавно завершеном предварительном технико-экономическом обосновании (рис. 1).




Рис. 1 Карта буровых скважин с указанием планируемых карьеров для PFS

Зона Тремор — это слепой вольфрамово-скарновый объект, скрытый под аллювиальным покровом и не выходящий на поверхность. Обширная вольфрамовая минерализация подтверждена на расстоянии более 200 м, при этом минерализация остается открытой в нескольких направлениях, что дает возможность в будущем дополнить запасы Пайлот-Маунтин.

В зоне пробурено 8140 м. Минерализация была подтверждена на двух отдельных участках — северной и южной. В пределах северного участка минерализация была подтверждена на протяжении ~200 м по простиранию и ~190 м по падению, при этом минерализация может простираться в разных направлениях.

При бурении в зоне Гуд-Хоуп было обнаружено множество вольфрамовых включений в приповерхностных слоях, расположенных на расстоянии от 1,1 до 1,3 км от существующих участков добычи на Пайлот-Маунтин. Пересечения в районе Гуд-Хоуп включали: 12,95 м при 0,79% WO₃ из 12,19 м;

Зона Гуд-Хоуп — одна из приповерхностных зон вольфрамовых скарнов в рамках проекта, которая, как было установлено, обладает потенциалом для увеличения запасов. Минерализация обнажается в окне, расположенном ниже более молодых третичных вулканических пород, и приурочена к пластам известняка формации Лунинг, простирающимся с востока на запад и полого падающим на север, которые примыкают к крупному телу кварцевого монзонита, являющемуся интрузивной фазой, сформировавшей Пайлот-Маунтин.

Минерализация в зоне Гуд-Хоуп была выявлена на участке протяженностью ~100 м, начиная от поверхности и уходя вниз по падению на ~65 метров. С запада минерализация ограничена постминерализованными разломами, что открывает возможности для разведки и расширения в направлении смещенной части зоны.

Guardian Metal Resources PLC (NYSE.A: GMTL, LON:GMET, OTCQB:GMTLF) —реализует два флагманских проекта по добыче вольфрама: Пайлот-Маунтин, одно из крупнейших неразработанных месторождений вольфрама в США, и Темпшот, ранее крупнейшее в Америке месторождение вольфрама. Оба проекта расположены в Неваде, одном из самых перспективных горнодобывающих регионов США.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GOLDEN SKY MINERALS CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА МЕДЬ НА УЧАСТКЕ МОУИЧ В РАМКАХ ПРОЕКТА РЭЙФИЛД-ГЬОЛЛ НА ЮГЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

14 сентября 2026 г.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии сильного и стабильного отклика на содержание меди в почве, пространственно связанного с нанесенными на карту диоритовыми, монцодиоритовыми и монзонитовыми интрузивными породами, что открывает новые важные цели для дальнейших исследований (рис. 1).




Рис. 1 Проект «Рейфилд-Гьолл» расширен на 7,3 тыс га.

Программа была разработана для систематической оценки взаимосвязи между геохимией поверхности, геологией и ранее выявленными геофизическими аномалиями в районе Моуич. Результаты исследований позволяют составить геологическую картину медной минерализации, обнаруженной на поверхности.

Геохимия меди тесно связана с интрузивными породами. Исследование выявило несколько согласованных тенденций в распределении меди в почве, при этом наибольшая концентрация наблюдается в центральной части исследуемой территории. Важно отметить, что эти аномальные зоны пространственно связаны с нанесенными на карту диоритовыми, монцодиоритовыми и монзонитовыми интрузивными фазами (рис. 2).




Рис. 2. Карты, демонстрирующие пространственную взаимосвязь между аномалиями содержания меди в почве и картируемыми интрузивными породами (а) и между геохимическими характеристиками горных пород, интрузивными образованиями и изменениями вмещающих пород (б).

Содержание меди в почве увеличивается с фонового уровня менее 50 ppm до более 300 ppm меди в нескольких районах, при этом максимальное содержание достигает 521 ppm меди. Повышенные значения не являются изолированными геохимическими аномалиями, а образуют вытянутые и непрерывные в латеральном направлении тренды на нескольких линиях отбора проб.

Пространственная взаимосвязь между повышенными геохимическими показателями и нанесенными на карту интрузивными породами особенно значима. Самые сильные аномалии содержания меди в почве наблюдаются вокруг интрузивных тел и вдоль их границ, что указывает на интрузивные контакты и связанные с ними структурные зоны как потенциальные факторы, влияющие на движение гидротермальных флюидов и медную минерализацию. Эта взаимосвязь подтверждается результатами отбора проб горных пород: образцы, взятые вдоль границы диорита, содержат до 2216,1 ppm Cu (0,22% Cu). Повышенное содержание меди в породе находится в тесной пространственной связи с повышенным содержанием меди в почве, что является еще одним доказательством того, что интрузивные границы могут представлять собой важные зоны минерализации.

Формирующаяся геологическая модель соответствует условиям поисков медно-золотых месторождений в порфириновом стиле, где многочисленные интрузивные фазы и структурные коридоры могут служить путями и благоприятными участками для гидротермальных изменений и минерализации.

Особый интерес представляет центральный коридор, где повышенное содержание меди в почве наблюдается на обширной территории и, по всей видимости, соответствует нанесенному на карту интрузивному комплексу. Некоторые из самых высоких показателей содержания металлов в почве наблюдаются непосредственно рядом с предполагаемыми контактами между интрузивными фазами и окружающими их вулканическими/осадочными породами или на самих этих контактах. Такие участки являются приоритетными для детального геологического картирования, отбора образцов горных пород и последующих геофизических исследований.

Вдоль границ интрузий было обнаружено несколько выходов пикрита, где породы подверглись интенсивному тальково-карбонатному изменению. В ходе ГРП было установлено, что пикриты и сильно измененные и серпентинизированные основные вулканические породы являются вмещающими породами, связанными с минерализованным материалом, что является важным геологическим ограничением для определения источника и распространения высокосортной минерализации. Тесная пространственная связь между измененными пикритами и оруденением указывает на потенциальную геологическую и генетическую связь и является важным направлением для дальнейших поисков. Последующие ГРП будут направлены на то, чтобы определить, является ли сильно измененный пикрит основной вмещающей породой или непосредственным источником высокосортной минерализации в Моуиче.

Golden Sky Minerals Corp. — в портфель входит флагманский медно-золотой проект Rayfield-Gjoll в Британской Колумбии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

BRAVO MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА PGM НА ПРОЕКТЕ В ЛУАНГЕ В ПРОВИНЦИИ КАРАХАС, БРАЗИЛИЯ.

14 сентября 2026 года

Среди результатов — 40 м с содержанием 3,0 г/т PGM + Au + 0,32 % Ni, 52 м с содержанием 2,1 г/т PGM + Au + 0,11 % Ni и 16 м с содержанием 3,1 г/т PGM + Au + 0,23 % Ni, в том числе 5 м с содержанием 7,5 г/т PGM + Au + 0,32 % Ni (рис. 1)




Рис. 1 План целевых участков на проекте Луанга.

Участки 1 и 2 — это участки, где бурение направлено на повышение категории предполагаемых ресурсов до категории выявленных. На этих участках минерализация PGE прослеживается на 250 м ниже поверхности, что продолжает соответствовать тенденции более глубокого бурения, при котором обнаруживаются пр-ния с сопоставимыми показателями минерализации. Мощность минерализованных пород остается неизменной по всему разрезу (рис. 2).




Рис. 2 Разрезы оруденения PGE/

Бурение вкрест простирания по-прежнему демонстрирует непрерывность минерализации на глубине более 300 м от поверхности, что указывает на возможность обнаружения дополнительных предполагаемых минеральных ресурсов.

Компания Bravo пробурела 447 скважин общей протяженностью 98 тыс. м. Существует дальнейший потенциал для расширения минерализации на глубине, где она остается открытой.

Bravo Mining Corp. — специализируется на реализации проекта по добыче платиноидов, никеля и медно-золотого руд в Луанге, в Карахасской минеральной провинции, штат Пара, Бразилия.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GETTY COPPER INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ УЧАСТКЕ GETTY SOUTH ПРОЕКТА GETTY В ОКРУГЕ ХАЙЛЕНД-ВЭЛЛИ В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

14 сентября 2026 г.

Расширяющееся бурение Getty South пересекает неглубокую, мощную, высококачественную медную минерализацию в нескольких скважинах, которые остаются открытыми по простиранию и на глубине. Содержание меди в этих скважинах на участке Гетти-Саут в разы превышает показатели, заявленные для района Хайленд-Вэлли (рис. 1)




Рис. 1 Целевые участки бурения района Хайленд-Вэлли

Результаты получены по поперечным сечениям скважин, пробуренных в 25 м к северу и в 25 м к югу от 184 м с содержанием 0,37% меди и 0,4 г/т Ag на глубине 110 м. Медная минерализация встречается в виде относительно крупнозернистого (до нескольких см) халькопирита и незначительного борнита в жилах и гидротермальном брекчиевом цементе (рис. 2).




Рис. 2 План (а) и разрез (б) результатов бурения аномалии заряжаемости IP на участке Гетти-Саут.

Непрерывность и ширина минерализации в этой зоне указывают на наличие медной минерализации шириной 40–60 м, которая простирается с северо-северо-запада на юго-юго-восток и остается открытой в обоих направлениях и под буровыми скважинами. Истинная ширина минерализации еще не определена, но, по оценкам, составляет от 30 до 60% от глубины залегания. Минерализация залегает в пределах широкой геофизической аномалии с низкой заряжаемостью, диаметр которой составляет примерно 500 м.

Локальное гипергенное окисление медной минерализации присутствует вблизи поверхности и вдоль разломов и будет более полно охарактеризовано с помощью текущего анализа последовательного выщелачивания.

Getty Copper Inc. — канадская компания, занимающаяся разведкой и разработкой м-ний в южной части Британской Колумбии, Канада. В портфель компании входит проект Getty

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

EDGE COPPER - РЕЗУЛЬТАТЫ ОКСИДНОГО БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ZONIA В АРИЗОНЕ.

14 сентября 2026 г.

Основной результат получен по скважине, пробуренной в центральной части пр-ния под несколькими неглубокими историческими скважинами. Было извлечено 140 футов породы с содержанием меди 0,45% (CuT) на глубине 0 футов, в том числе 80 футов породы с содержанием CuT 0,63% на глубине 20 футов. Отдельный интервал дал 340 футов породы с содержанием CuT 0,30 % на глубине 400 футов, в том числе 165 футов породы с содержанием CuT 0,40% на глубине 410 футов.

В совокупности данные по восьми пробуренным скважинам подтверждают наличие обширных интервалов медной минерализации в центральной и северной частях пр-ния, а также на его северо-западной окраине, что подтверждает непрерывность и масштабность медной системы Zonia от поверхности до глубины. Результаты включают как зоны с более высоким содержанием, так и обширные интервалы минерализации с ресурсами, и будут использованы для обновления геологических моделей и моделей минеральных ресурсов компании.

Текущая работа включает:

- интеграция ориентированного керна, геологических каротажных диаграмм и данных сканирования керна с высоким разрешением из пробуренных скважин;
- оценка непрерывности и геометрии минерализации в центральной части пр-ния;
- уточнение границ оксидной, смешанной и сульфидной минерализации с помощью последовательных анализов меди и данных сканирования керна;
- продолжение бурения для изучения минерализованной системы по простиранию и падению;
- продолжение металлургических испытаний репрезентативного минерализованного материала;
- продолжение оценки оксидных минеральных ресурсов проекта Zonia.

Edge Copper Corporation —развивает проект Zonia Copper в Аризоне. Zonia — это ранее разрабатывавшийся объект методом кучного выщелачивания, в рудном районе Уолнат-Гроув в Аризоне.

<https://www.canadianminingjournal.com/press-release>

FIREWEED METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ VMS В РАМКАХ ПРОЕКТА МАКПАСС, ЮКОН, КАНАДА.

15 сентября 2026 г.

Бурение за пределами пространственных границ текущих минеральных ресурсов проекта Макпасс нацелено на слоистую цинково-свинцово-серебряную минерализацию (рис. 1).




Рис. 1 Положение проекта Макпасс

Участок бурения Южный Том представляет собой крупный выступ вниз и на восток вдоль простирания, и пересекающий интервал стратиформного сульфидного оруденения: - 64 м

истинной ширины с содержанием 8,35% ZnEq. (111,63 м пересечено с 982,34 м в скважине) с содержанием 5,42% Zn, 3,21% Pb и 16,8 г/т Ag.

Этот интервал включает материал черной, серой и розовой фаций, а также массивные сульфиды от 982 м до глубины 1093 м, состоящие из слоистого сфалерита, галенита и барита, слоистого сфалерит-аргиллита с прослоями черных аргиллитов и массивных галенита и сфалерита. Пересечение содержит залегающие и осадочные пластинки с ориентацией от субпараллельной до перпендикулярной оси керна. Обломочные породы непосредственно над и под минерализованной зоной имеют постоянную ориентацию залегания относительно оси керна, что показывает, что истинная толщина зоны составляет 64 м, что является самым мощным пересечением, пробуренным на сегодняшний день в Tom South.

На сегодняшний день пробурено 6505 м. Из них 4710 м пробурено на участке Том-Саут в зонах выклинивания массивных сульфидных руд, а 1795 м — на участке Том-Ист в зонах залегания высокосортных массивных и пластинчатых сульфидов, где впоследствии была проведена мюонная томография.

Fireweed — является владельцем проекта Макпасс — крупного и перспективного земельного участка площадью 985 км². Район включает цинково-свинцово-серебряный проект Макпасс и вольфрамовый проект Мактанг.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GLADIATOR METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА Cu-Au ПРОЕКТЕ CUB EAST В УАЙТХОРСЕ, ЮКОН.

15 сентября 2026 г.

Система остается открытой во всех направлениях, бурение сосредоточено на определении истинного потенциала проекта Cub East и тестировании дополнительных приоритетных объектов в рамках более широкого тренда Блэк-Каб. С учетом того, что предстоит протестировать более 600 м дополнительного перспективного участка к юго-востоку от проекта, направление Black Cub становится одной из важнейших возможностей роста Gladiator в ближайшей перспективе.

Последние результаты подтверждают, что Cub East является быстро развивающимся трендом высококачественной меди, золота и серебра протяженностью 1,5 км. (рис. 1)




Рис 1 План тренда Блэк-Куб на основе аэромагнитной с результатами пробоотбора.

Бурение направлено на продолжение геологической структуры в направлении падения, восходящем направлении и по простиранию совпадающей гравитационной и индукционно-поляризационной (ИП) геофизической аномалии, простирающейся более чем на 1,5 км.

Важно отметить, что доказанная эффективность IP и гравиметрии в качестве инструментов целеуказания дает компании Gladiator четкую и воспроизводимую систему ГРП для выявления, определения приоритетности и бурения дополнительных перспективных медно-золото-серебряных пр-ний в рамках всего проекта.

Результаты указывают на наличие минерализованного ядра, ограниченного интерпретируемыми субвертикальными восточным и западным разломами. Геологическое

моделирование показывает, что система может подниматься на запад, к более мелкозалегающим участкам, и потенциально соединяться с Блэк-Каб-Саут.

На востоке интерпретируемый нисходящий градиент указывает на значительный потенциал по глубине, что подтверждает перспективность участка Cub East как открытого, расширяемого и все более привлекательного для стратегического роста.

При бурении 600 м к юго-востоку была обнаружена скарновая минерализация. На поверхности также была выявлена сопутствующая магнетитовая скарновая минерализация с результатами отбора проб до 2,37% Cu, 38,0 г/т Ag и 3,24 г/т Au). Эти наблюдения продолжают укреплять уверенность в масштабах, непрерывности и потенциале роста запасов этого нового медно-золото-серебряного объекта.

Whitehorse Copper Project - это проект по разведке скарнов высокого качества из меди (Cu), молибдена (Mo), серебра (Ag) и золота (Au) на продвинутой стадии на территории Юкон, Канада.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

СЗ METALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ
КХАЛИСИ, ПЕРУ.

15 сентября 2026 г.

Проект Кхалиси расположен в поясе Андауайлас-Яури на юго-востоке Перу, где находятся крупные месторождения медного скарна и порфира и действующие рудники, такие как Las Bambas (MMG), Constancia (Hudbay Minerals), Antapaccay (Glencore) и другие (рис. 1).




Рис. 1 Региональная карта пакета концессий C3 Metals в сравнении с другими крупномасштабными проектами.

Проект Khaleesi расположен вдоль благоприятной зоны контакта известняковых и интрузивных пород, которая делит участок на две части и простирается в северо-северо-восточном направлении. Известняковая порода является частью высокопроницаемой формации Ферробамба, а интрузивная порода — частью хорошо известного батолита Андауайлас-Яури. В зоне контакта находится многофазный интрузивный комплекс, который также простирается в направлении северо-восток — юго-запад и следует за зоной контакта, которая в основном покрыта тонким слоем ледниковых отложений. Минерализация выявлена под ледниковым покровом.

Бурение пересекает повсеместные изменения в порфировом и скарновом стиле с первичной и вторичной медной минерализацией. В зоне диорита было обнаружено 0,24% меди, 0,035 г/т золота, 0,79 г/т серебра, 47 ppm молибдена (0,30% CuEq) на глубине 48 м. Далее по стволу скважины был обнаружен 164,6 м перехват пироксенового и магнетитового скарна, который показал 0,28% меди, 0,028 г/т золота, 0,93 г/т серебра, 51 ppm молибдена (0,35% CuEq) на глубине 280 м по вертикали (304,5 м по стволу скважины).

Минерализация подтверждена на глубине около 500 м по вертикали и более 500 м по простиранию с востока на запад (рис. 2).




Рис. 2 Геологическая карта с данными бурения медной (оранжевый) и молибденовой (синий) минерализации (а) и поперечные разрезы медно-колчеданной минерализации (б).

Бурение выявило на сегодняшний день пять типов оруденения, включая:

- вторичные виды меди в приповерхностной зоне обогащения в пределах многофазного интрузивного комплекса;
- первичная минерализация от низкой до умеренной халькопирит - борнит - молибденит в интрузивном комплексе ниже зоны обогащения;
- минерализация халькопирит-борнит-молибденит в гранатовых, пироксеновых и магнетитовых скарнах;
- высокосортная медная минерализация в стиле мантос; и,
- узкие эпитермальные жилы промежуточного сульфидирования, содержащие минерализацию основных и благородных металлов.

Приповерхностная вторичная медная минерализация, залегающая в диорите, имеет истинную мощность от 25 до 100 м и на глубине переходит в халькопирит-борнит-молибденитовую минерализацию. В диорите встречаются «островки» магнетитовых скарнов, которые кажутся бескорневыми. Основное тело скарна залегает на глубине 300 м и состоит из: 1) гранат-пироксенового эндоскарна, измененного диорита, 2) гранат-пироксенового экзоскарна и богатого железом экзоскарна с магнетитом, замещающего доломит формации Ферробамба.

Было подтверждено, что скарн, падающий на восток, простирается более чем на 500 м в направлении восток-запад, имеет истинную мощность от 50 до 200 м и остается открытым с севера, востока и запада. Под основным телом скарна залегает слабоминерализованный диорит.

Планируется 3D-IP томография, имеющая решающее значение для определения потенциальных источников порфирового оруденения или интрузий, вызвавших их формирование, по двум причинам:

1. Метод выявляет высокие значения удельной электропроводности от поверхности до глубины примерно 1 км, что указывает на наличие и интенсивность сульфидных минералов; и
2. предоставляет данные о проводимости и удельном электрическом сопротивлении до глубины примерно 1 км, что позволяет определить, какие горные породы более проводящие или менее проводящие для потока минерализующих флюидов.

Кроме того, продолжается картирование поверхности и отбор проб почвы на более обширной территории проекта «Кхалиси».

C3 Metals Inc. — владеет 31 тыс га в Андауайлас-Яури порфирово-скарновом поясе на юге Перу, где расположены проекты компании *Jasperoide* и *Khaleesi*.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

SILVER ACADIA EXPLORATION INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS НИКОЛАС-ДЕНИ В НЬЮ-БРАНСУИКЕ, КАНАДА.

15 сентября 2026 г.

Silver Acadia объединила полученные результаты бурения с обширной базой данных, результатами сканирования керна, данными картирования и обновленной геологической и структурной интерпретацией для определения целей в минерализованном коридоре протяженностью около 3 км в районе Николас-Дэнис, охватывающем зоны Генри, Хейчи и Шафт, а также на выявление минерализации в других частях региональной структурной системы Роки-Брук-Миллстрим (рис. 1).




Рис. 1 Расположение зон Hachey, Millstream Iron A и Pine Tree W, где была завершена программа бурения.

Проекты компании расположены на территории рудного района Батерст и прилегающих к нему территориях и включают в себя объекты ГРП, типичные для геологической среды Аппалачей, в том числе медно-серебряно-цинковые системы с вкраплениями самородного золота, структурно контролируемые золотосные системы, сурьмяно-золотые системы, связанные с интрузиями, и другие.

Silver Acadia Exploration Inc. (CSE: SLA) — контролирует более 250 км² перспективных участков в Нью-Брансуике, Канада.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

FORGE RESOURCES CORP - ВЫЯВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО ПОРФИРОВЫХ ЦЕНТРОВ НА ПРОЕКТЕ АЛОТТЕ, РУДНЫЙ ПОЯС ДОУСОН-РЕЙНДЖ, ЮКОН.

15 сентября 2026 г.

Проект «Алотта» является одной из нескольких позднемиловых порфировых месторождений, к которым относятся м-ния Казино и Ревен-Нуклеус.

Программа бурения была сосредоточена на предполагаемых центрах, которые могут содержать порфировую минерализацию и, как считается, являются причиной оруденения в зонах Пайофф и Северанс (рис. 1).




Рис. 1 План бурения на проекте Alotta.

Несколько скважин были пробурены для проверки геофизических аномалий. Скважины вскрыли значительные порфировые прожилки и измененные породы на значительном интервале.

На Алотта пробурено 2792 м в шести скважинах в зонах Commission, Payoff и Severance. Минерализация и изменения были обнаружены во всех скважинах, на площади более 4 тыс км², что соответствует наличию нескольких порфировых центров, а не одного.

Самая глубокая скважина на проекте (651 м) была минерализована и подверглась изменениям по всей длине, включая биотитовые, магнетитовые и хлоритовые изменения, а также пирит±пирротин-молибденито-халькопиритовую минерализацию. Плотность жил и содержание магнетита увеличиваются с глубиной, что характерно для участков вблизи порфировых центров. Был пересечен пропилитовый измененный порфирит с большим количеством пирита ± пирротина и незначительным количеством молибденита и халькопирита.

Скважины пересекли измененные и минерализованные порфировые породы на большей части своей длины, с обильными эпидотовыми и хлоритовыми изменениями, а также прослоями серицита. Также были пересечены несколько крупных разломных зон с прожилками порфира и связанными с ними изменениями. Значение разломных зон еще предстоит определить, но, судя по всему, они разделяют низкотемпературные и высокотемпературные части системы и могли увеличить глубину окисления. По всей скважине наблюдались значительные карбонатные и кварцево-карбонатные прожилки, которые, по-видимому, связаны с разломами. Некоторые из этих прожилок имеют эпитермальную структуру. (рис. 2).




Рис. 2 Концептуальная модель порфировой системы на Алотта.

Проведенные буровые работы на проекте Алотта показали, что, вероятно, существует несколько порфировых центров. В керне часто встречаются наложенные друг на друга комплексы изменений, которые, вероятно, отражают многоцентровой характер системы. Эти многочисленные центры, вероятно, способствуют обогащению золотом, наблюдаемому в зоне Payoff

Forge Resources Corp. — специализируется на изучении и развитии проекта Alotta — перспективного медно-золото-молибденового порфирового проекта, состоящего из 230 участков на площади 4,7 тыс га, расположенных в 50 км к юго-востоку от порфирового м-ния Казино в неоледенелой части порфирово-эпитеpмального пояса хребта Доусон на территории Юкон в Канаде.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GOLDHAVEN RESOURCES CORP. - ДОБЫВАЕТ ВОЛЬФРАМ В РАМКАХ ПРОЕКТА МАГНО, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.

15 сентября 2026 г.

При бурении первых трех скважин были обнаружены широкие интервалы скарновых изменений и сульфидной минерализации в верхних 100 м, в том числе 20-м интервал скарнов во второй скважине. Этот интервал особенно примечателен тем, что в ходе геологической интерпретации на этом участке были выделены две отдельные полосы скарнов, в то время как предварительные результаты текущего бурения указывают на возможность наличия более широкого и непрерывного комплекса скарнов. Четвертая пробуренная скважина подтвердила, что ранее не изученная часть скарновой формации простирается вниз по падению. Текущая программа представляет собой важный шаг на пути к сбору современных геологических и

аналитических данных по всей системе Kuhn и оценке непрерывности и потенциального расширения выявленных вольфрамовых пр-ний (рис. 1).




Рис. 1 Целевой участок вольфрам-скарновой системы Куна —разрез и результаты бурения.

Цель компании на этом этапе — пробурить несколько скважин на пр-нии Kuhn, что позволит получить значительно более полную информацию о геометрии, толщине и непрерывности скарновой системы, а также провести прямое сравнение с данными предыдущих буровых работ.

Бурение продолжается. Результаты текущей программы будут сопоставлены с данными исторического бурения, геологией поверхности и современными геофизическими данными для определения дальнейших целей и будут использованы для определения целесообразности дальнейшего бурения на пр-нии Kuhn, прежде чем программа будет перенесена на другие приоритетные объекты на проекте Магно.

После реализации первоначальной программы Kuhn компания GoldHaven намерена оценить дополнительные приоритетные цели для бурения, в том числе зону D и более обширную целевую область Магно, где в ходе ГРП - наземных исследований были обнаружены значительные залежи серебра, свинца, цинка, золота и меди.

Выбор целей для бурения в районе Магно осуществляется на основе данных исторического бурения и подземных выработок, аэрофотосъемки и геохимии, а также недавно завершенной компанией магниторазведки QMAGT протяженностью 2320 погонных км.

GoldHaven Resources Corp. — флагманским активом компании является проект Magno районного масштаба в округе Кассиар на севере Британской Колумбии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

SANKAMAP METALS INC. – БУРЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ KUMA, НА СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВАХ.

15 сентября 2026 г.

Считается, что на участке Кума находится малоизученная и практически не тестированная медно-золотая (Cu-Au) порфировая система. Исторический анализ проб породы показал стабильно высокое содержание золота — более 0,5 г/т Au, в том числе в образце с содержанием 11,7% Cu и 13,5 г/т Au; что свидетельствует о значительном потенциале этого района.

Текущая программа бурения направлена на тестирование нескольких приоритетных объектов, выявленных по геофизическим, геохимическим и геологическим признакам на Кума (рис. 1).



Рис. 1 Медно-золотая тенденция проектов Фауро и Кума компании Sankamar на Соломоновых островах.

В рамках первой программы бурения на пр-нии Кума исследуются приоритетные геофизические, геологические и геохимические объекты, связанные с обширным литогенным покровом. Бурение дополняется продолжающимся геологическим картированием, отбором проб поверхности и спектральным анализом. Новые наборы данных интегрируются в развивающуюся модель ГРР для уточнения и определения приоритетности будущих объектов бурения.

Буровая скважина KU26-001 прошла через приоритетный геологический, геохимический и геофизический объект под нанесенным на карту литоклавом и пересекла несколько зон сильных гидротермальных изменений, характеризующихся интенсивными глинистыми изменениями, многочисленными ангидритовыми прожилками и повсеместной пиритовой минерализацией. Этот комплекс изменений подтверждает наличие развитой сульфидосодержащей гидротермальной системы под литоклавом и интерпретируется как среда с высоким содержанием филлитов и аргиллитов. Ангидрит-богатые изменения и сульфидная минерализация характерны для нескольких крупных гидротермальных золотоносных систем, в том числе для золотого месторождения Лихир в Папуа — Новой Гвинее, где ангидрит является частью системы гидротермальных изменений, связанных с золотоносностью.

Исследуется магнитный объект, совпадающий с сильной аномалией электропроводности вдоль северной границы литокапсулы. Эта явно отличающаяся геофизическая обстановка может свидетельствовать о переходе от богатых сульфидами изменений, обнаруженных в KU26-001, к более близкой интрузивной среде, потенциально характеризующейся породами с магнетитом, калиевыми изменениями, кварцевыми прожилками в стиле порфировых руд и увеличением содержания сульфидов меди (рис. 2).




Рис. 2 Запланированные скважины на Куме, нацеленные на несколько проводящих и интрузивных тел, совпадающих с поверхностными изменениями и геохимическими аномалиями (а) и карта общей магнитной индукции (ТМІ) с указанием местоположения буровых скважин (б).

Магнитный отклик указывает на сильную аномалию, которая может представлять собой важные структурные пути, контролирующие движение гидротермальных флюидов, и/или магнетитосодержащие изменения, связанные с калиевым ядром крупномасштабной медно-золотой порфировой системы. Эти магнитные особенности дают ценную информацию для уточнения геологической модели и направления будущих исследований в сторону потенциальных центров минерализации.

Такой подход к ГРР является основополагающим для поиска порфировых месторождений. Первоначальные пробуренные скважины позволяют определить зону изменчивости и геологическую структуру, что дает возможность интегрировать и постоянно совершенствовать геологические, геофизические, геохимические и структурные данные для последующего бурения в направлении ядра минерализованной системы — следующий шаг в тестировании развивающейся модели ГРР.

В ходе геологоразведочных работ была выявлена литокластовая зона мощностью около 2 км, характеризующаяся развитыми глинистыми изменениями, в том числе алунином, каолинитом и остаточным кремнеземом. Литокласты могут представлять собой верхние части гидротермальных систем и служить важными направлениями для поиска эпитеpмальной и порфировой медно-золотой минерализации на глубине.

Все геологические, геохимические, геофизические, структурные и спектральные данные будут по-прежнему интегрироваться для уточнения представлений компании о гидротермальной системе Кума и для корректировки текущего бурения.

Sankamap Metals Inc. (CSE: SCU) — в рамках проекта в Океании на Соломоновых островах активно ведутся ГРП на участках Кума и Фауро. Исторические исследования уже выявили минеральный потенциал обоих участков, расположенных вдоль перспективного медно-золотоносного тренда, что указывает на возможность обнаружения новых м-ний.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

HERCULES METALS - ПРОДВИГАЕТ ПРОЕКТ HOOK В АЙДАХО ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОРФИРА.

15 сентября 2026 г.

Компания развивает проект Хук в западном Айдахо после того, как разведочное бурение выявило возможность обнаружения третьего медного пр-ния на проекте.

Скважина выявила порфиновые изменения рядом с геофизической аномалией электропроводности на глубине 1,8 км где имеется 500-м ядро, которое начинается примерно на 100 метров ниже поверхности.

Важным является подтверждение отсутствия постминерализованного эпитеермального покрова на Хуке - минерализованная система залегает глубже, чем ожидалось. Находка на Хуке укрепит позиции Hercules в вопросе о том, что м-ние «Левиафан» является частью более крупного медно-порфирового района, а не обособленной системой. Компания уже обнаружила еще один медно-порфиновый центр в Саузерн-Флэтс и наметила дальнейшие цели в том же направлении. Бурение вскрыло сильные кварц-серицит-пиритовые изменения с содержанием пирита от 5% до 10%, а также скарновые изменения.

По данным компании, скважины остались в триасовых породах, а не прошли через более молодой постминеральный покров, залегающий над м-нием «Левиафан». Они пересекли вулканические и карбонатосодержащие осадочные породы, в которых может находиться скарновая и порфировая минерализация. Триасовые породы также выходят на поверхность в районе цели «Хук».

Керн, отобранный на глубине от 500 до 545 м, демонстрирует скарновые изменения на внешнем крае системы с полумассивным замещением и полосчатостью. На глубине от 597 до 614 м зафиксированы более сильные кварц-серицит-пиритовые изменения и прожилки в стиле порфировых с высоким содержанием пирита.

Хук находится в 3 км к востоку от Левиафана. Его аномалия электропроводности совпадает с целевым показателем проводимости, выявленным в ходе геофизической съемки. Hook демонстрирует самую высокую электропроводность среди пород триасового периода с момента исследования, которое привело к открытию м-ния «Левиафан». Hercules обнаружила «Левиафан» после бурения под неглубоко залегающей системой серебряных пр-ний. С тех пор было пробурено более 30 тыс м для изучения серебряной минерализации и залегающей под ней порфировой системы. Протяженность «Левиафана» по простиранию составляет более 1 км, ширина — до 750 м, а глубина — до 500 м.

По оценкам SCP, запасы меди на м-нии «Левиафан» составляют более 600 млн т с содержанием меди 0,5%. «Хук» дает Hercules возможность провести вторую фазу ГРП на ранней стадии, помимо «Левиафана», и поддерживает идею о том, что геофизический метод может помочь выявить новые порфировые м-ния на территории пронкта.

Скважины к югу от «Левиафана» исследуют участок в направлении Сазерн-Флэтс, где уже обнаружен еще один порфиновый центр. Эти результаты покажут, продолжается ли минерализация между уже открытыми м-ниями, в то время как бурение Хук определит, насколько быстро компания сможет приступить к разработке самого перспективного из своих непроверенных приповерхностных объектов.

<https://www.northernminer.com/news/hercules-advances-hook-in-idaho-after-porphyry>

ATEX RESOURCES - ОБНАРУЖИВАЕТ НОВУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ B2B НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ ВАЛЕРИАНО В ВАЛЬПАРАЙСО, ЧИЛИ.

16 сентября 2026

Программа ГРП направлена на достижение нескольких высокоприоритетных целей в Валериано в преддверии обновленной оценки минеральных ресурсов для демонстрации возможностей районного масштаба.

Высококачественная брекчия B2B была существенно расширена, и система остается открытой во всех направлениях, а бурение позволило распространить минерализацию высококачественной брекхии на 200 м к югу, увеличив предполагаемую длину простираия на 50% до 600 м. Минерализация, связанная с порфирами, выявлена на участке протяженностью 1,8 км в направлении север-юг, при этом цели пересекают зону порфировых изменений, указывая на потенциально гораздо более крупную минерализованную систему.

Следующие основные цели:

1. *Расширение и уточнение границ высокосортной зоны B2B* — расширение и более точное определение геометрии, непрерывности и масштаба зоны B2B, особенно по простираию и на глубине.

2. *Обнаружение новых высокосортных брекчиевых зон* — систематическое тестирование геофизических объектов, аналогичных B2B, к северу, югу и востоку от известной системы B2B.

3. *Расширение более крупной системы порфировых м-ний Валериано* — определение границ минерализованной порфировой системы с помощью ступенчатого бурения.

Бурение в рамках этапа VI позволило расширить и лучше изучить высокосортную зону B2B, продвинув высокосортный керн на 100 м к северу и проследив минерализацию брекхии на протяжении 600 м по простираию, что на 50% больше, чем предполагалось ранее, — на протяжении примерно 400 м по простираию (рис. 1).




Рис. 1 План буровых скважин на этапе VI и возможности расширения.

В целом шестая фаза достигла своей основной цели — расширить и лучше изучить высокосортную зону B2B, а также продемонстрировать, что возможности для ГРП на Валериано выходят за пределы зоны B2B. Сочетание повторяющихся высокосортных медно-золотых интервалов, расширение зоны B2B по простираию и глубине, обширные минерализованные интервалы вокруг брекхии и региональное бурение, в ходе которого по-прежнему обнаруживается связанная с порфирами минерализация за пределами известной системы, создают прочную основу для следующего этапа ГРП.

Ожидается, что программа ГРП позволит сбалансировать возможности расширения м-ния B2B с более масштабными целями. К приоритетным областям относятся потенциальные продолжения месторождения B2B и лежащей в его основе высокосортной порфировой системы, перспективные участки вокруг расширенной минерализованной зоны B2B, а также цели, расположенные вдоль геологических и геофизических тенденций, которые могут представлять собой продолжения или дополнительные центры минерализации. На этапе VII также будут изучены возможности обнаружения минерализации ближе к поверхности.

ATEX Resources — развивает свой флагманский медно-золотой проект Валериано, расположенный в регионе Атакама III в Чили.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

STERLING METALS CORP. - РАСШИРЯЕТ МЕДНУЮ ЗОНУ ПРОЕКТА CORE MEPS, ОНТАРИО.

16 сентября 2026 г.

Буровые скважины были пробурены к западу от пр-ния MEPS в рамках программы ГРП по проверке масштабов, непрерывности и структуры более крупной медной системы. Бурение на Западном участке продолжает демонстрировать масштаб и непрерывность растущего 700-м керна медно-порфировой системы MEPS в пределах 1,3-км зоны минерализации

Основные моменты:

Скважина пересекла пласт с содержанием меди 0,37% CuEq на глубине от коренных пород до конца скважины, в том числе 200 м с содержанием меди 0,53% CuEq, 101,9 м с содержанием меди 0,81% CuEq и 13,25 м с содержанием меди 1,82% CuEq.

В результате бурения была выявлена геологически непрерывная зона значительной медной минерализации протяженностью 700 м (медная зона MEPS) в более обширном медно-рудноносном участке размером 1,3 км на 600 м. Оба участка остаются открытыми для дальнейшего расширения.

В буровых скважинах были обнаружены медно-содержащие жилы порфирового типа, залегающие в тех же калиевых измененных основных вулканических и кислых порфировых породах, которые были обнаружены при предыдущем бурении, что еще раз подтверждает непрерывность геологического строения MEPS (рис. 1).




Рис. 1 План зоны MEPS в более широком рудном теле размером 1300 x 600 м (а) и продольный разрез простираения медной зоны MEPS на 700 м (б).

Медно-порфировая система MEPS характеризуется широкой приповерхностной минерализацией меди, залегающей преимущественно в измененных неоархейских вулканических породах, в которые вторглись многочисленные фазы мезопротерозойского кислого порфира. Исследования показали, что более богатые медью породы обычно залегают рядом с ранними кислыми дайками и силлами, а также с богатыми магнетитом прожилками, в то время как в более глубоких частях системы, в базальтах, гидротермальных брекчиях и гранитных порфирах, содержится больше молибдена.

Пересечен тот же комплекс базальтовых вулканических пород и кислых интрузивных фаз, которые встречаются и в других местах на участке MEPS и содержат различные фазы порфировых жил с сульфидами меди, связанные с калиевыми изменениями (биотитово-магнетитовые измененные вмещающие породы; жилы с калиевыми полевыми шпатами). На глубине от 225,13 до 225,48 м встречается заметная богатая магнетитом жила с содержанием 2,71% CuEq на протяжении 0,35 м.

Sterling Metals Corp. — флагманский проект компании включает в себя территорию площадью более 35 тыс га в медном поясе Батчевана.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

HIGH TIDE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА LABRADOR WEST IRON PROJECT.

16 сентября 2026 г.

На данный момент компания пробурила 25 скважин. Общий объем бурения превышает 6150 м. КERN высокого и среднего качества, в среднем около 250 м на скважину (рис. 1)




Рис. 1 Проект «Лабрадор-Уэст» —текущие границы минеральных ресурсов и расположение скважин (а) и разрезы с анализами (б).

Лабрадорская котловина на западе Лабрадора и в прилегающем Квебеке является основным районом добычи железной руды в Канаде. Здесь находятся м-ния мирового класса, которые разрабатываются уже более полувека. На сегодняшний день здесь добыто более 2 млрд т железной руды, и считается, что потенциал роста очень значителен. Высокое качество м-ний в этом регионе позволяет производить широкий спектр продукции, в том числе высококачественный концентрат и окатыши как для доменных печей, так и для прямого восстановления.

High Tide - специализируется на проекте Labrador West Iron, на территории которого находятся предполагаемые минеральные ресурсы NI 43-101 в количестве 655 млн тонн с содержанием железа 28,84%

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРП, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

QUEBEC INNOVATIVE MATERIALS CORP - ПРОВОДИТ 2D-СЕЙСМОРАЗВЕДКУ НА ПРИРОДНЫЙ ВОДОРОД В КВЕБЕКЕ И НОВОЙ ШОТЛАНДИИ.

8 сентября 2026

Собранная информация будет использована для определения направления бурения, испытаний под давлением, испытаний на приток и определения характеристик скоплений.

Эта комплексная 78-км сейсморазведка в двух измерениях знаменует собой важный переход к следующему этапу производственного процесса. Сейсморазведка в двух измерениях использует звуковые волны для составления карты подземных структур. Эта программа неинвазивна и не требует бурения взрывных скважин, использования взрывчатых веществ, гидроразрыва пласта или стимуляции пласта.

Программа в Квебеке подготовит почву» для реализации пилотного проекта. Программа в Новой Шотландии объединяет данные, полученные в ходе буровых работ 6 тыс образцов почвенного газа и данные магнитометрии грунта, чтобы составить карту глубинного строения, лежащего в основе 43-км разведочного коридора.

Это исследование проводится после того, как компания сообщила о процентном содержании водорода в двух буровых центрах, расположенных на расстоянии 15 км друг от друга, в том числе о содержании 30% H_2 в буровом газе в скважине в Беннетт-Хилл, Новая Шотландия, — это рекорд компании. Программа 2D-сейсморазведки предназначена для того, чтобы понять, как результаты бурения и обширные поверхностные аномалии QIMC соотносятся с более широкой геологической системой.

<https://www.canadianminingjournal.com/news/qimc-launches-78-km-natural-hydrogen>

UNION POWER METALS - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МАРГАНЦЕВОМ ПРОЕКТЕ МИХАЛОВА, СЛОВАКИЯ.

11 сентября 2026 г.

Компания приступила к бурению 25 скважин для проверки исторической геологической информации и получения свежего материала для металлургических испытаний. Эта программа представляет собой важный шаг в технической оценке месторождения Михалова, проводимой компанией Union Power. Она сочетает в себе современное бурение и аналитическую работу с обширным массивом исторических геологоразведочных данных (рис. 1).




Рис. 1 План бурения на проекте Михалова.

Проект оксидов и карбонатов марганца Михалова расположено в центральной Словакии, текущая программа Union Power направлена на применение современных методов ГРП, анализа и металлургии к историческим геологическим данным для оценки потенциала проекта.

Union Power Metals Corporation — специализируется на реализации высокопотенциальных проектов по добыче марганца в Словакии, сохраняя при этом интерес к урановым активам в Ботсване.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРП, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

АРЕХ CRITICAL METALS CORP. РАСШИРЯЕТ ЗОНУ TRINITY НА ПРОЕКТЕ RIFT ПО ДОБЫЧЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ НЕБРАСКЕ.

8 сентября 2026 г.

Скважины, пробуренные в западной части проекта, пересекают гематитовые изменения. Зона Тринити теперь простирается на 500 м в направлении с севера на юг и на 300 м в западном направлении (по падению) с сильно минерализованными интервалами от 80 до 197 м, которые по-прежнему демонстрируют непрерывность редкоземельной минерализации (рис. 1).



Рис. 1 План бурения проекта «Рифт» (а) и разрез зоны Trinity (б).

Скважина подтверждает важность гематитовых изменений в минерализованной системе и указывает на возможное дальнейшее простираение зоны Тринити в направлении падения. В этом районе скважина вскрыла другую вмещающую породу — карбонатитовую брекчию, которая, как предполагается, залегает вкрест первичного измененного гематита, наблюдаемого на большей части зоны Тринити. Скважина дала 64,4 м породы с содержанием редкоземельных элементов 1,54% с отдельными интервалами более высокого содержания.

Пробурено в общей сложности 34 скважины общей протяженностью 22 тыс м, по 15 скважинам проводятся ГРП. Ожидается, что бурение продолжится.

Apex Critical Metals Corp. — канадская геологоразведочная компания, специализирующаяся на реализации проектов по добыче редкоземельных элементов (РЗЭ) и ниобия в США и Канаде. Флагманский проект компании Rift расположен в перспективном карбонатитовом комплексе Элк-Крик в Небраске, США.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

АТНА ENERGY CORP. - О РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ АНГИЛАК В НУНАВУТЕ.

8 сентября 2026 г.

Программа ГРП Angilak Exploration выявила непрерывность минерализации на протяжении 1,45 км вдоль основного структурного коридора RIB North, расположенного на восточной оконечности MRC. Кроме того, вторичный минерализованный горизонт, расположенный на западном фланге MRC успешно прослежен на участке протяженностью около 220 м.

На участке RIB North Discovery бурение сосредоточено на широко разнесенных ступенчатых выходах, призванных подтвердить непрерывность урановой минерализации на участке RIB North. Оруденение остается открытым во всех направлениях. Все семь скважин, пересекли урановую минерализацию. Скважины пересекли 20,0 м общей комплексной урановой минерализации в пятнадцати зонах на глубине от 494,0 до 700,5 м. В интервале с самым высоким качеством минерализации на участке от 661,5 м до 663,0 м было обнаружено 1,5 м комплексной

минерализации со средним показателем 8453 CPS и максимальным показателем 26 680 CPS, включая более 0,6 м высокосортной минерализации. (рис. 1).




Рис. Карта проекта Ангилак — целевые зоны (чёрные прямоугольники) и участки с минерализацией (а) и минерализованный коридор поискового бурения (б).

Минерализация как в первичном, так и во вторичном минерализованном горизонте представляет собой структурно контролируруемую урановую минерализацию в фундаменте, связанную с сильными альбитовыми и гематитовыми изменениями, графитовыми + сульфидсодержащими структурами и наложенной силикатизацией. Успешные результаты последующих исследований подтверждают точность геологической модели АТНА и ее представлений о факторах, влияющих на минерализацию в районе RIB. В оставшейся части программы GPP на проекте Ангилак компания продолжит применять системный подход, ориентируясь на широко разнесенное бурение для расширения простираения минерализованного участка на пр-нии RIB North.

Программа ГРР на Ангиллак является крупнейшей на сегодняшний день и состоит из двух компонентов:

Во-первых, бурение на расширение и поиск новых пр-ний вдоль выявленных на данный момент минерализованных коридоров.

Во-вторых, аэрогеофизика, включающая в себя магниторазведку, и 3D-инверсионного моделирования.

Геофизическая составляющая программы ГРР направлена на выявление и продвижение дополнительных целей и получения данных для более детальной характеристики геологической структуры и уранового потенциала бассейна Ангикүни.

Полученные в результате исследования данные будут использованы для создания трехмерной инверсионной модели всего бассейна Ангикуни.

АТНА —портфель компании включает три урановых проекта - проект Angilak в Нунавуте, CMB Discoveries в Лабрадоре и недавно обнаруженный в бассейне Атабаски высокосортный урановый участок GMZ).

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ISOENERGY LTD. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ LAROCQUE EAST (м-ние ХАРРИКЕЙН), АТАБАСКА.

8 сентября 2026 года

Программа бурения была расширена до 8 тыс м в 20 скважинах (рис. 1).




Рис. 1 Структуры в районе Харрикейн, три тектонических пояса: Северный, Главный и Южный пояс.

Бурение было направлено на расширение минерализованного участка «Харрикейн». Для достижения цели было пробурено 26 скважин, три из которых в песчанике, общей протяженностью 10,2 тыс м.

В пределах Южного тренда шесть скважин прошли по разломам J и K, а семнадцать — по разлому L. Скважина прошла по разлому L в пределах существующего оруденения и расширила зону повышенной радиоактивности - 4,21% U_3O_8 на глубине 3,5 м, в том числе до 11,6% U_3O_8 на глубине 1,0 м на 11 м к западу.

Геологическая интерпретация «Харрикейн» обновляется на основе информации, полученной из пробуренных скважин. Геохимические результаты будут добавлены по мере их получения, а новая и существующая информация будет интегрирована при оценке потенциала целевых участков для будущего бурения.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) — реализует проект *Larocque East* в канадском бассейне Атабаска, где находится м-ние Харрикейн, обладающее самыми богатыми в мире подтвержденными запасами урана.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

TERRA BALCANICA RESOURCES CORP. - ВЫЯВИЛА РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ НАД ОЗЕРОМ ШАРЛО-НИЛИ В САСКАЧЕВАНЕ.

4 сентября 2026 года

Терра Норт получила данные аэрофотосъемки над ее флагманским проектом «Шарлот-Нили-Лейк» в 20 км к северу от Ураниум-Сити, провинция Саскачеван. Съемка протяженностью 2,4 тыс линейный км на площади 163,7 км² проекта обеспечила покрытие с высоким разрешением и выявила множество радиометрических аномалий, интерпретируемых как связанные с ураносодержащими источниками, включая несколько, расположенных вдоль заметных проводников северо-западного направления (рис. 1).




Рис. 1 Выявленные радиометрические аномалии на карте электромагнитных проводников и линеаментов.

Съемка проводится с интервалом в 75 м по направлению E-W и с интервалом в 1000 м по линиям связи, ориентированным на N-S.

Система сфокусированного гамма-спектрометра с 16 детекторами обнаружила 7 (U, Th) радиометрических аномалий после облёта предварительных линий связи, ориентированных с севера на юг.

Магнитометр CS-III с частотой дискретизации 1000 Гц позволил выделить два основных магнитных домена, разделённых разломом Блэк-Бэй, простирающимся с северо-востока на юго-запад, которые примерно соответствуют палеопротерозойским кристаллическим породам фундамента областей Биверлодж и Землак субпровинции Рей. Землакский домен включает в себя слоистые и гнейсовидные гранитоидные породы предполагаемого архейского возраста, а также локально графитизированные псаммопелитовые и пелитовые гнейсы и мигматиты, а также широко распространенные лейкограниты предполагаемого раннепротерозойского и/или позднеархейского возраста (рис. 2).




Рис. 2 Основные линии связи полного радиометрического градиента с точностью до 20 м (а) и два магнитных домена: магнитные гнейсовые гранитоиды Землака на северо-западе и кварц-полевошпатовые гнейсы Биверлодж на юго-востоке с разломом Блэк-Бэй в качестве литоструктурного контакта (б).

К породам относятся: 1) ортогнейсы с переменным магнитным полем, 2) пелитовые гнейсы и мигматиты, а также производные диатектиты, 3) лейкограниты с локальным содержанием граната и 4) породы, которые слишком сильно изменены и милонитизированы, чтобы их можно было классифицировать. В районе Биверлодж находится северная окраина бассейна Атабаска, которая проходит вдоль самой южной точки полуострова Крэкингстон. На этом несогласном контакте видны выходы кварцитов/кварц-полевошпатовых гнейсов формации Мурмак-Бей, перекрытых песчаниками, брекчиями и базальными конгломератами супергруппы Атабаска возрастом от 1,71 до 1,50 млрд лет, которые выходят на поверхность периодически и иногда стратиграфически перевернуты.

Terra Balcanica — владеет активами из перспективных на уран участков в всемирно известном бассейне Атабаска.

<https://terrabresources.com/en/2026/09/04/terra-balcanica-spin-off-terra-north-resources>

DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ MOBILEMT, НА УЧАСТКАХ ÖSTERKÄLEN И MALGOMAJ ПРОЕКТА ALUM SHALE В ШВЕЦИИ.

9 сентября 2026 г.

Все 15 пробуренных скважин пересекли графитово-черный сланец, который, по всей видимости, является алумским сланцем. Эти участки никогда не бурились в рамках поисков урана..

На участке Österkälen было пробурено 787 м в семи скважинах, а на участке Malgomaj — 1156 м в восьми скважинах. Таким образом, общий объем бурения составил 1943 м (рис. 1).




Рис. 1 Буровые скважины на участках Österkälen (а), Malgomaj № 1003 (б) и Malgomaj № 1002.

Наблюдаемые сланцы визуально различаются на сильно графитовые черные сланцы с обильными кальцитовыми прожилками и пиритовыми конкрециями и слабо- или умеренно

графитовые серые или темно-серые слоистые сланцы, все, вероятно, относящиеся к формации алюмосланцев.

Программа бурения была нацелена на ярко выраженные проводящие аномалии, выявленные в ходе вертолетного магнитотеллурического исследования (Mobile Magneto-Telluric, MobileMT), которое доказало свою эффективность при картировании графитированных глинистых сланцев на участке Викен. Аномалии MobileMT, выявленные в ходе бурения, также совпали с геохимическими аномалиями урана в почве, что является дополнительным подтверждением наличия минерализованных горизонтов алумских сланцев.

District Metals Corp. — урановая полиметаллическая геологоразведочная компания, специализирующаяся на своем флагманском проекте Viken в Швеции. Проект Viken содержит крупнейшие в мире неразработанные минеральные ресурсы урана наряду со значительными минеральными ресурсами ванадия, калия, молибдена, никеля, меди, цинка и других важных и критически значимых видов сырья.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

PUREPOINT URANIUM GROUP INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ DORADO NOVA TARGET БАССЕЙН АТАБАСКА, ПРОВИНЦИЯ САСКАЧЕВАН, КАНАДА.

10 сентября 2026 г.

В скважине было обнаружено 1,65% U_3O_8 на глубине 0,3 м от 390 м до несогласия. В рамках программы бурения урановая минерализация была обнаружена в нескольких скважинах, пробуренных через электромагнитный (ЭМ) проводник Нова, что обеспечило дополнительный геологический и структурный контроль для дальнейших поисков.

Программа включала девять скважин, предназначенных для изучения геологических и структурных факторов, связанных с урановой минерализацией на участке Нова, а также для уточнения геометрии рудного тела для последующих поисков. Самый высокий показатель в интервале от 390,4 до 390,7 м с интервалом 0,3 м содержание составило 1,65% U_3O_8 . В этом интервале средний гамма-ответ составил 61 070 импульсов на 0,3 м.

Скважина пересекла более широкий минерализованный интервал с содержанием 0,04% U_3O_8 на протяжении 3,9 м от 412,6 до 416,5 м, в том числе 0,10% U_3O_8 на протяжении 0,4 м от 415,1 до 415,5 м. На отдельном интервале от 418,2 до 418,6 м было обнаружено 0,79% U_3O_8 на глубине 0,4 м и средний гамма-ответ 37 050 импульсов в секунду.

Проект «Дорадо» расположен на восточной окраине бассейна реки Атабаска в провинции Саскачеван, Канада. Участок охватывает перспективные структурные коридоры, которые считаются благоприятными для урановой минерализации, связанной с несогласиями.

На проекте Дорадо находится м-ние Нова Дискавери, где в результате предыдущего бурения были получены пробы с содержанием до 8,1% U_3O_8 на глубине 0,4 м и 1,62% U_3O_8 на глубине 2,1 м. Урановая минерализация была выявлена вдоль перспективного структурного коридора протяженностью около одного километра и связана с интенсивными изменениями, структурными нарушениями и графитизированными породами фундамента (рис. 1).




Рис. 1 Карта бурения в рамках проекта Nova Discovery, Dorado JV.

Исследования на проекте Дорадо направлены на улучшение понимания геометрии и непрерывности минерализованной системы Нова, а также на оценку дополнительных приоритетных объектов.

Бурение позволило компании Purepoint уточнить интерпретацию электромагнитного проводника Нова и связанных с ним геофизических откликов, которые будут использованы при дальнейшем разведочном бурении.

Purepoint Uranium Group Inc. - управляет проектом «Дорадо, где в результате разведки Nova Discovery были получены подтвержденные результаты с содержанием до 8,1% U_3O_8 , а минерализованный коридор теперь простирается на один километр.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

MYRIAD URANIUM CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА COPPER MOUNTAIN URANIUM PROJECT В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШТАТА ВАЙОМИНГ.

10 сентября 2026 г.

Текущая программа бурения на м-нии Мириад направлена на достижение двух основных целей: подтвердить наличие минерализации, которая лежит в основе исторической оценки ресурсов в 26,63 млн фунтов эвтектоидного U_3O_8 , и получить современные данные для будущей оценки неразведанных минеральных ресурсов. В скважине была зафиксирована самая высокая концентрация eU_3O_8 — 1368 ppm (рис. 1).




Рис. 1 План бурения на м-нии Gem.

Урановая минерализация встречается в основном в виде настурана и коффинита, покрывающих трещины в граните, а также в виде вторичного уранофана и аутунита. Минерализация тесно связана со структурой: наибольшие концентрации наблюдаются в местах пересечения разломов и там, где плотность трещин выше. Сочетание нисходящих ураноносных грунтовых вод и восходящих углеводородов создает восстановительные условия, а пирит считается основным восстановителем, ответственным за осаждение урана. Минерализация в основном сосредоточена в окисленных и измененных гранитах на глубине ~61 м и становится более спорадической ниже этой основной измененной зоны.

Оценка запасов урана на м-нии Гем составляет 1,44 млн фунтов eU_3O_8 в 3,07 млн т при содержании 234 ppm eU_3O_8 с порогом в 100 ppm.

Данные были использованы для разработки генетической модели урановой минерализации в докембрийских и эоценовых осадочных породах, а также для разработки системы структурной оценки в контрольной зоне с высокой степенью достоверности, чтобы заложить основу для оценки урановой минерализации на всей оценочной территории. В конечном счете модель основывалась на взаимосвязи между структурой и урановой минерализацией, которая является основным фактором, определяющим минерализацию в гранитах района Коппер-Маунтин. Разработанная система оценки благоприятности структуры (помимо благоприятной гранитной вмещающей породы) была основана на следующих параметрах и их потенциальном вкладе в структурную подготовку: 1) наличие грабена (ов); 2) наличие крупной зоны (н) разломов, простирающихся с востока на запад; 3) наличие пересечений разломов; 4) наличие

разнонаправленных вспомогательных разломов; и 5) расположение вдоль известного или предполагаемого благоприятного структурного тренда.

Myriad Uranium Corp. - в районе Конпер-Маунтин находится несколько исторических урановых м-ний и бывших рудников

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

IMC RARE EARTHS LTD - ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРБИЯ НА ПРОЕКТЕ ИТАРАНТИМ В БРАЗИЛИИ.

10 сентября 2026 г.

Результаты лабораторных металлургических испытаний на проекте по использованию ионообменной глины в Итарантиме в Бразилии - восстановление тербия до 95,2% и успешное производство смешанного карбоната редкоземельных элементов.

Сочетание высокого содержания тербия и высокой степени выщелачиваемости особенно важно, так как указывает на высокое содержание редкоземельных элементов и оптимальные условия для их извлечения. Компания считает, что благодаря этим результатам Itarantim входит в число проектов по разработке ионно-адсорбционных глин с высоким содержанием тербия, которые в настоящее время оцениваются по всему миру.

IMC стремится удовлетворить эту потребность с помощью Itarantim — проекта по добыче ионно-адсорбционной глины в Бразилии, где сосредоточено около 1,1 млрд т предполагаемых минеральных ресурсов, содержащих все четыре основных редкоземельных элемента: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Содержание тербия особенно высокое и составляет в среднем 8 ppb в материале в пределах предполагаемого объекта площадью 105,8 млн т.

При ионно-адсорбционной глинистой минерализации выщелачиваемость является ключевым показателем того, насколько легко редкоземельные элементы могут высвободиться из глины и переходить в раствор. Высокие показатели извлечения тербия, достигнутые в ходе лабораторных исследований, являются важным показателем характеристик минерализации Итарантим.

Следующий этап испытаний направлен на дальнейшее количественное определение показателей извлечения и характеристик смешанного карбоната редкоземельных элементов, что позволит получить дополнительные данные для оценки потенциальной траектории развития проекта компанией IMC.

IMC Rare Earths Ltd — основной проект — Itarantim, м-ние редкоземельных элементов на основе ионно-адсорбционной глины, расположенное в штатах Баия и Минас-Жерайс, Бразилия.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-release>

MEDARO MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ РЗЭ BASTNAS, ШВЕДИЯ.

10 сентября 2026 г.

На территории проекта Бастнес преобладают палеопротерозойские кислые вулканические породы и связанные с ними осадочные слои, такие как доломиты и древние пепловые пласты. Геологические породы подверглись обширным гидротермальным изменениям с проникновением железа, магния и кальция, что привело к образованию множества скарных минералов, таких как актинолит, тремолит, магнетит и кордиерит.

Многофазная деформация в сочетании с периодами регионального кислого и основного магматизма сформировала сложную геологическую структуру, в которой происходили эпизодические процессы минерализации. Доминирующие горизонты магнетита активно разрабатывались, как и залежи медных и золотых сульфидных руд. История Бастнеса тесно связана с открытием церита и последующим обнаружением множества минералов редкоземельных элементов, в частности фторкарбонатного бастнезита.

Было собрано в общей сложности 218 образцов горных пород из самых разных обнажений по всей территории проекта. Программа была поддержана магнитной съемкой с помощью дрона с низким разрешением и малой высотой полета, которая была проведена по всей территории, на

которую распространяются разрешения. Было выявлено несколько перспективных участков для дальнейшей поисков. Для их дальнейшей оценки запланированы дополнительные минералогические исследования и бурение.

Результаты программы отбора проб с поверхности свидетельствуют о том, что проект Бастнес является полиметаллическим. Содержание важнейших металлов варьируется от 9,7% до 33% от общего количества редкоземельных оксидов (TREO), а также присутствуют значительные запасы золота, меди, серебра, галлия и вольфрама.

Отдельные пробы породы показали содержание до 16,5 г/т золота и 23,7% меди, 0,31% вольфрама, 260,1 г/т оксида галлия и 0,34% кобальта. Из общего числа собранных образцов содержание TREO превышало 1,0%, в том числе в девяти образцах содержание TREO превышало 10%, а содержание оксида неодима-празеодима (NdPr) составляло 19–24%.

По мнению компании, эти результаты свидетельствуют о том, что в минерализованной системе Бастнес присутствует весьма разнообразный комплекс значительных редкоземельных и полиметаллических месторождений, что является основанием для дальнейших систематических ГРП (рис. 1).




Рис. 1 Распределение проб на медь (а) и на TREO (б).

Из 218 образцов в 56 содержание меди превышало 1,0%. В общей сложности в 10 из этих образцов было проанализировано содержание Меди >10%. В 35 были получены первоначальные результаты анализа, согласно которым содержание лантана, церия и иттрия превышало 0,3%. Это стало критерием для проведения дальнейшего анализа всего набора редкоземельных элементов. В девяти образцах содержание TREO превышало 10%.

В результате анализа были получены следующие процентные значения содержания легких редкоземельных оксидов (LREO): оксид лантана ("La₂O₃") 9,51%, оксид церия ("CeO₂") 15,78%, оксид праеодима ("Pr₆O₁₁") 1,56%, оксид неодима ("Nd₂O₃") 4,93%, оксид самария ("Sm₂O₃") 0,67% и оксид гадолиния ("Gd₂O₃") 0,38% (LREO 99,6% TREO). Образец также содержит 0,37% оксида иттрия, 1,75% фтора и 3,48% летучих веществ, не связанных с потерей массы при прокаливании.

Значение проекта «Бастнес» не ограничивается исключительной редкоземельной минерализацией. Результаты анализа, проведенного в рамках систематической программы отбора проб, показали наличие широкого спектра критически важных и стратегических металлов на всей территории проекта, включая редкоземельные элементы, галлий, кобальт, молибден и вольфрам, а также высококачественную медь, золото и серебро.

Medaro Mining Corp.— специализируется на приобретении и развитии высококачественных м-ний в Онтарио, Квебеке и Швеции.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

STEADRIGHT CRITICAL MINERALS – ГРП НА ПРОЕКТЕ РЗЭ-НИОБИЕВОГО КАРБОНАТИТА ПЕРИБОНКА, КВЕБЕК.

11 сентября 2026

Объект представляет собой незатратную возможность для ГРП на критически важные полезные ископаемые, стратегически расположенный в пределах известного щелочного интрузивного района, где находится единственный в Канаде действующий ниобиевый рудник.

Проект Перибонка охватывает отчетливую магнитную аномалию овоидной формы, которая, по интерпретации, представляет собой карбонатитовое или щелочное интрузивное тело, сравнимое с близлежащими системами, содержащими ниобий и тантал, которые связаны с Сагенийским грабеном (рис. 1).




Рис. 1 Положение проекта РЗЭ-ниобиевого карбоната Перибонка.

Ключевые геологические особенности

- Характерная магнитная аномалия овоидной формы с глубокими корнями и окружающим магнитным негативным кольцом.
- Покрыта тонкими отложениями аллювиального песка, при этом глубина залегания коренных пород оценивается в 30–60 метров

Steadright Critical Minerals Inc. —имеет долю в марокканской компании NSM Capital Sarl, владеющей более чем 192 кв. км ресурсов TitanBeach Titanium Project, а также проектом Copper Valley.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ATLANTICO ENERGY METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ГАЛЛИЙ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ПРОЕКТЕ NOVO CRUZEIRO В БРАЗИЛЬСКОЙ ЛИТИЕВОЙ ДОЛИНЕ.

11 сентября 2026 г.

Содержание оксидов редкоземельных металлов достигает 2806,7 промилле; содержание оксидов редкоземельных металлов в магнетите достигает 349,1 промилле, а содержание оксида галлия — 96,8 г/т. Самый высокий расчетный показатель содержания оксида галлия (Ga_2O_3) составил 96,8 г/т. Десять самых высоких расчетных значений содержания Ga_2O_3 варьировались от 88,7 до 96,8 г/т. Среднее значение содержания Ga_2O_3 составило 72,2 г/т, а медианное — 74,6 г/т.

На рисунке 1 результаты представлены в контексте выборки, показаны западная сетка и дополнительные места выборки.




Рис. 1 Местоположения поверхностных проб и результаты TREO в Ново-Крузейро.

Novo Cruzeiro — это проект по разведке на поверхности, находящийся на ранней стадии, без бурения, с неопределенными на данный момент запасами полезных ископаемых. Анализы поверхностных проб и геохимические показатели являются только индикаторами для ГРП.

Atlantico Energy Metals Corp. — флагманский проект компании — проект по добыче лития и редкоземельных элементов в Ново-Крузейру, расположенный на северо-востоке штата Минас-Жерайс, Бразилия, в Литиевой долине.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GREENLAND MINES LTD - РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ VTM СКЕРГААРД и RZM САРФАРТОК В ГРЕНЛАНДИИ.

11 сентября 2026 г.

На проекте Скергаард горизонты 0 и 3 являются частью ресурсопределяющей структуры, установленной для оценки минеральных ресурсов. В горизонте 0 залегает нижняя минерализация с преобладанием палладия, а в горизонте 3 — более обогащенный золотом материал, расположенный выше. Горизонты VTM представляют собой непрерывные в латеральном отношении оксидные интервалы, чередующиеся с горизонтами драгоценных металлов, что отражает характерное для интрузии сочетание мелкозернистой системы драгоценных металлов и более крупнозернистой системы оксидов железа, титана и ванадия.

Выбор участков для отбора всех трех основных объемных проб был основан на детальном геологическом картировании и смоделированных поверхностных обнажениях горизонтов с преобладанием золота, палладия и платины, а также интервалов VTM, которые были сопоставлены с данными геохимического анализа.

Программа на Сарфарток направлена на создание целостной, подробной геологической и структурной карты северного участка, где находится как основная ресурсная зона ST1, так и несколько дополнительных объектов для поисков редкоземельных металлов. Команда собирает образцы горных пород для геохимического анализа, включая портативные рентгенофлуоресцентные измерения в полевых условиях и лабораторный анализ цельных пород, чтобы уточнить оценку содержания и масштабов минерализации, а также выявить новые, ранее не обнаруженные пр-ния.

Программа также включает использование портативных геофизических приборов и топографическое картографирование с помощью дронов для создания детальных ортофотопланов и цифровой модели рельефа исследуемой территории. Это позволит получить дополнительный структурный контекст с высоким разрешением перед следующим этапом ГРП по расширению ресурсов на пр-нии Сарфарток.

Greenland Mines Ltd — занимается поисками и разведкой на проекте Скаргаард на юго-востоке Гренландии и на проекте по добыче редкоземельных металлов неодим-празеодим (Nd-Pr) в Сарфартоке на юго-западе Гренландии;

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЗАЯВЛЯЕТ О НАХОДКЕ 110 МЛН Т УРАНОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ.

14 сентября 2026 |

Саудовская Аравия обнаружила около 110 млн т ураносодержащей руды в регионе Медина. Королевство стремится развивать атомную энергетику и расширять собственные запасы. Саудовская Аравия продолжает разведку урановых м-ний и рассматривает возможность извлечения металла в качестве побочного продукта при производстве удобрений.

ГРП выявили предполагаемые запасы руды в размере около 110 млн т с высокой концентрацией редкоземельных минералов, особенно тяжёлых элементов, а также многообещающие залежи урана.

Это заявление открывает потенциально важный внутренний источник урана, поскольку Саудовская Аравия стремится внедрить атомную энергетику в свою энергетическую систему, в которой исторически доминировали нефть и природный газ.

Нет информации о содержании урана в руде и ее количества, что оставляет неопределёнными потенциальные масштабы и экономическую целесообразность извлечения радиоактивного металла. Сам по себе тоннаж руды не определяет размер урановых запасов. Концентрация, минеральный состав, коэффициент извлечения и затраты на разработку помогут определить, можно ли в конечном итоге наладить коммерческое производство.

Это открытие произошло на фоне углубления ядерного сотрудничества Эр-Рияда с Вашингтоном и Канадой. В июле США и Саудовская Аравия достигли соглашения, направленного на развитие гражданской ядерной программы в королевстве и, возможно, на разрешение обогащения урана на территории Саудовской Аравии. 30-летнее многомиллиардное соглашение отводит американским компаниям центральную роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, ограничивая возможности иностранных конкурентов.

Последние результаты ГРП в Саудовской Аравии могут в конечном итоге обеспечить королевство еще одним звеном уранового цикла, хотя из-за отсутствия информации о качестве руды пока рано говорить о том, сможет ли м-ние Медина стать экономически выгодным источником для внутреннего рынка.

<https://www.mining.com/saudi-arabia-touts-110-million-tonnes-of-uranium>

АВСТРАЛИЙСКИЕ УРАНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ - ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К ШАХТАМ В НАМИБИИ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

10 сентября 2026

Две австралийские горнодобывающие компании продвигают планы по реализации крупных урановых проектов в Намибии, присоединяясь к китайским компаниям в этой стране, в то время как страны по всему миру осваивают атомную энергетику.

Компании Bannerman Energy Ltd. и Deep Yellow Ltd., обе со штаб-квартирами в Перте, стремятся извлечь выгоду из улучшения перспектив на рынке урана, который восстанавливается после длительного спада, вызванного аварией на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Аналитики прогнозируют увеличение дефицита предложения.

Страны от Китая до США и Индии делают ставку на атомную энергетику как низкоуглеродный способ удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, вызванного увеличением доходов населения, распространением электромобилей и развитием искусственного интеллекта. Кроме того, у Вашингтона есть соображения национальной безопасности, связанные с желанием сократить импорт обогащенного урана из России. Повышение цен побудило компании ускорить реализацию проектов по добыче, которые были отложены или законсервированы во время экономического спада.

Ванпегман ожидает заключить сделку с Китайской национальной ядерной корпорацией до конца месяца о совместной разработке уранового рудника Этанго в этой южноафриканской стране.

В Намибии, третьем по величине производителе урана в мире после Казахстана и Канады, работают три урановых рудника.

Если совместное предприятие Баннермана будет завершено, CNNC приобретет 45% акций дочерней компании, владеющей 95% Etango, и внесет до 321,5 млн долларов на строительство рудника. Государственный гигант, управляющий растущим парком ядерных реакторов в Китае, получит право приобретать 60% продукции Etango, которая может быть введена в эксплуатацию уже в 2028 году.

Проект Tumas, реализуемый компанией Deep Yellow Ltd., находится на чуть более ранней стадии, но окончательное инвестиционное решение планируется принять к концу года.

«Нет никаких сомнений в том, что Китай продолжит строить эти реакторы», — сказал в интервью генеральный директор Deep Yellow Грег Филд, добавив, что «неизбежно» то, что другие страны последуют его примеру. «По мере увеличения разрыва между спросом и предложением цены на уран будут расти, что сделает более перспективными некоторые м-ния с более низким содержанием урана»

CNNC уже владеет 25% уранового рудника Лангер-Хайнрих в Намибии, который контролируется австралийской компанией Paladin Energy Ltd. и возобновил работу после шестилетнего перерыва. Компания также владеет контрольным пакетом акций Rossing Uranium, который работает уже пять десятилетий. Крупнейший рудник в стране, Хусаб, принадлежит China General Nuclear Power Group.

Намибия, которая импортирует большую часть электроэнергии и не производит ее на атомных электростанциях, стремится использовать собственный уран. Однако из-за небольшой численности населения и ограниченных финансовых возможностей страны малые модульные реакторы могут оказаться более подходящим вариантом, чем традиционные АЭС.

Технологические гиганты, в том числе Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc., поддерживают более дешевые реакторы заводского производства, стремясь обеспечить себя электроэнергией для центров обработки данных с ИИ.

Компании Etango и Tumas будут производить около 3,5 млн фунтов урана в год, что эквивалентно более чем 4% мирового объема добычи. Etango рассматривает возможность расширения, которое почти удвоит ее производственные мощности.

Компании Bannerman, которая более двух лет назад приступила к подготовительным работам на Etango, еще предстоит найти клиентов для большей части своей доли в 40% будущих поставок.

<https://www.mining.com/web/australian-uranium-firms-eye-namibia-mines-for-nuclear>

VOLTA METALS LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЕКТЕ SPRINGER, ОНТАРИО, КАНАДА.

15 сентября 2026 г.

Основная минерализованная зона простирается от 103,5 м до 318,0 м с содержанием 0,80% TREO и 63,8 г/т Ga_2O_3 в красных «сиенитах», прорезанных белыми доломитовыми карбонатитовыми жилами. Интервал включает в себя 75,0 м с содержанием 1,02% TREO и 76,6 г/т Ga_2O_3 (124,5–199,5 м) (рис. 1).




Рис. 1. План-карта буровых скважин (а) и поперечные сечения редкоземельного оруденения (б).

Volta Metals Ltd. (CSE: VLTA) (FSE: D0W) (OTCQB: VOLMF) — занимается разведкой м-ний редкоземельных металлов, галлия, лития, цезия и тантала в Онтарио. Volta расширяет ГРП на редкоземельном проекте Спрингер площадью 4,8 тыс га.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА НИОБИЙ НА ПРОЕКТЕ БАРДИ В КВЕБЕКЕ.

15 сентября 2026 года

Целью программы бурения в Барди было пересечение ниобий-редкоземельных систем. Все восемь скважин были пробурены в местах, где пересекаются данные о радоне, магнитные данные высокого разрешения и аномалии на поверхности. Бурение пересекло 8-м интервал сиенитового пегматита от 139,70 м до 147,70 м, включая в которой в керне был обнаружен алланит (рис. 1).




Рис. 1 План Барди с радоновыми аномалиями и основным продолжением дайки (а) и поперечный разрез с анализами TREO и композитами (б).

Все скважины пересекали интрузивные породы (от кислых до основных), прорезающих гнейс. В кернах видны пегматиты (~3 м). Присутствие алланита в РЗЭ-содержащих породах было отмечено локально, но магнетит присутствует повсеместно.

Было также отмечено, что, даже если пегматиты являются основными породами, содержащими РЗЭ, другие интрузивы (от основных до промежуточных) также могут иметь минерализацию. Это интересно, учитывая, что геология Барди имеет сложную историю вторжений, которую еще предстоит прояснить.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. — в портфель входит участок Силвер-Лейк в рудном районе Оминек в Британской Колумбии, а также земельный участок площадью 30 тыс га в провинции Гренвилл в Квебеке.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>