



ФГБУ «ВИМС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-БЮЛЛЕТЕНЬ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРР
И ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ ПИ**

**ЧЕРНЫЕ (Fe, Cr, Mn, Ti, CaF₂ и др.),
ЦВЕТНЫЕ (Cu, Mo, W, Sn, Al и др.),
НЕРУДНЫЕ (графит, кремнезем, уголь и др.)
РАДИОАКТИВНЫЕ (U, Th)
РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ (Zr, Nb-Ta, Be, Li и др.)**

№ 357

сентябрь 2026 г.

Редактор-составитель: В.В. Коротков

СОДЕРЖАНИЕ:

Сырье	РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	Стр
PGE	1. FATHOM NICKEL – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ Ni-Cu-Co GOCHAGER LAKE В САСКАЧЕВАНЕ, КАНАДА.....	4
Cu	2. INTREPID METALS CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ И IP-MT НА ПРОЕКТЕ CORRAL COPPER В АРИЗОНЕ.....	5
PGE	3. MAGNA MINING INC. - РАСШИРЯЕТ ЗОНУ ПОДНОЖИЯ R2 НА ПРОЕКТЕ PGE ЛЕВАК В САДБЕРИ, ОНТАРИО.....	6
VMS	4. AVITIVI METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА VMS ПРОЕКТЕ B26 В КВЕБЕКЕ.....	7
W	5. ALLIED CRITICAL METALS – РАСШИРЯЕТ ВОЛЬФРАМОВЫЙ ПРОЕКТ BORRALHA ЗА СЧЕТ IP-НИИ САНТА-ХЕЛЕНА-БРЕКЧИЯ НА СЕВЕРЕ ПОРТУГАЛИИ.....	8
VMS	6. GROUP ELEVEN RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ VMS BALLYWIRE, ИРЛАНДИЯ.....	9
VMS	7. THUNDER MOUNTAIN GOLD – ГРП НА ПРОЕКТЕ VMS САУТ-МАУНТИН В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ШТАТА АЙДАХО.....	10
W	8. AMERICAN TUNGSTEN CORP. – ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ВОЛЬФРАМА НА ПРОЕКТЕ ИМА, ШТАТ АЙДАХО.....	11
Cu Au	9. ORETERRA METALS CORP – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ TREK SOUTH В ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.....	12
VMS	10. NICOLA MINING INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS МВ, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.....	12
W	11. WESTERN STAR RESOURCES INC. - ГРП НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ РОУЛЕНД, ШТАТ НЕВАДА, США.....	13
W Ag	12. SPARTAN METALS CORP. - ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УКАЗЫВАЮТ НА РАСШИРЕНИЕ ВОЛЬФРАМОВО-СЕРЕБРЯНОГО ПРОЕКТА EAGLE, ШТАТ НЕВАДА.....	14
Cu	13. KORYX COPPER - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТАХ LUANSHUYA WEST И MPONGWE В МЕДНОМ ПОЯСЕ ЗАМБИИ.....	17
Cu Mo	14. COPPER ONE RESOURCES CORP. РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ БУРЕНИЯ НА ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ MAJUBA HILL В НЕВАДЕ.....	18
W	15. GUARDIAN METAL RESOURCES PLC - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ TEMPIUTE В НЕВАДЕ.....	18
Cu Mo	16. BARKSDALE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ И СЪЕМКИ ZTEM НА Cu-Mo ПРОЕКТЕ САННИСАЙД В РУДНОМ РАЙОНЕ ПАТАГОНИИ НА ЮГЕ АРИЗОНЫ.....	19
Cu Mo	17. DLP RESOURCES INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ ESPERANZA, ПЕРУ.....	20
VMS	18. CANADIAN COPPER INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS МЮРРЕЙ БРУК В РУДНОМ РАЙОНЕ БАТЕРСТ В НЬЮ-БРАНСУИКЕ.....	21
Cu Au	19. ALGO GRANDE COPPER CORP – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА МЕДНО-СЕРЕБРЯНО-ЗОЛОТОМ СКАРНОВОМ УЧАСТКЕ СЕРРО-ГРАНДЕ ПРОЕКТА АДЕЛИТА В МЕКСИКАНСКОМ ШТАТЕ СОНОРА.....	21
Cu Au	20. MOGOTES METALS INC. - ПЛАНЫ ГРП НА СВОИХ ПРОЕКТАХ FILO SUR В АРГЕНТИНЕ И ЧИЛИ, BESKAUGA В КАЗАХСТАНЕ И COPPER CLIFF В МОНТАНЕ, США.....	22
VMS	21. ERRINGTON METALS CORP. - ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА VMS САДБЕРИ-БЕЙСИН В РУДНОМ РАЙОНЕ САДБЕРИ.....	23
PGE	22. POWER METALLIC MINES INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ PGE NISK-LION-TIGER.....	25
Cu Mo	23. COPPER GIANT RESOURCES – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ МОКОА В КОЛУМБИИ.....	25
Cu	24. KORYX COPPER - ЗАВЕРШАЕТ ПРОГРАММУ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ NAIB COPPER В ЮЖНОЙ НАМИБИИ.....	26
VMS	25. CASA MINERALS INC - НАЧИНАЕТ БУРЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ VMS ARSENAULT, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.....	27
Cu Au	26. TINTINA MINES LIMITED - БУРЕНИЕ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ DOS AMIGOS В ЧИЛИ.....	28
Cu Ni	27. NEXMETALS MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА Cu-Ni ПРОЕКТЕ СЕЛЕБИ В БОТСВАНЕ.....	28
Cu Mo	28. ANDINA COPPER CORPORATION - ПЕРЕСЕКАЕТ ПРИПОВЕРХНОСТНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ НА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ КОБРАСКО, В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЧОКО, КОЛУМБИЯ.....	29
Cu Au	29. TORR METALS INC. - БУРЕНИЕ CU-AU-ПОРФИРОВОЙ СИСТЕМЫ BERTHA NORTH НА ЮГЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.....	30
Cu Au	30. BLUE MOON METALS INC. – ПРОГРАММА ГРП НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ TURNER VMS В КЛЮЧЕВОМ РУДНОМ РАЙОНЕ НА ЗАПАДЕ США.....	31
W Au	31. COLLECTIVE MINING LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ВОЛЬФРАМ И ЗОЛОТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ БРЕКЧИЕВОГО М-НИИ АПОЛЛО, КОЛУМБИЯ.....	32
Cu Au	32. ATERRA METALS – ГРП НА ПРОЕКТЕ TOTORA Cu-Au, ЧИЛИ.....	33

Cu Au	33.	PACIFIC RIDGE EXPLORATION LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТЫХ ПРОЕКТАХ KLIYUL И RDP В КВЕСЧЕЛЬСКОМ ТЕРРЕЙНЕ В КАНАДЕ.....	34
Cu Au	34.	PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP - НАМЕТИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ EXCALIBUR В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.....	36
НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ			
K	35.	FIRST PHOSPHATE - ПОДТВЕРЖДАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШИХ ГРП НА ФОСФАТНОМ ПРОЕКТЕ БЕГИН-ЛАМАРИШ В СЕВЕРНОМ КВЕБЕКЕ.....	38
Gr	36.	GRAPHANO ENERGY LTD - ПРОГРАММА ГРП НА ПРОЕКТЕ BLACK JACK GRAPHITE DISCOVERY В КВЕБЕКЕ.....	39
РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ			
RZM	37.	NEOTECH METALS CORP. - ПРОГРАММА ГРП НА ПРОЕКТЕ ТОРРАНС ПО ДОБЫЧЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ФОСФАТОВ В ОНТАРИО, КАНАДА.....	40
U	38.	COSA RESOURCES CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ DARBY URANIUM, БАСЕЙН АТАБАСКА.....	40
U	39.	GREEN CANADA URANIUM CORP. - БУРЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА МАРШАЛЛ, БАСЕЙН АТАБАСКА.....	41
U	40.	XCITE URANIUM INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ ДОН ЛЕЙК, САСКАЧЕВАН.....	42
Li	41.	BRUNSWICK EXPLORATION INC. - ПЕРЕСЕКАЕТ СПОДУМЕНОВЫЙ ПЕГМАТИТОВЫЙ ИНТЕРВАЛ НА ПРОЕКТЕ MIRAGE В КВЕБЕКЕ.....	44
U	42.	PUREPOINT URANIUM GROUP INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ DORADO В БАСЕЙНЕ АТАБАСКА.....	44
U	43.	GEIGER ENERGY CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА УРАН В РАМКАХ ПРОЕКТА АБЕРДИН В БАСЕЙНЕ ТЕЛОН, НУНАВУТ.....	45
Sc	44.	SCANDIUM CANADA LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА СКАНДИЕВОМ ПРОЕКТЕ КРАТЕР-ЛЕЙК (TG) В НУНАВИКЕ, КВЕБЕК.....	46
U	45.	GREENRIDGE EXPLORATION - ПРОГРАММА ГРП НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ HOOK-CARTER, АТАБАСКА.....	47
RZM	46.	SPARK ENERGY MINERALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ГАЛЛИЙ-РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ПРОЕКТЕ ARARAÍMA, БРАЗИЛИЯ.....	47
U	47.	URANIUMX DISCOVERY CORP. - ГРАВИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА ПРОЕКТЕ МЕРФИ-ЛЕЙК В САСКАЧЕВАНЕ.....	48

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

ФАТНОМ NICKEL – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ПРОЕКТЕ Ni-Cu-Co GOCHAGER LAKE В САСКАЧЕВАНЕ, КАНАДА.

16 сентября 2026 г.

Скважины пересекли полумассивные и массивные пирротин-пентландит-халькопиритовые жилы и брекчии на участке длиной 21,44 м с минерализованным керном к юго-западу от медно-никелево-кобальтового месторождения Гочагер-Лейк, где содержание никеля превышало 1% в зонах повышенного содержания сульфидов.

Минерализованный перехват находится примерно в 75 м от первого разведочного участка и остается открытым с юго-западной стороны. Существует большой потенциал для расширения первого разведочного участка за счет включения в него этого минерализованного интервала. Скважины пересекли новую минерализованную зону с полумассивными и массивными сульфидными жилами и брекчиями на глубине 155 м к северо-востоку от первого разведочного участка. Сульфидная минерализация Ni-Cu-Co в этой зоне была обнаружена на 54,79 м минерализованного керна. Результаты анализа показали содержание до 0,70% Ni и 0,65% Cu.

Обнаружение этой новой зоны указывает на потенциал дальнейших исследований как с точки зрения расширения первоочередной минерализованной зоны в непосредственной близости от м-ния Гочагер, так и с точки зрения обнаружения дополнительных минерализованных тел в северо-восточном направлении.

Результат анализа на содержание платины 1,99 г/т подтверждает наличие минерализации платиноидов в системе минерализации медно-никелево-кобальтового месторождения Гочагер.

Бурение включало 8 скважин общей протяженностью 3094 м. В ходе программы были протестированы внескважинные проводящие зоны, выявленные с помощью электромагнитного каротажа (ЭМК) в ходе бурения, а также продолжено тестирование вдоль простирания медно-никелево-кобальтового м-ния Гочагер в основных и ультраосновных интрузивных породах, а также в метаосадочных породах на предмет выявления дополнительных зон медно-никелево-кобальтовой минерализации (рис. 1).




Рис.-1 План (а) и составной разрез А-А (б) бурения.

Медно-никелево-кобальтовое м-ние Гочагер-Лейк, согласно первой модели остается открытым для расширения. Ориентация метаосадочной медно-никелево-кобальтовой минерализации требует дополнительной интерпретации перед проведением дополнительного бурения.

Проводящие каналы ВНЕМ, изображенные в виде пластин на составном продольном разрезе, подтверждают распространение первичной медно-никелевой минерализации по простиранию в обоих направлениях и на глубину.

С помощью метода ВНЕМ удалось успешно выявить зоны повышенной рассеянной сульфидной минерализации, а также более проводящие зоны, состоящие из полумассивных и массивных сульфидных жил и брекчий с пирротинном, пентландитом и халькопиритом.

Текстуры и стили сульфидной минерализации соответствуют обширным вкрапленным сульфидным областям, в которых залегают крутопадающие минерализованные желоба с более высоким содержанием металлов, встречающиеся на медно-никелево-кобальтовом м-нии Гочагер.

Кроме того, при бурении на территории проекта продолжают обнаруживаться сульфидные жилы и прослойки, содержащие никель, медь и кобальт, которые пересекают первичные текстуры вмещающих интрузивных габброидных пород и окружающих осадочных пород.

Пересекающиеся сульфидные жилы и брекчии являются характерными признаками ремобилизованной сульфидной минерализации и подтверждают гипотезу о том, что жилы и брекчии образовались из более крупных сульфидных скоплений в пределах минерализованной системы месторождения Гочагер.

Все проведенные ГРП в рамках проекта подтверждают наличие открытой динамичной магматической сульфидно-никелевой системы в районе озера Гочагер. Остается открытым вопрос о реальных размерах ресурсов никеля, меди и кобальта в районе озера Гочагер и его геологическом положении в пределах выделенного 8-км продуктивного/перспективного коридора.

Компания продолжает разрабатывать стратегии ГРП и выдвигать гипотезы, подтверждающие тезис о том, что в этом многофазном интрузивном комплексе имеются более крупные скопления сульфидов от полумассовых до массивных. Бурение показало, что в метаосадочных породах также могут находиться более крупные скопления сульфидов от полумассовых до массивных.

Компания продолжит разрабатывать и совершенствовать рабочие геологические модели, чтобы лучше понимать факторы, влияющие на минерализацию, а также получать более полное представление о скважинах, поверхности и доступных аэрогеофизических проводниках, а также ранжировать постоянно расширяющийся список объектов для ГРП.

***Fathom Nickel Inc.** —располагает портфелем из трех высококачественных геологоразведочных проектов, расположенных в рудном Трансгудзоновом коридоре в Саскачеване, Канада.*

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

INTREPID METALS CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ И IP-MT НА ПРОЕКТЕ CORRAL COPPER В АРИЗОНЕ

16 сентября 2026 г.

Программа ГРП включает:

- примерно 5000 м были сосредоточены на расширении и дальнейшей оценке приповерхностного пр-ния замещения карбонатов (CRD) с медно-золотисто-серебряной минерализацией, выявленной в ходе предыдущего бурения;
- программа бурения (5000 м) специально разработанная для тестирования высокоприоритетных медно-золотых порфириковых пр-ний и оценки потенциального источника обширной минерализации CRD, выявленной в рамках Проекта; и
- IP-MT-съемка протяженностью 65 погонных км, предназначенная для дальнейшего уточнения высокоприоритетных объектов проекта по добыче порфира.

Начато бурение в зоне Холлидей, и первая часть программы бурения будет направлена на расширение известных медно-золото-серебряных пр-ний типа CRD в зонах Ринго, Клэнтон, Эрп и Холлидей (рис. 1).




Рис. 1 Предлагаемая программа бурения и IP-MT на проекте Коррал

Исследование IP-MT будет включать в себя 12 приемных линий ("Rx") на расстоянии примерно 400 м друг от друга, при этом длина отдельных линий будет варьироваться в зависимости от участка исследования. Приемные линии — это линии исследования, вдоль которых расположены приемные электроды и датчики для измерения электрических и электромагнитных откликов от подповерхностных слоев.

Конфигурация SWATH от Quantec позволит собрать три взаимодополняющих набора данных:

- удельное электрическое сопротивление на постоянном токе, которое позволяет составить карту изменений удельного электрического сопротивления горных пород и может помочь в определении геологических контактов, изменений и структур;
- удельная электропроводность на переменном токе, которая измеряет способность подземных материалов временно накапливать электрический заряд и может помочь в определении скоплений рассеянных сульфидных минералов; и
- удельное магнитное сопротивление, которое использует естественные электромагнитные сигналы для получения изображений удельного сопротивления на большей глубине, чем при использовании постоянного тока.

Ожидается, что вместе эти наборы данных обеспечат широкий охват недр на приоритетных участках и помогут выявить аномалии заряжаемости и удельного сопротивления, которые могут представлять богатые сульфидами интрузивные центры, зоны изменения или геологические структуры, связанные с потенциальной системой порфиров на глубине.

Ожидается, что в рамках программы бурения на участках с порфировыми пр-ниями будет пробурено 5000 м скважин. Это бурение станет первым, в ходе которого будут протестированы приоритетные медно-золотые объекты в порфировом стиле, а также оценен потенциальный источник обширной медно-колчеданной минерализации, выявленной в ходе предыдущих ГРП.

Результаты исследования методом IP-MT будут сопоставлены с геологическим картированием, геохимическими исследованиями поверхности, структурной интерпретацией, повторной регистрацией керна и другими полевыми работами для дальнейшего уточнения геологической модели проекта и определения местоположения и ориентации запланированных скважин для бурения порфировых пр-ний.

Intrepid Metals Corp. - основу портфеля компании составляет проект меди Коррал — перспективная система районного масштаба, находящаяся на продвинутой стадии ГРП.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

MAGNA MINING INC. - РАСШИРЯЕТ ЗОНУ ПОДНОЖИЯ R2 НА ПРОЕКТЕ PGE ЛЕВАК В САДБЕРИ, ОНТАРИО.

17 сентября 2026 года

Результаты включают дополнительные анализы, полученные в результате расширенного бурения в приконтактной зоне R2, картировочного бурения в промежуточном рудном теле, а также первичного бурения в приповерхностной части Западного главного рудного тела (рис. 1).




Рис. 1 Расположение объектов Magna Mining, включая проект Левак и инфраструктуру Садбери (а) и 3D- продольные разрезы минерализованных зон Левак и др. (б).

Результаты бурения в зоне прикровельной части пласта R2 сосредоточены на верхних частях известных участков минерализации, чтобы лучше определить жилы и понять их связь с рудным телом. Они включают результаты анализа проб из трех дополнительных клиновых скважин, пробуренных с поверхности, каждая из которых пересекла несколько минерализованных жил - на протяжении 91,5 м, включая 9,5% Cu, 2,6% Ni, 17,5 г / т Pt + Pd + Au и 24,9 г / т Ag (23,5% CuEq) на протяжении 2,1 метра от глубины скважины 999,2 метра, и успешно расширила бурение в зоне подножия R2 примерно на 30 м в направлении рудного тела, которое расположено на высоте 75 м. Зона R2 остается открытой в направлении зоны подножия, а также на глубине к югу.

При первоначальном бурении были обнаружены значительные залежи высококонцентрированной никелевой минерализации контактного типа, в том числе 1,7% Cu, 4,0% Ni, 3,5 г/т Pt+Pd+Au и 4,1 г/т Ag (8,3% экв.) на протяжении 4,6 м от глубины забоя 198,7 м в буровой скважине MLV-26-64 и 0,4% Cu, 1,7% Ni, 0,4 г/т Pt+Pd+Au, (2,9% ЭКВ.) на протяжении 32,9 м от глубины забоя 177,0 м в буровой скважине MLV-26-68. Эти результаты бурения на главном рудном теле находятся в пределах 150 м от поверхности. Планируется дополнительное бурение для изучения продолжения этой зоны вверх по падению, а также для исследования возможности неглубокой минерализации в прикровельной части, связанной с этой частью Главного рудного тела, учитывая повышенные содержания меди и драгоценных металлов в скважине

Magna Mining Inc. — основным активом компании является проект Маккриди-Уэст, , а также ряд перспективных объектов, на которых ранее велась добыча, включая Левак, Крин-Хилл, Подольский и Шекспир.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

АВІТІВІ METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА VMS ПРОЕКТЕ B26 В КВЕБЕКЕ.

17 сентября 2026 года

Флагманский проект компании B26 Polymetallic располагает значительной и постоянно растущей ресурсной базой: указанные: 12,96 млн т при 2,08% экв. куб. м (1,19% Cu, 1,16% Zn, 0,44 г/т Au и 30,8 г/т Ag); предполагаемые: 12,34 млн тонн при 2,20% CuEq (1,60% Cu, 0,16% Zn,

0,68 г /т Au и 8,1 г / т Ag). Результаты продолжают подтверждать высокую преэминентность запасов по мере реализации программы разработки ресурсов (рис. 1).




Рис. 1 Трассировка скважины B26 в плане (а) и с результатами в разрезе (б).

Скважины были пробурены на участке с более низким содержанием меди к западу от м-ния. В скважинах на глубине 3,3 м было обнаружено 0,50% CuEq (0,22% Cu, 0,30 г/т Au, 0,66 г/т Ag и 0,02% Zn), а также на глубине 2,0 м - 1,05 % CuEq (0,00 % Cu, 0,04 г/т Au, 7,70 г/т Ag и 2,96 % Zn)

Результаты подтверждают уверенность в дальнейшем росте и сохранении высококачественной минерализации на проекте B26. Эти результаты, а также данные, полученные в ходе текущей программы ГРП, будут учтены при обновлении данных о ресурсах м-ния B26, что повысит его ценность и снизит риски, связанные с ним, как с основой для создания долгосрочной стоимости.

Abitibi Metals Corp. - занимается поисками и разведкой м-ний VMS в Квебеке. Флагманский проект компании B26 Polymetallic.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ALLIED CRITICAL METALS – РАСШИРЯЕТ ВОЛЬФРАМОВЫЙ ПРОЕКТ BORRALHA ЗА СЧЕТ ПР-НИЯ САНТА-ХЕЛЕНА-БРЕКЧИИ НА СЕВЕРЕ ПОРТУГАЛИИ.

17 Сентября, 2026

Проект «Борралья» — один из крупнейших неразработанных вольфрамовых ресурсов в мире. Проект Borralha продвигается по двум параллельным направлениям: бурение, ориентированное на разработку, на брекчии Санта-Хелена, чтобы снизить риски при текущей разработке РЕА, и разведка районного масштаба на недавно открытой брекчии Вениз, примерно в 400 м к северо-западу, нацеленная на потенциальный рост за пределами минерализованной системы, в настоящее время входящей в состав РЕА.

Обнаруженные 81,5 м с содержанием 0,22% WO₃, включая 23,8 м с содержанием 0,68% WO₃ и 4,0 м с содержанием 2,96% WO₃, результаты по-прежнему указывают на обширные интервалы минерализации, содержащие внутренние зоны с более высоким содержанием вольфрама в брекчии Санта-Элена. Буровые работы на участке «Брекчия Санта-Элена» призваны повысить достоверность текущей оценки минеральных ресурсов, способствовать конверсии ресурсов, а также предоставить геотехническую и металлургическую информацию для текущих технических исследований. Буровые работы на участке «Брекчия Санта-Элена» направлены на систематическое снижение рисков проекта «Борралья», повышение достоверности оценки минеральных ресурсов и получение геологических, геотехнических, металлургических данных и информации для планирования разработки м-ния, необходимых для перехода проекта к стадии технико-экономического обоснования. (рис. 1)




Рис. 1 План проекта Борралья, программа бурения на участках Санта-Элена и Вениз (а) и поперечный разрез брекчии Санта-Элена на фоне текущей блочной модели ресурсов (б).

Параллельно с программой по изучению брекчии Санта-Элена компания Allied продолжает исследования недавно обнаруженной брекчии Венизе, расположенной в 400 м к СЗ от брекчии Санта-Элена.

Сочетание разведочного бурения на участке Санта-Элена и эксплуатационного бурения на участке Вениз позволяет компании Allied одновременно снижать технические риски, связанные с текущей концепцией проекта Борралья, и оценивать более масштабный потенциал минерализованной системы.

Текущая стратегия бурения направлена на достижение двух параллельных целей:

- (1) повышение геологической и технической достоверности данных о брекчии Санта-Элена для поддержки будущих проектных исследований;
- (2) продолжение разведки более обширного района Борралья на предмет обнаружения дополнительных систем минерализованных брекчий.

Allied Critical Metals Inc. — деятельность направлена на развитие и восстановление проектов по добыче вольфрама в Борралье и Вила-Верде на севере Португалии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GROUP ELEVEN RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ПРОЕКТЕ VMS BALLYWIRE, ИРЛАНДИЯ.

17 сентября 2026 г.

Балливайр, демонстрирует высокие содержания цинка, свинца, серебра, меди, германия и, локально, сурьмы (рис. 1).




Рис. 1. Региональные карты проекта Балливайр и прилегающих территорий (а) и гравиметрии - перспективный тренд длиной 6 км (б).

330 образцов из Ballywire были отправлены на анализ Ge с использованием "синтеза бората лития" ("старый метод"), и рекомендованный "синтез перекиси натрия" ("новый метод") для улучшения усвоения и минимизации потерь Ge в виде летучих веществ в процессе анализа, что привело к повышению точности. Новые результаты — 220 вышеуказанных образцов (из пяти буровых скважин) были повторно проанализированы с использованием нового метода, в результате чего содержание Ge в среднем на 68% выше по сравнению со старым методом (рис. 2).




Рис. 2. План главного коридора Балливайр с геологическими разрезами (а) и поперечными разрезами с результатами Ge (б)

Результаты свидетельствуют о более точном и значительном повышении содержания германия в Ballywire — одном из ключевых факторов ценности этого проекта.

Group Eleven Resources Corp. (TSXV: ZNG) (OTCQB: GRLVF) и (FSE: 3GE) - ведет бурение на самом крупном проекте в Ирландии. Балливайр, демонстрирует высокие содержания цинка, свинца, серебра, меди, германия и, локально, сурьмы.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

THUNDER MOUNTAIN GOLD – ГРП НА ПРОЕКТЕ VMS САУТ-МАУНТИН В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ШТАТА АЙДАХО.

17 сентября 2026 г.

В ходе бурения были успешно достигнуты несколько приоритетных целей в расширяющемся районе добычи серебра, цинка, золота, меди и свинца. Программа (8500 футов) была направлена на расширение известных запасов массивных сульфидов на карбонатно-сменительном месторождении (Carbonate Replacement Deposit, CRD), а также на проверку перспективных объектов медно-золотого порфирового пр-ния, выявленных в ходе комплексных геолого-геофизических работ. На сегодняшний день в десяти пробуренных скважинах обнаружены минералогические изменения с сопутствующей железистой, медной, цинковой и свинцовой сульфидной минерализацией, что подтверждает потенциал расширения известной системы CRD, тесно связанной с формацией вмещающих пород Лаксей-Марбл. Саут-Маунтин — это проект по разработке полиметаллических месторождений с высоким содержанием серебра, цинка, золота, меди и свинца (рис. 1).




Рис. 1 Геологическая карта ресурсной зоны проекта Саут-Маунтин

Подтвержденный потенциал расширения: на четырех скважинах было проверено ранее не пробуренное расширение DMEA с массивными сульфидами и обнаружено интенсивное изменение скална сульфидами меди, цинка и свинца.

Предварительные результаты: бурение выявило обширные интервалы с высоким содержанием серебра, в том числе 22,47 м с содержанием серебра 86 г/т, а также более богатые субинтервалы и сопутствующие залежи золота, меди, свинца и цинка. Обнаружена новая массивная сульфидная минерализация на участке Кентукки в 250 м к западу от ресурсной зоны. Три скважины продемонстрировали непрерывность залегания на глубине 80 м, пересекли 15 м интенсивного госсана и оставили минерализованную зону открытой на глубине.

Перспективные объекты для поисков в масштабе района: бурение на участке Бэй-Стейт на северо-западе и на юго-востоке вдоль сильно измененных, богатых пиритом сланцев и мрамора с локальными скарнами, что позволит улучшить геологическую модель и провести дополнительные исследования вдоль мраморного пояса Лакси.

Thunder Mountain Gold Inc — основным активом компании является проект VMS Саут-Маунтин (цинк, серебро, золото, свинец и медь) компании Anaconda Copper Company, расположенный в округе Оуихи, штат Айдахо.
<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-release>

AMERICAN TUNGSTEN CORP. – ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ВОЛЬФРАМА НА ПРОЕКТЕ ИМА, ШТАТ АЙДАХО.

17 сентября 2026 г.

Оценка минеральных ресурсов подтверждает стратегию компании по развитию проекта ИМА для потенциального производства вольфрама внутри страны с использованием поэтапного подхода к разработке.

Оценка минеральных ресурсов в составе 316 тыс т обозначенных запасы полезных ископаемых - 0.55% WO₃, содержащих 1,7 т WO₃, и 2,2 млн тонн, прогнозные ресурсы полезных ископаемых - 0.55% WO₃, содержащих 12 т WO₃, и 267 тыс т обозначенных запасов - 0.15% WO₃ и содержащих 413 т WO₃ (рис. 1).




Рис. 1 Схема буровых скважин с указанием уровня D, нулевого уровня и поверхностных точек пересечения.

В настоящее время American Tungsten проводит программу разведочного бурения, разрабатывает инженерно-технические решения и оценивает возможность возобновления подземной добычи вольфрама на руднике IMA.

American Tungsten Corp. — специализируется на развитии проекта IMA Mine — высококачественного подземного вольфрамового рудника, расположенного в Айдахо, США

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ORETERRA METALS CORP – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ TREK SOUTH В ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

17 сентября 2026 года

В рамках программы было пробурено 13 скважин: 11 в зоне «А» и 2 в зоне «Носок» (рис. 1)




Рис. 1 Планы бурения на проекте Trek South: на спутниковом снимке (а) и в минерализованной зоне на аэромагнитной карте (б)

Trek South вызывает оптимизм как новый крупномасштабный объект с порфировым приемом. Программа бурения должна определить местоположения интрузии, изменения и минерализацию в сочетании с новыми результатами в зонах "В" и "С" — как основу для перехода ко второй фазе бурения.

Oreterra Metals Corp. — владеет несколькими порфировыми медно-золотыми проектами в «Золотом треугольнике» Британской Колумбии, самым значимым из которых является *Trek South*,

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

NICOLA MINING INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS MB, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.

18 сентября 2026 г.

Целевой район MB - перспективный объектом для поисков свинцово-серебряно-цинкового оруденения, с дополнительным присутствием меди и золота. Пробы почвы и поверхностных горных пород дали обнадеживающие результаты - вдоль системы жил, обнажающихся в нескольких местах по простиранию, была обнаружена минерализация серебра, свинца, цинка, меди и золота (рис. 1).




Рис. 1 Карта геологических условий и плана бурения..

Программа включает четыре скважины общей протяженностью 800 м, ориентированные на зону MB — область с минерализованными жилами на поверхности, которая ранее не подвергалась бурению. Буровые скважины предназначены для пересечения и тестирования кварцево-сульфидных жил, простирающихся с северо-востока на юго-запад.

Nicola Mining Inc. — исследует проект MB в районе Трежер-Маунтин, который включает в себя 30 участков на площади более 2,2 тыс га.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

WESTERN STAR RESOURCES INC. - ГРП НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ РОУЛЕНД, ШТАТ НЕВАДА, США.

18 сентября 2026 г.

В ходе геохимического исследования были выявлены две отдельные, пространственно связанные аномалии содержания вольфрама в почве, каждая из которых расширяет зоны вокруг исторических разработок.

Исследование почвы включало отбор 315 проб на территории вольфрамового проекта Роулэнд на линиях, расположенных на расстоянии 100 м друг от друга, с шагом от 25 до 50 м. Программа была разработана таким образом, чтобы обеспечить непрерывный геохимический мониторинг всей территории для уточнения целей по мере приближения к этапу бурения (рис. 1).




Рис. 1 Результаты анализа содержания вольфрама в почве на Роулэнд-Тунгстен (а) и две аномалии содержания вольфрама в почве на фоне интрузивного тела и интерпретированных магнитных линий (б).

315 образцов почвы, собранных на территории Роулэнд, в том числе образец с аномально высоким содержанием вольфрама — 4240 ppm W (0,53% WO_3).

Выявлены две отдельные аномалии содержания вольфрама в почве: основная аномалия Роулэнд и аномалия Северной зоны В.

Главная аномалия Роулэнда: 18 образцов с аномальными значениями на площади 190 x 630 м. В образце с самым высоким содержанием также обнаружено 66,9 ppm Sn — самое высокое значение содержания олова в ходе исследования.

Аномалия Северной зоны В: 13 аномальных проб площадь 190 x 190 м с максимумом в 228 ppm по массе - расположены рядом с образцами каменной крошки, в которых содержание WO составило от 0,35% до 1,22%. Аномалия В находится в пределах смоделированного интрузивного тела, выявленного с помощью трехмерной инверсии магнитного поля, проведенной компанией, а аномалия Роулэнд-Мейн связана с интерпретированным линейным магнитным полем с высоким магнитным потенциалом.

Более крупная из двух аномалий расположена вокруг исторических выработок, где компания сообщила о высоком содержании WO_3 в руде — 4,02%. Восемнадцать образцов определяют

площадь залегания примерно в 190 м с востока на запад и 630 м с севера на юг, вытянутую в направлении север-северо-восток. В шести образцах содержание вольфрама превышает 100 ppm. Лидирует образец с показателем 4240 ppm вольфрама, за ним следуют (422 ppm вольфрама), (373 ppm вольфрама), (215 ppm вольфрама), (176 ppm вольфрама) и (110 ppm вольфрама). Образцы также показали содержание олова 66,9 ppm при среднем значении по выборке 2,8 ppm. Это самое высокое значение содержания олова, зафиксированное в ходе исследования, а ассоциация вольфрама и олова соответствует грейзен-модифицированной скарновой системе.

Эти две аномалии находятся в разных геофизических условиях. Большинство самых сильных образцов почвы в районе Северной зоны В находятся в пределах смоделированного интрузивного тела, которое было выделено при пороге восприимчивости 0,010 SI с помощью трехмерной магнитной инверсии. Центр аномалии расположен вблизи интерпретированного линеамента с пониженной магнитной восприимчивостью. Аномалия Роулэнд-Мейн находится за пределами смоделированного интрузивного тела и связана с интерпретированным линеamentом с повышенной магнитной восприимчивостью.

Результаты геохимического анализа почвы будут объединены с данными магнитной съемки, выполненной с помощью БПЛА, результатами трехмерной магнитной инверсии, а также результатами анализа образцов породы и кернов для определения перспективных участков для бурения на объединенном вольфрамовом проекте Джарбидж — Чарлстон.

Western Star Resources — компания развивает портфель ранее разрабатывавшихся месторождений вольфрама в Неваде и Нью-Мексико, а также продолжает ГРП на участке Western Star в Британской Колумбии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>


SPARTAN METALS CORP. - ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УКАЗЫВАЮТ НА РАСШИРЕНИЕ ВОЛЬФРАМОВО-СЕРЕБРЯНОГО ПРОЕКТА EAGLE, ШТАТ НЕВАДА.

18 сентября 2026 г.

В результате магнитотеллурических (МТ) и поляризационных, индуцированных постоянным током (DCIP) геофизических исследований компания Spartan получила первый трехмерный набор данных о недрах в районе Тунгстония. Набор данных хорошо согласуется с нанесенными на карту структурами, геологией, геохимией поверхности и с прогнозируемой геологической моделью на глубине, что позволяет составить целостную картину и выявить новые и существующие цели проекта Eagle. Согласно интерпретации геофизических аномалий, жилы, разработка которых велась почти сто лет назад, простираются на глубину до 700 м и потенциально могут быть связаны с более крупной интрузией, расположенной ниже. Вместе они рассматриваются как разные части одной крупной минерализующей системы, связанные структурами, в которых залегают жилы.

Проект Игл — это перспективный объект районного масштаба, включающее в себя три бывших вольфрамовых рудника (Тунгстония, Йеллоу-Джекит и Рис/Антилопа) с заявленными историческими содержаниями WO_3 от 0,6 до 3,51%, а также минерализацию рубидия и серебра, выявленную в ходе отбора проб компанией Spartan. Объем добычи вольфрама на этих рудниках составил 8379 т при содержании 0,6–0,9% WO_3 .

Площадь Игла составляет ~36,5 км², на Игл присутствуют три типа залежей: порфировые, скарновые и карбонатно-замещенные (КЗ), которые содержат значительные или аномальные концентрации вольфрама, серебра и рубидия, а также Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As в трех основных проектных зонах, которые также включают возможность извлечения W-Rb-Ag из старых хвостов обогатительной фабрики Tungstania (рис. 1).



б

Рис. 1 а. - план бурения с результатами анализа горных пород и почв; б. - поперечный разрезы: В-В' - удельное электрическое сопротивление с грейзеновыми изменениями вокруг устойчивых кварцево-хубнеритовых жил; А-А' - трехмерной магниторазведки; С-С' - IP с привязкой к DC; D-D' - IP (относительной электропроводности).

Все линии поперечного сечения совпадают с линиями, полученными в ходе недавних геофизических исследований. Приоритетными задачами бурения являются исследование юго-восточной вольфрамовой аномалии, глубинное продолжение жилы 1 с возможностью выявления дополнительных интерпретируемых жил на западе, потенциальное продолжение комплекса жил А, В и С на юг, а также высокопотенциальные приповерхностные геофизические аномалии.

Основные моменты:

Вольфрамово-серебряные жилы, обнаруженные на глубине до 700 м..

Метод постоянного тока позволяет выделить жилы с 1-й по 5-ю и их грейзеновые ореолы под поверхностью, имеющие те же простирание и падение на глубине, что и на поверхности, согласно данным, полученным с помощью аппарата Spartan.

Целеуказатель площадью 3,7 км² расположен на глубине от 400 до 1800 метров.

Идентифицирован по МТ вдоль линии 0500N в пределах осадочных образований с преобладанием карбоната, прилегающих к интерпретированному разлому каньона Симс – целевой тип, ранее не идентифицированный в Вольфстонии.

Жилы и порфиоровое тело как части одной более крупной системы.

Жилы залегают в ранее существовавших структурах, которые простираются вниз по направлению к предполагаемому интрузивному телу, что согласуется с гипотезой о том, что эти структуры служили питающими каналами, по которым флюиды поднимались в жилную систему.

Отличный потенциал CRD там, где флюиды встречаются с известняком.

Потенциальный объект типа замещения карбонатов (CRD) на западной стороне линии DCIP 1570N расположен там, где интерпретируемые пути прохождения флюидов контактируют с

предполагаемым гильметтовым известняком, который отличается другим типом минерализации, ожидаемым на флангах той же системы. Потенциальная мишень из вольфрамового скарна была определена на восточной стороне линии DCIP. Образцы почвы и каменной крошки, собранные в этом районе, подтверждают наличие системы CRD на фланге интрузии.

Пять приоритетных целей теперь готовы к ранжированию для бурения.

Самые сильные аномалии DCIP совпадают с известными участками вольфрамовой минерализации, кварцевыми жилами и старыми выработками — геофизические данные подтверждают ожидания геологов Spartan.

Что означают эти результаты?

Как работают эти методы.

Оба метода позволяют отобразить электрические свойства горных пород, не нарушая целостность грунта. МТ позволяет видеть на глубине более 1500 м, но с меньшей детализацией; DCIP обеспечивает более высокую детализацию на глубине до 750 метров. МТ — это широкий обзор на большой глубине, а DCIP — крупный план. Эти методы позволяют выявить проводящие, заряженные аномалии, которые совпадают с массивными сульфидами, связанными с системами минерализации.

Интерпретируется, что известные жилы продолжаются на глубине.

В прошлом рудник Tungstonia разрабатывал эти жилы вблизи поверхности. Аномалии совпадают с этими данными и, по-видимому, продолжают достигать глубины, приближающейся к 700 м, что значительно больше глубины для проверки, чем когда-либо добывалось.

Все сходится.

Залегающая интрузия — классический источник тепла и металла, из которых образуются вольфрамовые жилы, подобные тем, что видим в Тунстонии. Зафиксирован возможный источник под вольфрамово-серебряными жилами через разломы и трещины, которые занимают эти жилы и сходятся в направлении возможного интрузивного источника — системы, которая, согласно гипотезе, направляла флюиды вверх. Данные указывают на единую систему: источник, сеть путей и отложения, которые питали эти пути.

Динамичная система с дополнительными возможностями на флангах.

Как и следовало ожидать в такой геологической среде, где флюиды пересекают известняки, а не ограничены трещинами, они могут растворять известняки и замещать их, образуя карбонатные замещающие отложения, которые часто богаты серебром, а также свинцом, цинком и медью. Компания Spartan определила цель такого типа в месте, где предполагаемые пути флюидов пересекаются с известняками. Карбонатно-рециклинговые отложения отличаются от жил, но образованы той же системой.

Необходимая осторожность.

Геофизические исследования позволяют оценить контраст физических свойств горных пород, а не их литологический состав или содержание металлов. Эти аномалии интерпретируются в совокупности с поверхностным картированием и другими методами исследования и поэтому не являются прямым свидетельством наличия минерализации. Только бурение может подтвердить наличие оруденения. Это инструменты, которые помогают определить целевые участки в сочетании с геологическим картированием, изучением структуры и геохимии поверхности.

Единая система - глубинные источники, структурные питающие горизонты и реактивные вмещающие породы.

Модель удельного электрического сопротивления МТ выявила потенциальный объект с порфирами вдоль линии МТ 0500N, простирающейся примерно на 400–1800 м в глубину и охватывающей интерпретируемую площадь около 3,7 км² в осадочных породах с преобладанием карбонатов вдоль интерпретируемого северо-северо-восточного разлома Симс-Каньон. По данным DCIP-разведки, которая позволяет составить карту удельного электрического сопротивления и электропроводности, кварцевые жилы с хубнеритом с 1-й по 5-ю и их грейзеновые оболочки прослеживаются на глубину до 700 м, сохраняя те же простирание и падение, что и на поверхности. Это первый случай, когда система жил была визуализирована ниже выработок в Тунстонии.

Компания считает, что все эти особенности взаимосвязаны. Кварц-хубнеритовые жилы с грейзеновыми оболочками, как правило, образовались в результате эволюции гранитных интрузий, а структуры, в которых залегают жилы 1–5, представляют собой ранее существовавшие разломы и трещины, уходящие вниз к предполагаемому телу порфирового центра. Эти структуры служили питающими каналами, по которым вольфрамсодержащие флюиды поднимались из интрузивного источника в ловушки, которые сейчас представлены системой жил Тунстония. В подтверждение этого прямо над интерпретируемой порфировой залежью находится аномалия DCIP с умеренной плотностью заряда, а на линии 0500N как в данных MT, так и в данных DCIP прослеживается северо-восточная геометрия — два независимых метода, работающих на разных глубинах и в разных масштабах, выявляют один и тот же структурный коридор.

Интерпретируемая цель CRD представляет собой отдельную, но генетически связанную с другими возможность. Там, где флюиды, мигрирующие вдоль этих структур, встречаются с реакционноспособными карбонатными породами, происходит замещение известняка, в результате чего образуется карбонатная замещающая минерализация, которая обычно богата серебром. Потенциальная цель CRD на западной стороне линии DCIP 1570N находится там, где предполагаемые флюидные пути контактируют с предполагаемым известняком, а потенциальная цель в виде скарна на восточной стороне линии DCIP 0500N расположена в аналогичных условиях на предполагаемом контакте с интрузией. В совокупности результаты исследований подтверждают существование одной системы, проявляющейся в трех аспектах: потенциальный интрузивный источник на глубине, структурно контролируемые жилы над ним и цели замещения в местах, где эти флюиды встречаются с известняком. Геофизические аномалии не являются прямым свидетельством наличия минерализации и должны быть подтверждены бурением.

Следующие шаги

Компания Spartan интегрирует инверсии MT и DCIP со своей геологической базой данных, чтобы создать обновленную 3D-модель системы Тунгустония. Приоритет отдается участкам, где совпадают известные пр-ния, старые выработки, кварцевые жилы и грейзены, интерпретируемые интрузивные контакты и геофизические аномалии. Участки с несколькими совпадающими характеристиками получают наивысший приоритет для бурения.

Spartan Metals Corp. — владеет вольфрамово-молибденовым проектом *Victorio* в Нью-Мексико и вольфрамово-серебряно-рубидиевым проектом *Eagle* в Неваде. *Victorio* — это перспективный геологоразведочный проект, на котором была проведена оценка вольфрамово-молибденовой минерализации, а также берилла и плавикового шпата. *Игл* — это район, где расположены три бывших вольфрамсодержащих рудника (Тунстония, Рис и Йеллоу-Джекет), где также были обнаружены залежи серебра, рубидия, сурьмы, висмута и индия. Запасы полезных ископаемых в *Игл* не оценивались.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

KORYX COPPER - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТАХ LUANSHYA WEST И MPONGWE В МЕДНОМ ПОЯСЕ ЗАМБИИ.

18 сентября 2026 года

В ходе бурения будет проверено до четырех приоритетных объектов, нацеленных на вертикальные глубины 100-250 м. В Мпонгве ведутся ГРП для уточнения существующих и новых объектов, планируется отобрать 3 тыс образцов грунта (рис. 1)




Рис. 1 Проект Luanshya West с четырьмя целевыми объектам.

Скважины будут проходить под наклоном и будут проверять аномалии геохимии поверхности, способность заряжаться от индуцированной поляризации (IP), характеристики удельного сопротивления и структурные объекты на глубине от 100 до 250 м.

В рамках проекта Мпонгве будут отобраны пробы почвы на участках Лвабуфубу, МР1 и МР2, а также будут отобраны региональные пробы почвы в западных частях проекта. Всего будет отобрано около 3 тыс проб.

Koryx Copper S.A. — специализируется на развитии проекта *Haib Copper* в Намибии, а также на расширении портфеля проектов ГРП медных месторождений в Замбии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

COPPER ONE RESOURCES CORP. РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ БУРЕНИЯ НА ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ MAJUBA HILL В НЕВАДЕ

18 сентября 2026 г.

Расширенная программа направлена на ускорение систематического тестирования приоритетных объектов на холме Маджуба и поддержку цели компании по продвижению проекта к оценке первоначальных минеральных ресурсов (рис. 1),




Рис. 3 Целевые зоны бурения на Маджубе

Majuba Hill — это бывший медный рудник с обширной базой геологоразведочных данных, включающей 27,2 тыс м исторического бурения, что обеспечивает прочную основу для текущих ГРП, направленных на дальнейшее определение масштабов и потенциала минерализованной системы.

В ходе ГРП была выявлена крупная медно-серебряно-золотая гидротермальная минерализованная система, которая остается открытой для расширения. Текущие работы направлены на совершенствование геологической модели путем систематического бурения, геологического картирования, геохимического отбора проб и структурной интерпретации для оценки масштабов, непрерывности и значимости минерализации. Для дальнейшего определения размеров и экономического потенциала минерализованной системы потребуются дополнительные буровые работы и технические исследования.

Текущие ГРП направлены на оценку масштабов и непрерывности крупной медно-серебряно-золотой минерализованной системы.

Copper One Resources Corp. - флагманским активом компании является медно-серебряно-золотой проект по разработке медно-порфировых месторождений

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-release>

GUARDIAN METAL RESOURCES PLC - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ TEMPIUTE В НЕВАДЕ.

21 сентября 2026 г.

В рамках продолжающейся программы бурения планируется пробурить 46 скважин из которых на сегодняшний день пробурено 28. Программа направлена на проверку непрерывности,

мощности и степени минерализации, а также на получение данных, необходимых для потенциальной оценки минеральных ресурсов проекта Темпийот.

Результаты первого этапа показывают, что вольфрам-скарновая минерализация хорошо выражена на нескольких участках за пределами исторически разрабатываемых зон, что указывает на более обширную и устойчивую систему минерализации, связанную с двумя основными интрузивными телами (рис. 1).




Рис. 1 Геология проекта, план бурения (а), буровые скважины в пределах целевых зон (б) и трехмерная модель ресурсных объектов (в).

Программа предназначена для предоставления геологической и аналитической информации, необходимой для первоначальной оценки минеральных ресурсов, а также оценку приповерхностных минерализованных жил, расположенных на запатентованных участках.

Guardian Metal Resources PLC (NYSE.A: GMTL) (LON: GMET0 (OTCQB: GMTLF)) - реализует два проекта по добыче вольфрама: Пайлот-Маунтин и Темпийот, оба в Неваде, одном из самых перспективных рудных районов США.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

BARKSDALE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ И СЪЕМКИ ЗТЕМ НА Cu-Mo ПРОЕКТЕ САННИСАЙД В РУДНОМ РАЙОНЕ ПАТАГОНИЯ НА ЮГЕ АРИЗОНЫ.

21 сентября 2026 г.

Скважины вскрыли основную часть минерализации, расширили зону жильного типа на северо-запад и на юго-восток (рис. 1).




Рис. 1 Геологическая карта и план бурения (а) и поперечный разрез с результатами анализа на медь и серебро (б).

Рабочая гипотеза заключается в том, что медные жильные породы имеют северо-западную и юго-восточную структурную направленность, которая определяет их распределение, и что они образовались в непосредственной близости от гораздо более крупного медно-молибденового порфирового центра.

Подтверждено наличие медной минерализации значительного масштаба и содержания, а данные исторического бурения и геофизических исследований указывают на более крупный порфировый источник на глубине. Порфировый проект Саннисайд простирается более чем на 10 км с северо-запада на юго-восток и имеет ширину до 5 км, и на сегодняшний день пробурили лишь небольшую его часть в северо-восточном углу.

Результаты программы бурения указывают на потенциальное наличие медно-молибденовой порфировой минерализации, простирающейся в направлении северо-запад — юго-восток и занимающей 1 км в длину и 1 км в глубину. Пр-ние остается открытым на глубине и на западе. Это примерно соответствует общей северо-западной и юго-восточной тенденции распространения кварц-монцитонитов/монцитонитовых порфиров Саннисайд, которая простирается от северо-восточного угла до южной границы участка Саннисайд, а также встречается на поверхности и в буровых скважинах на участке Фор-Металс, принадлежащем компании.

Кварц-монцитонитовые и монцитонитовые порфиры Саннисайд простираются более чем на 10 км в направлении северо-запад — юго-восток и имеют ширину до 5 км. На сегодняшний день компания исследовала лишь небольшую часть порфиров на своей территории на северо-востоке.

Сейчас первоочередная задача — завершить сейсморазведку методом ZTEM. По этой причине компания заключила контракт с Geotech Ltd. на проведение геофизической съемки методом ZTEM на участках Саннисайд и Фор-Металс. Цель — выявить в порфировой формации Саннисайд, в том числе на участке Фор-Металс, участки с высокой вероятностью дальнейшего медно-молибденового оруденения. Предварительные работы на участке Фор-Металс показали, что медно-молибденовое оруденение встречается и связано с калиевым (биотитовым) изменением.

Barksdale Resources Corp., - развивает проект по добыче меди, цинка, свинца и серебра Саннисайд, расположенный в горнодобывающем районе Патагония на юге Аризоны, а также проект по добыче меди и золота Сан-Хавьер в центральной части мексиканского штата Сонора.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

DLP RESOURCES INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ ESPERANZA, ПЕРУ.

21 сентября 2026 г.

Программа включает 3 тыс м бурения для проверки двух различных и взаимодополняющих целей в рамках одной системы: приповерхностной зоны окисления меди, выделенной с помощью высококачественного трассирования с поверхности, и основного медно-золото-молибденового месторождения в порфировых формациях, залегающего на глубине под магнитной аномалией размером 5,0 x 2,5 км. Бурение ведется последовательно: сначала были пробурены четыре неглубокие скважины в оксидной породе, а затем три скважины в порфировой породе глубиной 800 м (рис. 1).




Рис. 1 Расположение проекта Эсперанса (а) и расположение устьев скважин (б).

Магнитная аномалия размером $5,0 \times 2,5$ км подтверждается результатами отбора проб с поверхности и из траншей.

DLP Resources Inc. — компания, специализирующаяся на разработке медных месторождений, которая реализует два проекта в южной части Перу «Аврора» и «Эсперанса».

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

CANADIAN COPPER INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS МЮРРЕЙ БРУК В РУДНОМ РАЙОНЕ БАТЕРСТ В НЬЮ-БРАНСУИКЕ.

21 сентября 2026 г.

Бурение на западной окраине Мюррей-Брук выявило наличие широких сульфидосодержащих зон в пяти скважинах, что позволило расширить сульфидную систему на 25 м к западу от нынешней границы минерализации. При бурении было пройдено 26,4 м с содержанием меди 1,35%. Широкие зоны характеризуются вкрапленными, ленточными и прожилковыми сульфидами, окружающими массивные и полумассивные сульфидные зоны. Во всех пяти скважинах наблюдался халькопирит, а в отдельных интервалах — сфалерит (рис. 1).




Рис. 1 План (а) и поперечный разрез (б) в западной зоне Мюррей Брук.

Компания пробурила 2205 м и будет продолжена в западном направлении. Текущая программа ГРП может быть расширена за счет изучения нового геофизического объекта на расстоянии +600 м к западу в зависимости от дополнительных полевых наблюдений и результатов бурения.

Canadian Copper Inc. — владеет портфелем проектов меди, цинка и серебра и специализируется на проекте Батерст (VMS) в Нью-Брансуике, Канада.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ALGO GRANDE COPPER CORP – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА МЕДНО-СЕРЕБРЯНО-ЗОЛОТОМ СКАРНОВОМ УЧАСТКЕ СЕРРО-ГРАНДЕ ПРОЕКТА АДЕЛИТА В МЕКСИКАНСКОМ ШТАТЕ СОНОРА.

23 сентября 2026 г.

Бурение скважины было направлено на проверку вертикального распространения и непрерывности вдоль простирания скарновой системы Серро-Гранде за пределами участка, выявленного в ходе бурения в рамках первого этапа. Результаты полного анализа подтверждают, что эта цель была достигнута: высококачественная медно-серебряно-золотая минерализация теперь прослеживается на глубине от 146,70 до 282,00 м и разделена на две зоны. В скважине была обнаружена вторая зона длиной 38,20 м с содержанием 1,0% CuEq на глубине 243,80 м, примерно на 67 м ниже основания 30,23-м зоны с содержанием 1,5% CuEq, о которой сообщалось ранее на глубине 146,70 м. Это подтверждает наличие многоярусной скарновой системы в Серро-Гранде.

Общая протяженность двух зон составляет 68,43 м комбинированного минерализованного интервала со средним содержанием 1,2% CuEq при предполагаемом извлечении 80%.

В нижней зоне также были обнаружены локальные аномалии цинка, до 0,48% Zn в 11,5-м интервале с высоким содержанием. Результаты полного анализа подтверждают, что цель была достигнута: высококачественная медно-серебряно-золотая минерализация теперь присутствует в двух отдельных зонах на глубине от 146,70 до 282,00 метров (рис. 1).




Рис. 1. Вид в плане (а) и на разрезе (б) целевого коридора бурения на Серро-Гранде с верхней и нижней минерализованными зонами.

Результаты анализа подтверждают также наличие молибденовой геохимической аномалии, среднее содержание молибдена в которой составляет 32,6 ppm (пик 110 ppm) на участке длиной 15,58 м от 387,42 до 403,00 м по вертикали. Компания интерпретирует наличие этих зон как существование долгоживущей магма-гидротермальной системы.

Algo Grande Copper Corp. — проект Adelita — система оруденения меди, серебра и золота районного масштаба в медном поясе Аризоны и Соноры. Проект Adelita площадью 5,9 тыс га основан на открытии медно-золото-серебряного скарнового пр-ния Серро-Гранде, которое демонстрирует сильную геофизическую преемственность вдоль определенного коридора протяженностью более 6 км.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

MOGOTES METALS INC. - ПЛАНЫ ГРП НА СВОИХ ПРОЕКТАХ FILO SUR В АРГЕНТИНЕ И ЧИЛИ, BESKAUGA В КАЗАХСТАНЕ И COPPER CLIFF В МОНТАНЕ, США.

22 сентября 2026 г.

Бурение на Фило-Сур увеличится более чем в три раза: до 20 тыс м. Оба открытия являются ключевыми для программы: дополнительное бурение на участках Альбор и Крус-дель-Сур, повторные испытания на порфировых м-ниях на участке Лус-дель-Соль и первое бурение на участке Куэнка, а также разведка вдоль зоны разлома Мачо-Муэрто.

Бурение на участке Бескауга: до 50 тыс м бурения, первые анализы ожидаются в четвертом квартале 2026 года, а предварительная экономическая оценка (ПЭО) — в течение 12 месяцев.

М-ние Коппер-Клифф готово к бурению, как только будет получено разрешение: планируется пробурить 8–9 тыс м, в рамках совместного предприятия с Kennecott, дочерней компанией Rio Tinto (рис. 1):




Рис. 1 План Filo Sur с указанием целевых участков ГРП.

Программа построена вокруг двух открытий, сделанных в зоне разлома Мачо-Муэрто (MMFZ). У него есть четыре приоритета

Альбор - расширение области обнаружения высококачественной брекчии по простиранию и на глубину и бурение порфировой мишени, обнаруженной под ней;

Крус-дель-Сур - расширительное бурение золото-медного порфира, которое остается открытым во всех направлениях

Луз-дель-Соль, Куэнка и Месета - первые испытания порфира в Куэнке и продолжение работ по новой цели в Луз-дель-Соль, а также завершение буровых испытаний в Месете; и

MMFZ — разведочное бурение на участке протяженностью около 10 км в рамках проекта, большая часть которого до сих пор не изучена.

Mogotes Metals Inc. — флагманский проект компании *Filo Sur* примыкает к м-нию *Filo del Sol* компании *Lundin Mining* — одному из крупнейших в мире м-ний меди, золота и серебра. Он расположен в том же поясе, простирающемся с севера на юг, что и месторождения *Filo del Sol-Aurora* и медно-золотые м-ния *Lunahuasi* и *Los Helados* компании *NGEx Minerals*.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ERRINGTON METALS CORP. - ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА VMS САДБЕРИ-БЕЙСИН В РУДНОМ РАЙОНЕ САДБЕРИ

22 сентября 2026 г.

Проект «Садбери-Бейсин» включает объекты Эррингтон, Вермилион и Бальфур, которые остаются открытыми для дальнейшей разработки и являются приоритетными объектами текущей кампании по бурению. Все они залегают в кремнисто-карбонатной литологической единице, перемежающейся с аргиллитами, под которой находится толща вулканических пирокластических пород мощностью 1,4 км. Минерализованная толща сложена складками и разломами таким образом, что массивный сульфидный горизонт повторяется в конфигурации, где зоны минерализации достигают 50 м мощности. Общая геологическая обстановка минерализации соответствует вулканогенному массивно-металльному сульфидному типу, аналогичному медно-цинково-свинцово-золото-серебряным м-ниям в Иберийском пиритовом поясе в Испании и Португалии, м-ниям Цинкгруван в Швеции и некоторым массивным сульфидным м-ниям в районе Батерст в Канаде (рис. 1).




Рис. 1 План проекта Садбери-Бейсин.

На долю объекта Эррингтон приходится около 70% разведанных минеральных и минеральных с флюидами ресурсов проекта Садбери-Бейсин. Его пластообразная форма отражает непрерывность минерализованного горизонта на протяжении 1,2 км, а структурное напластование локально увеличивает мощность минерализованного слоя до 50 м. Отчетливые зоны с более высоким содержанием меди и цинка отражают металлогеническую зональность, обычно наблюдаемую на м-ниях типа VMS, а зоны с более высоким содержанием золота также встречаются в пределах в целом однородного распределения. М-ние Эррингтон остается открытым на глубине, в том числе в восточной части, где недавно были обнаружены массивные сульфидные жилы. При более высоких значениях бортового содержания м-ние Эррингтон

сохраняет непрерывность. Зона 1500 особенно хорошо изучена в направлении простирания к поверхности и на глубину. Для зоны 1500 планируется новая структурная интерпретация, которая позволит еще точнее определить места для бурения (рис. 2).




Рис. 2 Разрезы м-ния Эррингтон.

М-ние Вермилион более компактное по сравнению с Эррингтоном из-за особенностей разломов. Содержание полезных компонентов в целом несколько выше, чем на Эррингтоне; особенно это касается золота, содержание которого стабильно выше, особенно при более высоких бортовых концентрациях. Распределение измеренных и выявленных ресурсов на м-нии Вермилион в значительной степени отражает соотношение более поздних и более старых программ бурения. Протяженность минерализованных горизонтов по простиранию не была изучена полностью, и бурение в этом направлении планируется продолжить.

М-ние Балфор в настоящее время считается предполагаемым. Ранее на Балфоре проводились буровые работы, но скважины располагались на большом расстоянии друг от друга и не подходили для моделирования ресурсов. Компания Errington Metals пробурела более 13 тыс м скважин, а также разработала трехмерную геологическую модель для оценки ресурсов. По сравнению с м-ниями Вермилион и Эррингтон, минерализация на Балфоре богата цинком и серебром, особенно при более высоких бортовых содержаниях. В Балфуре складчатость также более выражена, а основная шарнирная зона интерпретирована на всю глубину и еще не пробурена.

Границы минерализации на м-ниях Эррингтон, Вермилион и Бальфур изначально были определены с использованием данных о содержании отдельных металлов: меди, цинка, золота, серебра и свинца. Блочные модели были рассчитаны с использованием меди в качестве эквивалентного металла, объединяющего все пять металлов

Первоначальная оценка минеральных ресурсов для проекта бассейна Садбери:

M& I 14,20 млн т при 1,20% Cu, 4,02% Zn, 1,11% Pb, 0,83 г / т Au, 50,25 г / т Ag

Получено 3,44 млн т при 1,02% Cu, 4,62% Zn, 1,73% Pb, 0,57 г / т Au, 66,55 г / т Ag

Более 80% общих ресурсов классифицируются как измеренные или предполагаемые

Примерно 75% общего объема минеральных и минеральных с органическими соединениями ресурсов сосредоточено в Эррингтоне, который является ключевым объектом для предварительного планирования разработки и будущего роста

Недавно было выявлено 3,44 млн т предполагаемых ресурсов, что свидетельствует о высоком потенциале обнаружения дополнительной минерализации

Все м-ния остаются открытыми для расширения и будут в центре внимания в рамках полностью профинансированной кампании по бурению на глубине 55 тыс м, которая в настоящее время продолжается

Программа будет расширена за счет изучения целевых участков, выявленных в моделях минеральных ресурсов Эррингтона и Бальфура, для дальнейшего понимания их потенциала расширения. Также будут изучены региональные цели, определенные на основе интерпретации геологических и геофизических данных. Были проведены дополнительные геофизические исследования для уточнения целей по расширению ресурсов, а также для выявления новых участков минерализации. Будет проведено дополнительное бурение для сбора объемного образца на м-нии Эррингтон в рамках подготовки к мини-пилотному металлургическому исследованию.

Errington Metals Corp. —развивает проект «Бассейны Садбери», в рамках которого ведется добыча высококачественных вулканогенных массивных сульфидов (VMS) во всемирно известном рудном районе Садбери.
<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

POWER METALLIC MINES INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ PGE NISK–LION–TIGER.

22 сентября 2026 года

Компания Power Metallic провела широкомасштабное разведочное бурение по геологическим и геофизическим (электромагнитным) объектам и, что более важно, приступила к программе расширения проекта Лайон до глубины, превышающей границы модели MRE (рис. 1).




Рис. 1 План бурения для расширения проекта Лайон

Скважины были пробурены южнее предполагаемого прогиба Лайон. На глубине 900 м были обнаружены рассеянные и массивные прожилки сульфидов меди. Все 3 скважины доказали, что м-ние Лайон продолжается на глубине и его границы еще не определены.

Power Metallic расширяет минерализацию в зонах обнаружения Nisk и Lion, оценивает м-ние Tiger и исследует расширенный земельный участок с помощью последовательных программ бурения.

Power Metallic Mines Inc. —деятельность направлена на развитие проекта Nisk (Nisk–Lion–Tiger) — высокосортной медно-платиноидной, никелевой, золотоносной и сереброносной системы.
<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

COPPER GIANT RESOURCES – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ МОКОА В КОЛУМБИИ.

22 сентября 2026 г.

Проект расположен в среднеюрских дацитовых и кварц-диоритовых порфирах, внедряющихся в андезитовые и дацитовые вулканические породы Центральной Кордильеры — тектонического пояса шириной 30 км, который простирается до Эквадора и включает в себя такие крупные порфировые системы, как Миладор, Варинца, Сан-Карлос и Пананца. Мокоа демонстрирует классическую порфировую зональность с калиевым ядром, окруженным серицитовыми и пропилитовыми изменениями. Минерализация состоит в основном из вкрапленных халькопирита и молибденита, местами сопровождаемых борнитом и халькозином, и связана с жильными образованиями и гидротермальными брекчиями.

Отличительной геологической особенностью Мокоа является наличие «плодородного магматического окна», охватывающего период примерно в десять миллионов лет. Это длительный и необычайно продуктивный интервал формирования и эволюции магмы, который редко встречается в других юрских порфировых системах того же пояса. Этот продолжительный «плодородный период» убедительно объясняет высокую концентрацию металлов в системе, обширные зоны изменений, а также наложение интрузивных и гидротермальных процессов.

Проект демонстрирует более чем 1100-м вертикальную непрерывность, состоящую из нескольких интрузивных фаз, эпизодов брекчирования и генераций жил, что отражает динамичную и длительную магматическо-гидротермальную эволюцию, на которую, вероятно,

повлияло более одного порфирового центра. Мокоа открыто с нескольких сторон, а наличие нескольких сопутствующих объектов на обширной территории подтверждает наличие минерализованной системы районного масштаба (рис. 1).




Рис. 1 План бурения (а) и разрезы блочной модели (б) проекта Мокоа.

Оценка минеральных ресурсов Мосоа включает предполагаемые в 12,7 млрд фунтов в медном эквиваленте (CuEq *) при среднем содержании 0,51% CuEq *, включая 7,7 млрд фунтов меди с содержанием 0,31% Cu и 1,0 млрд фунтов молибдена с содержанием 0,039% Mo, что составляет 1120 млн т.


Copper Giant - сосредоточена на разработке медно-молибденового проекта Мокоа на юге Колумбии — одного из крупнейших неразработанных объектов такого типа в Северной и Южной Америке.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

KORYX COPPER - ЗАВЕРШАЕТ ПРОГРАММУ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ HAIB COPPER В ЮЖНОЙ НАМИБИИ.

22 сентября 2026 г.


Компания объявляет результаты анализа 18 скважин в рамках программы ГРП на Haib медь проекте в южной Намибии (рис. 1).



CASA MINERALS INC - НАЧИНАЕТ БУРЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ VMS ARSENAULT, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ/

22 сентября 2026 г.

Это первое бурение системы VMS в Арсено, площадью 9,7 тыс га на северо-западе Британской Колумбии. Обследование VTEM выявило пять целей VMS, включая четыре ранее неизвестных целевых участков. Использовалась беспроводная распределённая IP-система Alpha IPTM с временным доменом и конфигурацией диполь-полнос-диполь с расстоянием между станциями 100 м и расстоянием между линиями 200 м. Было пройдено 15 профилей общей протяженностью 34,5 погонных км с глубиной исследования 500 м и более. Исследование было направлено на составление карты удельной электропроводности и удельного сопротивления, связанных с потенциальными залежами меди, золота и серебра в вулканогенно-осадочных породах Биг-Салмон, где находится система вулканогенно-осадочных месторождений Арсено (рис. 1).



TINTINA MINES LIMITED - БУРЕНИЕ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ DOS AMIGOS В ЧИЛИ.

22 сентября 2026 г.

Программа бурения протяженностью 40 тыс м была разработана для перевода предполагаемых минеральных ресурсов в категорию выявленных, что должно стать основой для будущих технико-экономических обоснований. Кроме того, будет проведено бурение на Триколор — высокоприоритетном участке с порфирами, расположенном примерно в 3 км к северу от Дос-Амигос. Предыдущее бурение на Триколор дало 230 м при содержании 0,56% меди и 0,33 г/т золота на глубине от 18 м до конца скважины.

Большая часть бурения будет сосредоточена на проекте порфирового золота Дос-Амигос, при этом глубина скважин составит от 300 до 800 м. Кроме того, более мелкое бурение будет проведено на брекчии Марисоль к северу от Дос-Амигос, где было обнаружено поверхностное супегенное минерализованное покрытие. На пр-ниях Дос-Амигос и Марисоль пробурено 28 и 19 тыс м соответственно. На рисунке 1 показаны планы исторических и планируемых скважин.




Рис. 1 Планы бурения целевых уч-ков на аэрофотоснимках.

Ключевым приоритетом является бурение для перевода существующих предполагаемых минеральных ресурсов в категорию выявленных.

Оценка минеральных ресурсов:

- Измеренные и указанные - 100,8 млн тонн ("Т") при содержании 0,35% меди и 0,28 г/т золота (0,52% в медном эквиваленте "У.е./т") по базовым ценам на металлы PEA; 0,56% у.е./т при текущих согласованных долгосрочных ценах на металлы)¹
- Предполагаемые - 256,3 млн тонн при содержании 0,34% меди и 0,24 г / т золота (0,49% у.е. по базовым ценам на металлы PEA; 0,52% у.е. по текущим согласованным долгосрочным ценам на металлы)¹

Tintina Mines Limited —развивает медно-золотой проект Dos Amigos, ранее известный как Domeyko Sulfuros, в регионе Атакама в Чили

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

NEXMETALS MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА Cu-Ni ПРОЕКТЕ СЕЛЕБИ В БОТСВАНЕ.

23 сентября, 2026 г.

Полученные результаты подтверждают эффективность модели ГРП, основанной на данных, и указывают на потенциал дальнейшего роста минерализованной системы Селеби. Результаты (7,55 м руды с содержанием 6,48% CuEq (2,70% Cu и 1,83% Ni), подтвердили наличие еще одного залегания массивных сульфидов с высоким содержанием меди вдоль формирующегося коридора, протяженностью 1,5 км. Тренд был расширен в сторону Северного Селеби на 100 м. Нижняя зона демонстрирует возрастающую непрерывность на глубине. Результаты бурения - на глубине 7,45 метра был обнаружен рудный слой с содержанием 5,69% CuEq (2,52% Cu, 1,54% Ni). Нижняя зона простирается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Третья зона привносит новое измерение в модель исследования. Ее обнаружение под Нижней зоной указывает на то, что система устроена сложнее, чем предполагалось ранее, и открывает дополнительные возможности для потенциального расширения (рис. 1).




Рис. 1 План (а) и разрез (б) наклонных участков разведанных запасов Селеби-Мейн.

Система остается открытой, и недавние исследования методом ВНЕМ указывают на то, что тренд на высокое содержание продолжает действовать. Электромагнитное зондирование скважин ("ВНЕМ") указывает на то, что тренд на высокое содержание продолжает действовать, что указывает на наличие потенциала в латеральном направлении и в направлении погружения. В ходе бурения и геологического моделирования будут изучены размеры всех трех минерализованных зон и выявлены дополнительные участки с массивной сульфидной минерализацией.

NexMetals Mining Corp. — специализируется на восстановлении бывших рудников по добыче медно-никелево-кобальтово-платиноидной группы «Селеби» и «Селкирк» в Ботсване.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

ANDINA COPPER CORPORATION - ПЕРЕСЕКАЕТ ПРИПОВЕРХНОСТНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ НА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ КОБРАСКО, В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЧОКО, КОЛУМБИЯ.

23 сентября 2026 г.

Скважина пересекла мощную приповерхностную медную минерализацию на глубине 74 м, значительно расширив установленную бурением минерализованную зону системы Кобраско на северо-запад. Бурение для определения общей протяженности минерализованной системы продолжается (рис. 1).




Рис. 1 а. Геохимия меди с содержанием более 200 ppm в почвах Кобраско и блока проекта Рио-Тинто-Комита; б. Поперечный разрез и в. План Кобраско с геохимическими данными о содержании меди в почве, трассировкой скважин и результатами анализа содержания меди в скважинах.

Непрерывная минерализация гипогенными сульфидами меди начинается примерно на 74 м и усиливается ниже 82 м, хотя локальное окисление сохраняется примерно до 92–94 м. Основная минерализованная зона простирается на 396 м и приурочена к микродиоритам, прорванным как минимум двумя генерациями кварцевых риолитовых порфиров. Магма-гидротермальные брекчии образовались вдоль контактов между риолитовыми порфирами и микродиоритами. Медная минерализация представлена халькопиритом в виде вкраплений, тонких прожилков и заполнений трещин и местами сопровождается молибденитом. Местами встречается борнит. Умеренное хлорит-серицитовое изменение, при котором хлорит является преобладающим минералом, перекрывает более ранние изменения от умеренных до интенсивных, связанные с калиевым изменением, представленным в основном вторичным биотитом, с присутствием магнетита в отдельных местах. Серицит-иллитовое изменение также проявляется в виде минерализованного цемента брекчии и фронтов изменения шириной от десятков см до нескольких м. В зонах с высокой интенсивностью трещиноватости микродиоритов локально встречаются самые богатые медью породы. Зона с высокой интенсивностью трещиноватости на участке между отметками 170 и 282 метра содержит большое количество халькопирита в жилах, прожилках и трещинах, связанных с хрупкой деформацией. Эта зона включает в себя более качественный интервал 44 м с содержанием 0,81% Cu и 110 ppm Mo, а также отдельный 2-м образец с содержанием 2,14% Cu на глубине 226 м. Отдельный 2-м образец с содержанием 2,20% Cu был взят на глубине 274 м.

На глубине ниже 300 м интенсивность медной минерализации снижается и становится более sporadic, но в основном сохраняется в риолитовых порфирах с кварцевыми прожилками до самого дна скважин. Микродиориты встречаются на ограниченных участках и местами содержат более высокую концентрацию меди. Общее снижение медной минерализации, вероятно, связано с уменьшением интенсивности и распространенности серицитовых изменений, которые с глубиной все больше ограничиваются. Борнит встречается локально в виде мелких вкраплений и тонких прожилков, обычно замещающий халькопирит. 6-м интервал, в котором содержание меди составляет 0,63% на глубине 376 м, связан с вкрапленным борнитом в ореоле серицитовых изменений. Поздние прослойки ангидрита–халькопирита и полиметаллические прожилки сфалерита–галенита–халькопирита вместе с гипсом перекрывают более ранние поколения жил. В общих чертах, кварцевые риолитовые порфиры внедряются в микродиориты, при этом внедрение риолитовых порфиров, вероятно, привело к образованию магма-гидротермальных брекчий, которые впоследствии подверглись минерализации.

Andina Copper Corporation — владеет двумя проектами в Андском меднорудном поясе в Аргентине и Колумбии, а также перспективным неразведанным медно-золотым м-нием в рудном районе Прибрежной Кордильеры в Чили.
<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

TORR METALS INC. - БУРЕНИЕ CU-AU-ПОРФИРОВОЙ СИСТЕМЫ BERTHA NORTH НА ЮГЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

23 сентября 2026 г.

Бурение определяет Берта-Норт как крупную гидротермальную систему порфирового типа, при этом бурение подтверждает наличие медьсодержащих брекчий, минерализованных структур и, что важно, пирито-халькопиритосодержащей интрузивной фазы.

Интеграция с геофизикой и геохимией поверхности обеспечила все более целенаправленное продвижение к приоритетной цели непосредственно к югу от текущего бурения. Здесь сильная аномалия содержания меди в почве и минерализованные структурные коридоры пересекаются с перекрывающимися магнитными, резистивными и зарядовыми сигнатурами над глубоким участком с высоким удельным сопротивлением, простирающимся на глубину более 1000 м, который интерпретируется как потенциальный интрузивный источник.

Бурение позволяет выявить новую крупномасштабную порфирово-гидротермальную систему, где были обнаружены медьсодержащие гидротермальные брекчии и минерализованные структурные коридоры, простирающиеся в направлениях север-юг и северо-восток-юго-запад.

Эти направления сходятся в не исследованной южной магнитно-резистивной области, совпадающей с сильными аномалиями содержания меди в почве.

В перспективных участках коридора гидротермальных брекчий были обнаружены интрузивные дайки, содержащие медно-минерализованные биотитовые фазы и измененные калиевые полевые шпаты. Глубокое удельное сопротивление указывает на потенциальный интрузивный источник - крупный объект с высоким удельным сопротивлением простирается на глубину более 1000 м под южной целью. Его верхняя граница сходится с минерализованными структурами и перекрывающимися магнитными, заряженными и резистивными сигнатурами, что указывает на приоритетную цель в направлении предполагаемого интрузивного источника (рис. 1).




Рис. 1 Виды на плане бурения на глубине 50 м: **а.** - показателя насыщения IP; **б.** - удельной электропроводности, а также геохимии меди на поверхности и интерпретированных структурных коридоров СЗ и СВ простираения. **в.** - косой продольный разрез, вид на запад через Берта-Норт.

При бурении были пересечены обширные зоны интенсивных гидротермальных изменений, брекчии, гематитизации и прожилков, содержащих пирит и магнетит, а также локальные залежи халькопирита и халькозина, где минерализация очевидна. Масштаб и интенсивность изменений указывают на значительный приток гидротермальных флюидов в систему. Эти измененные зоны определяют структурные коридоры, простирающиеся на север и северо-восток, которые считаются важными путями для медьсодержащих флюидов.

Бурение постепенно раскрывает структуру крупной минерализованной системы гидротермальных порфиров на проекте Берта-Норт. Бурение выявило обширные пиритовые и медьсодержащие гидротермальные коридоры и позволило определить направление к южной части проекта, где структурные, геологические и геофизические особенности все больше сходятся.

Дальнейшее бурение позволит проверить перекрывающиеся границы проницаемости и удельного электрического сопротивления и проводимости над и вдоль интерпретируемого глубокого интрузивного тела, которое остаётся открытым на глубине.

Torr Metals - проекты районного масштаба Медно-золотой проект «Колос» площадью 275 км² и стратегически важный проект «Берта» площадью 57 км², расположенные в рудном районе Квеснел на юге Британской Колумбии,

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

BLUE MOON METALS INC. – ПРОГРАММА ГРП НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ TURNER VMS В КЛЮЧЕВОМ РУДНОМ РАЙОНЕ НА ЗАПАДЕ США.

23 сентября 2026 г.

Тернер – это пр-ние VMS кипрского типа. Проект включает три запатентованных участка общей площадью 60 акров (рис. 1).



Рис. 1 Основные проекты ГРП на западе США.

Сульфидная минерализация залегает в офиолитовых вулканических породах, связанных с вулканизмом морского дна в условиях тектонического растяжения. Проект Тернер состоит из трех отдельных зон сульфидной минерализации: UNZ, MUZ и MLZ. Это полутаблитчатые, расположенные друг над другом тела, простирающиеся под углом 130 градусов (юго-восток) и наклоненные под углом 35 градусов к северо-востоку. Известная протяженность сульфидной минерализации составляет от 305 до 457 м, а глубина залегания — от 244 до 305 м. Геологическая непрерывность сульфидной минерализации в Тернере хорошо изучена с помощью бурения и трехмерного моделирования геологических и структурных особенностей.

Оценка минеральных ресурсов составляет 2,447 млн т в указанной категории, содержащих 1,25% меди, 2,79 г/т золота, 2,65% цинка, 9,64 г/т серебра и 0,05% кобальта, и 2,1 млн т в предполагаемой категории с содержанием 0,99% меди, 2,73 г/т золота, 2,78% цинка, 19,91 г/т серебра и 0,04% кобальта.

Компания намерена раскрыть оценку минеральных ресурсов ("MRE"), как выявленных в соответствии с Национальным стандартом 43-101.

Blue Moon - продвигает 5 проектов по разработке полиметаллов, в том числе медно-золото-серебряный проект Nussir в Норвегии, медно-цинково-золото-серебряный проект NSG в Норвегии, медно-цинково-золото-серебряный проект Blue Moon в США, вольфрамово-молибденовый проект Springer в США и германий-галлий-медный проект Apex в США.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

COLLECTIVE MINING LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА ВОЛЬФРАМ И ЗОЛОТО ЗА ПРЕДЕЛАМИ БРЕКЧИЕВОГО М-НИЯ АПОЛЛО, КОЛУМБИЯ.

24 сентября 2026 года

Результаты ГРП указывают на потенциал оруденения за пределами существующей модели минеральных ресурсов (МР) м-ния Аполло, в том числе на новую высокосортную вольфрамо-золотую зону, расположенную в сланцевых породах за пределами брекчии м-ния Аполло.

В скважине был обнаружен рудный интервал 8,15 м с содержанием 14,82 г/т AuEq (0,40% WO₃, 8,47 г/т Au и 4 г/т Ag), залегающий на глубине 927 метров от поверхности. Компания впервые обнаружила богатую вольфрамовую минерализацию в сланцах за пределами южной границы брекчии Аполло и открыла совершенно новую цель для ГРП. Эта формация сланцев простирается от поверхности до глубины более 1000 метров и практически не изучена.

Находка залегает на 680 метров ниже по вертикали от основания неглубокой вольфрамовой зоны, представленной на блоковой модели для Apollo, при этом бурение в этой сланцевой толще проводилось в очень ограниченном объеме. Планируется дальнейшее бурение для определения протяженности и непрерывности этого недавно обнаруженного типа минерализации.

Минерализация зоны простиралась на 35 м к западу от современной блоковой модели южной оси брекчии. Пересечение находится на 680 м ниже по вертикали от основания неглубокой вольфрамовой зоны, представленной в модели блока «Аполлон», что указывает на новое место залегания вольфрамовой минерализации в окружающих сланцах. Отдельная 1,05-м жила, пересеченная ниже по скважине, дала 13,58 г/т AuEq на глубине 943 метра. Эти результаты указывают на новую цель для поиска вольфрамово-золото-серебряных жил за пределами брекчии

«Аполлон». Планируется провести повторное бурение, чтобы проверить протяженность и непрерывность этой минерализации, поскольку между этой глубиной и близкой к поверхности мелкозалегающей вольфрамовой зоной бурение не проводилось (рис. 1).




Рис. 1 План (а) и разрез (б) результатов бурения брекчии Аполло.

В скважинах была обнаружена умеренная минерализация в стиле Рэмп, связанная с незначительными альбитовыми, мусковитовыми и эпидотовыми изменениями, а также аномальным содержанием висмута и теллура. Эти пересечения позволяют предположить, что новая минерализация простирается на 35 м на запад вдоль южной границы брекчии Аполло за пределы современной блоковой модели зоны Рэмп.

Collective Mining Ltd. - компания по разведке м-ний золота, серебра, меди и вольфрама с проектами в Кальдасе, Колумбия. Флагманский проект компании, Гуайябалес, включает в себя крупное, многотоннажное и высокосортное золото-серебро-медно-вольфрамовое месторождение Аполло,

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

АТЭРРА METALS – ГРП НА ПРОЕКТЕ TOTORA Cu-Au, ЧИЛИ.

24 сентября, 2026

Медно-золотая минерализация на территории проекта приурочена к меловым диоритовым порфирам и связанным с ними брекчиям в структурном коридоре, простирающемся с северо-востока на юго-запад. Порфиры связаны с кварцевыми диоритами и диоритовыми интрузиями, входящими в Домейковский интрузивный комплекс, прорывают юрские осадочные и вулканические породы и тесно связаны с региональными разломами, простирающимися с северо-востока на юго-запад. На четырех пр-ниях преобладает сульфидная минерализация, а оксидный компонент на поверхности незначителен. Основным медным минералом, входящим в состав предполагаемых ресурсов, является халькопирит, иногда встречающийся в виде борнита на м-нии Фронтера, связанном с калиевыми изменениями и залежами жил А- и В-типа (рис. 1).



Рис. 1 Расположение медно-золотого проекта Тотора и других проектов в рудном районе Дос-Амигос.

Предполагаемые запасы на проекте: 159,8 млн т с содержанием 0,30% меди и 0,15 г/т золота, или 0,51% эквивалента меди ("CuEq"), при базовом пороговом содержании 0,20% меди.

Предполагаемые ресурсы включают четыре приповерхностных медно-золотых порфировых систем: Фронтера, Тотора, Альгарробилья и Клинтон.

Бурение будет сосредоточено на проверке участков, выходящих за пределы предполагаемых ресурсов, увеличении плотности бурения и получении образцов для металлургических исследований. Также будут изучены непроверенные цели Cu и Au в границах проекта (рис. 2).




Рис. 2 3D-модели предполагаемых минеральных ресурсов CuEq медно-золотых систем: Фронтера (а), Тотора и Альгарробилья (б), Клинтон (в).

Фронтера — бурение подтвердило наличие минерализованного кварцевого диоритового порфира с калиевыми изменениями и выявило 284 м породы с содержанием 0,77% CuEq на поверхности (0,41% Cu и 0,27 г/т Au). Результаты подтвердили, что пр-ние содержит центральную зону с более богатой медно-золотой минерализацией, простирающуюся от поверхности до глубины. Остается открытым на глубину.

Тотора и Альгарробилья — в ходе бурения на Тотора была выявлена структурно контролируемая минерализованная система, простирающаяся более чем на 800 м вдоль поверхности и на глубину до 500 м. Подтверждено наличие измененного кварцевого диорита с локально рассеянным пиритом и халькопиритом, связанными с кварцевыми прожилками и калиевыми изменениями от умеренных до сильных. На глубине было пробурено 194 м породы с содержанием 0,50% CuEq (0,35% Cu и 0,11 г/т Au). Минерализация продолжается до поверхности и остается открытой на глубину.

П-ние Альгарробилья расположено в 1 км к югу от Тотора. В ходе бурения был обнаружен минерализованный коридор протяженностью 700 м. Была обнаружена сульфидная минерализация, в основном пирит и халькопирит.

Клинтон — медно-золотой порфировый объект расположен в измененном кварцевом диорите, внедрившемся вдоль регионального разлома Пахоналес — той же структуры, вдоль которой образовалась Фронтера. Пр-ние представляет собой ограниченное трубчатое тело, простирающееся от поверхности до глубины более 400 м и открытое на глубину.

ATERRA Metals Inc. — флагманский медно-золотой проект *Totor* расположен в рудном районе Дос-Амигос в регионе III, Чили. Проект включает в себя участки Тарука, Клинтон, Фронтера и Севилья, а также медно-золотые порфировые системы Фронтера, Тотора, Альгарробилья и Клинтон

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

PACIFIC RIDGE EXPLORATION LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТЫХ ПРОЕКТАХ KLIYUL И RDP В КВЕСЧЕЛЬСКОМ ТЕРРЕЙНЕ В КАНАДЕ.

24 сентября 2026 г.

Проекты компании имеет площадь более 100 км² и расположены на южной оконечности Тудогдонского района, одного из самых перспективных рудных районов в Британской Колумбии (рис. 1).




Рис. 1 Расположение медно-золотых проектов Kliyu и RDP (а) и целевые зоны RDP (б).

На RDP в ходе бурения скважин общей протяженностью 1,958 м был протестирован западный магнитный объект, в результате которого было получено 130,8 м с содержанием 0,47% CuEq * или 0,70 г/т AuEq ** (0,30%, 0,24 г/т Au или 1,34 г/т Ag) с глубины 450 м. Эти скважины подтвердили наличие непрерывной медно-сульфидной минерализации (халькопирит +/- борнит) на участках длиной более 300 м. Кроме того, результаты показывают, что порфировая минерализация в западной магнитной зоне не связана напрямую с магнитными аномалиями, выявленными с помощью инверсии магнитного вектора, и что магнитные градиенты и минимумы также могут содержать минерализацию, что расширяет пространство для ГРП.

Геофизические работы на RDP включали 11,7 погонных км магнитотеллурической съемки на семи линиях над уч-ком Дай, 1,2 погонных км на одной линии над Рой и 283 погонных км аэромагниторазведки над южной частью участка. Эти наборы данных будут интегрированы с данными бурения, геологическими, геохимическими и существующими магнитными моделями для уточнения целей последующих исследований (рис. 2).




Рис. 2 Целевые зоны на аэромагнитной карте.

Клиюль имеет площадь более 90 км² и вмещает 334,1 млн т с содержанием 0,33% CuEq (0,15% меди, 0,26 г/т золота и 0,95 г/т серебра) в предполагаемой категории минеральных ресурсов, и он остается открытым для расширения.

Геофизические работы на Клиюль включали 10,7 погонных км сейсморазведки методом отраженных волн над целевым участком Бап-Ридж и 5,4 погонных км над участком М39. Дополнительная сейсморазведка методом отраженных волн на участке М39 поможет в выборе точек для будущих буровых работ (рис. 3).




Рис. 3 Вид в плане целевых районов Клиюля (а) и цели М39 на аэромагнитной карте (б).

Помимо КМЗ, вдоль шестикилометрового медно-порфирового золотоносного рудного тела, характеризующегося благоприятными геологическими, геохимическими, метаморфическими и геофизическими характеристиками, в том числе на уч-ке М39, остается множество непроверенных объектов. М39 связан с медно-золотой аномалией в почве протяженностью 1 км. На уч-ке присутствуют дайковые монзониты, магнетитовые скарны, содовые изменения и кварцевые жилы с халькопиритом, а также две кольцевые магнитные аномалии. Компания пробурила четыре скважины (1524 м) на участке М39. Каждая пробуренная скважина пересекала измененные породы и прожилки, связанные с интрузиями порфировых диоритов. Комплексы измененных пород и прожилков сопоставимы с теми, что были встречены в скважинах, расположенных на периферии минерализации КМЗ. В обеих областях широко распространены кварц-ангидрит-эпидот-пиритовые жилы, пустые ранние кварцевые жилы и вкрапленный пирит. Эти сходства указывают на то, что бурение на участке М39 могло затронуть периферийную зону изменений медно-золотой порфировой системы, и подтверждают возможность наличия близлежащей минерализации.

Pacific Ridge – реализует флагманский медно-золотой проект «Клиюль». Помимо Klyul, в портфель проектов Pacific Ridge входят медно-золотой проект RDP, медно-золотой проект Onjo и медно-золотой проект Redton, расположенные в Британской Колумбии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP - НАМЕТИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ EXCALIBUR В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

24 сентября 2026 г.

Новые объекты поисков были выявлены в результате повторной обработки данных региональной аэромагнитной съемки. Их магнитные характеристики аналогичны характеристикам объектов, которые были успешно протестированы в ходе первой программы бурения на участке Excalibur (рис. 1).




Рис. 1 Расположение проекта Excalibur и других близлежащих проектов (а) и расположение новой зоны притязаний, площадью 385,6 га, а также буровых скважин и площадок региональной магнитной съемке (б).

Буровая кампания нацелена на две крупные, приоритетные зоны по магнитному полю и удельной электропроводности, которые были первоначально определены наземной геофизической съемкой и дополнительно подтверждены аномальными значениями содержания меди и золота в почве. Наблюдения в первых двух скважинах подтверждают открытие новой порфировой системы: 515 м гидротермальных изменений различной интенсивности и вкрапленной сульфидной минерализации с преобладанием пирита. Также удалось пересечь локальную, структурно обусловленную силикатизацию в верхних 131 м, за которой следует неравномерное калиевое изменение в нижних 333 м.

На проекте Excalibur находится 12 перспективных магнитных аномалий в одних и тех же геологических породах, и, если доступны данные о почве и почвенном покрове, эти аномалии подтверждаются откликами на заряд, совпадающими с аномалиями меди/золота в почве (рис. 2).




Рис. 2. План бурения с использованием геофизических и геохимических данных (а) и 3D разрез законченного бурения, указывающий на наличие нескольких целевых объектов (б).

В рамках программы бурения, ориентированной на открытие нового оруденения, были протестированы два приоритетных объекта по магнитному полю и удельной электропроводности, выявленных в ходе наземной геофизической съемки и подтвержденных аномалиями содержания меди и золота в почве.

Компания Prospect Ridge проводит дополнительные ГРП в рамках обширного портфеля проектов, включая повторную кампанию по бурению на участке Camelot.

Prospect Ridge Resources Corp. — развивает свои проекты Golden Horseshoe и Cariboo в северо-центральной части Британской Колумбии — высокопотенциальные медно-золотые системы, расположенные в одном из наименее изученных минеральных поясов Канады.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

FIRST PHOSPHATE - ПОДТВЕРЖДАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШИХ ГРР НА ФОСФАТНОМ ПРОЕКТЕ БЕГИН-ЛАМАРШ В СЕВЕРНОМ КВЕБЕКЕ.

21 сентября 2026 года

Новое исследование проекта Бегин-Ламарш, где рассматривается процесс формирования богатых фосфатами слоев (рис. 1).




Рис. 1. **а.** - Основные магматические комплексы, из которых добываются магматические фосфатные руды по всему миру; **б.** - Зависимость среднего содержания от тоннажа (ресурсов) крупных м-ний магматических фосфатов в карбонатитах и недосыщенных кремнеземом щелочных интрузиях в разных странах мира.

Также показано расположение провинции Гренвилль, где находятся м-ния фосфатов, приуроченные к анортозитам (Бегин-Ламарш, Лак-а-л'Ориньяль и Лак-а-Поль) и расслоенным мафическим интрузиям (шахта Арно в интрузивной свите Севен-Айлс). Кроме того, показано расположение фосфатного м-ния Мартисон в Канаде, залегающего в карбонатитах. Также показаны м-ния магматических фосфатов, залегающие в массиве анортозитов (Бегин-Ламарш, Лак-а-л'Ориньяль и Лак-а-Поль) и в слоистой мафитовой интрузии (Септ-Иль) в провинции Гренвилль в Квебеке, Канада. Кроме того, включено м-ние фосфатов (Мартисон) в карбонатитах в Онтарио, Канада. В качестве эталона показано крупное м-ние осадочных фосфатов — рудник «Аврора» в США.

Выводы исследования кратко изложены ниже:

1. Проект приурочен к массиву анортозитов и связанным с ним нельсонитам и оксидно-апатитовых породах основного и ультраосновного состава анортозитовой свиты Лак-Сен-Жан. Апатит представляет собой первичную фосфатную минерализацию, подтверждающую магматическое происхождение и геологическую преемственность фосфатосодержащих зон в Горной, Северной и Южной зонах.

2. Аналитические результаты показывают, что фосфатная минерализация может быть источником высококачественного фосфатного концентрата. Тестирование показало, что содержание P_2O_5 в концентрате составляет около 40%, что выше среднемировых показателей для магматических фосфатных концентратов и подтверждает возможность его использования для производства очищенной фосфорной кислоты (РРА).

3. Геохимическая характеристика показывает низкий уровень содержания вредных микроэлементов, в отличие от тех, которые обычно встречаются в осадочных фосфатных м-ниях. Такие низкие концентрации вредных микроэлементов повышают вероятность получения полифосфата аммония высокой степени очистки, пригодного для использования в качестве активного материала катода литий-железо-фосфатного аккумулятора (LFP).

4. Геометрия, мощность и приповерхностное залегание некоторых фосфатных пластов указывают на благоприятные условия для потенциальной разработки открытым способом при

условии проведения дальнейших инженерных изысканий и планирования горных работ. Это подтверждает долгосрочный потенциал разработки проекта.

First Phosphate – проект Бегин-Ламарш, расположенный в регионе Сагней-Лак-Сен-Жан, Квебек, является флагманским проектом компании. Металлургические исследования показали, что содержание апатита в концентрате составляет 40,4%. Апатит признан критически важным минералом правительствами Канады, США и Европейского союза.

<https://www.canadianminingjournal.com/news/new-study-supports-further>

GRAPHANO ENERGY LTD - ПРОГРАММА ГПП НА ПРОЕКТЕ BLACK JACK GRAPHITE DISCOVERY В КВЕБЕКЕ.

23 сентября 2026 г.

Как и сообщалось ранее, в соответствии с разрешениями на ГПП, полученными от Министерства природных ресурсов и лесов Квебека (MRNF), команда приступает к картированию и систематическому отбору проб в Блэк-Джеке. Также будут проведены наземные геофизические исследования для подготовки сектора Блэк-Джек к разведочному бурению. Результаты в рамках текущей программы работ будут опубликованы после получения всех данных.

Выход на проект Black Jack — важный шаг вперед для Graphano. Компания продвигается к тому, чтобы подготовить проект к бурению, опираясь на результаты, которые получили на м-нии Блэк-Перл, расположенном всего в километре от Black Jack.

Graphano Energy Ltd. — компания, занимающаяся ГПП на графит — одного из самых востребованных технологических минералов.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

NEOTECH METALS CORP. - ПРОГРАММА ГРР НА ПРОЕКТЕ ТОРРАНС ПО ДОБЫЧЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ФОСФАТОВ В ОНТАРИО, КАНАДА.

16 сентября 2026 г.

В рамках программы ГРР будет протестирован ряд геофизических объектов, выявленных на территории проекта, с помощью программы бурения (2000 м). Полевые работы будут включать отбор проб региональных базальных тиллитов, картирование и отбор проб обнажений, а также отбор проб геохимического состава почвы для дальнейшей оценки и уточнения дополнительных целей ГРР.

Проект Торранс расположен примерно в 70 километрах к югу от принадлежащего компании проекта по добыче редкоземельных элементов и фосфатов «Хекла-Килмер» в северном Онтарио. Участок характеризуется крупной кольцевой магнитной аномалией, занимающей площадь 10 км². Несмотря на масштаб геофизической аномалии, обнажение коренных пород в границах участка ограничено. Первоначальные буровые работы сосредоточены на ярко выраженных магнитных высотах и их контактах с прилегающими магнитными впадинами, которые интерпретируются как перспективные геологические и структурные условия для минерализации.

Neotech Metals Corp. — владеет диверсифицированным портфелем проектов по добыче редкоземельных элементов и критически важных минералов, в том числе проектом по добыче редкоземельных элементов и фосфатов «Хекла-Килмер»

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

COSA RESOURCES CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ DARBY URANIUM, БАССЕЙН АТАБАСКА.

16 сентября 2026 г.

На проекте Дарби, расположенном в 10 км к западу от рудника Сигар-Лейк, содержится множество перспективных проводящих структур и несколько участков со слабой урановой минерализацией (рис. 1).




Рис. 1 Урановые проекты компании Cosa в восточной части Атабаска (а) и план проекта Дарби (б).

Планируется бурение на участке Гамма для изучения структуры, изменений и аномальной геохимии урана и на участке Браво для изучения слабой урановой минерализации вблизи структуры и измененных пород в пределах магнитного прогиба, простирающегося на северо-восток до озера Сигар.

Планируется пробурить до 2500 метров для тестирования нескольких объектов на участках Гамма и Браво. На участке Гамма была обнаружена зона шириной более 100 м с графитовыми разломами фундамента, связанными с более чем 30-м несогласным залеганием и изменениями фундамента, а также повышенным содержанием урана в базальном песчанике. Урановая минерализация была обнаружена в нескольких скважинах, пробуренных на участке Гамма, непосредственно к северу от Проекта. На участке Браво бурение будет направлено вдоль простирания обнадеживающих результатов, включающих графитовую структуру, изменений и урановую минерализацию, связанную с более чем 25-м несогласным залеганием. Участок Браво расположен в зоне магнитного минимума, простирающейся на северо-восток через урановый рудник Сигар-Лейк.

Cosa Resources Corp. — портфель компании включает 237 тыс га в нескольких малоизученных районах под управлением Cosa, в регионе бассейна реки Атабаска. Большинство из них расположены в урановых коридорах или рядом с ними.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GREEN CANADA URANIUM CORP. - БУРЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА МАРШАЛЛ, БАССЕЙН АТАБАСКА.

16 сентября 2026 г.

Маршалл находится в непосредственной близости от нескольких крупных урановых месторождений и перерабатывающих предприятий, в том числе рудника МакАртур-Ривер компании Самесо, рудника Ки-Лейк-Милл и месторождения Миллениум, а также подземных проектов компании Denison — Phoenix ISR и Gryphon.

Планируется пробурить две скважины для проверки электромагнитных целей в зоне несогласия между песчаником и подстилающими породами, залегающими на глубине 725 метров. MRL-001 нацелена на два мощных электромагнитных (ЭМ) пика, расположенных к юго-востоку от круговой аномалии проводимости (рис. 1).




Рис. 1 Электромагнитная цель MRL-001 в зоне несогласия.

Вторая приоритетная цель расположена к северо-западу от той же круговой аномалии электропроводности.

Green Canada Uranium Corp. — владеет портфелем урановых проектов в бассейне реки Атабаска в Саскачеване и в бассейне реки Отии в Квебеке, включая флагманский проект Marshall в восточной части бассейна реки Атабаска в Саскачеване

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

XCITE URANIUM INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ ДОН ЛЕЙК, САСКАЧЕВАН.

17 сентября 2026 года

Проекты Бивер-Ривер, Блэк-Бей, Дон-Лейк, Галч, Лорадо и Смитти расположены в районе Биверлодж недалеко от Ураниум-Сити в регионе озера Атабаска в провинции Саскачеван. В районе Ураниум-Сити много месторождений урана, которые исследуются и документируются с 1940-х годов. В районе Ураниум-Сити есть потенциал как для урановой минерализации типа Биверлодж, так и для урановой минерализации в базальтовом фундаменте.

Ключевые особенности проектов:

- обнажение, в основном тектоническая структура с простиранием с северо-востока на юго-запад;
 - электромагнитные проводники, которые, как было подтверждено, представляют собой богатые графитом пелиты в пределах крупных разломов или вблизи них;
 - аномальная геохимия урана и радиоактивность, связанные с графитовыми разломами;
 - убедительные доказательства гидротермальных изменений на всей территории.
- Урановая минерализация с соответствующими аномалиями элементов-спутников (рис. 1).




Рис. 1 Схема Ураниум- Сити.

Эти факторы, наряду с наличием значительных запасов урана как в породах фундамента, так и в покровных породах бассейна Атабаски, указывают на высокий потенциал промышленной урановой минерализации в пределах проекта. Выявленные на сегодняшний день на участках минерализация, структуры и изменения являются вескими доказательствами возможности наличия близлежащего источника урановой минерализации. При бурении на участках В и С были обнаружены многочисленные зоны аномальной радиоактивности. Программа бурения (1106 м) скважины подтвердила наличие структурно контролируемой урановой минерализации, выявленной в ходе полевых программ.

Урановый проект "Дон Лейк" расположен недалеко от Урановый Сити, Саскачеван, и в нем имеется приповерхностная урановая минерализация, а также урановый рудник, добывавшийся в прошлом. «Дон-Лейк» Проект площадью 1671 га с 12 месторождениями, которые связаны с урановой минерализацией в фундаменте типа Биверлодж.

Проекты перспективны для разработки урановой минерализации в стиле Beaverlodge, размещенной в фундаменте и в несогласии (рис. 2).




Рис. 2 Схемы зон А, В, С (а), карта (б) и разрезы (в) м-ний Донского озера

В рамках программы бурения проводится поиск неглубоких структурно контролируемых урановых пр-ний к западу от разлома Блэк-Бэй и к северу от разлома Таунсенд в зонах «Дон» и «Мидас». Скважины ориентированы на пересечение структур северо-восточного и северо-западного простирания. В зоне «Дон» бурение будет направлено на выявление продолжения высокосортной урановой минерализации на участках А, В и С. В зоне Мидас бурение будет направлено на источник совпадающих урановых геохимических аномалий и сильную аномалию, обнаруженную в ходе радиометрической съемки

Урановая минерализация в Дон-Лейк структурно обусловлена и встречается в виде настурана в трещинах и жилах, связанных с разломами и зонами сдвига, и часто сопровождается графитом и сульфидами.

Зона А представляет собой систему жил длиной 213,4 м, которая пересекает северо-восточный линеамент. Над этой зоной пройдено 14 траншей и 20 неглубоких буровых скважин. Аналитические результаты варьируются от следовых значений до 8,57% U_3O_8 на глубине 0,91 м и 2,86% U_3O_8 на глубине 0,61 м при проходке траншей и 10,7% U_3O_8 на глубине 0,3 м и 2,14% U_3O_8 на глубине 0,67 м.

В зоне В, расположенной на северо-западе и представляющей собой продолжение минерализованной полосы, наблюдаемой в зоне А, пробурено 12 неглубоких скважин и пройдено 20 траншей. По результатам отбора проб из траншей содержание урана достигало 1,17% U_3O_8 на глубине 1,98 м, а по результатам бурения — 0,71% U_3O_8 на глубине 0,34 м и 0,64% U_3O_8 на глубине 0,3 м. Урановая минерализация встречается в серии жил и трещин.

Зона С расположена к юго-востоку от зон А и В и дополнительно определяет северо-западную и юго-восточную минерализованные зоны. В зоне С пробурено 6 неглубоких скважин и 9 траншей, в образцах из траншей содержание урана варьировалось от следовых количеств до 3,02% U_3O_8 на глубине 0,61 м, а в образцах из скважин — от 0,80% U_3O_8 на глубине 0,3 м до 0,85% U_3O_8 на глубине 0,52 м.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

BRUNSWICK EXPLORATION INC. - ПЕРЕСЕКАЕТ СПОДУМЕНОВЫЙ ПЕГМАТИТОВЫЙ ИНТЕРВАЛ НА ПРОЕКТЕ MIRAGE В КВЕБЕКЕ.

17 сентября 2026 г.

202 м сподуменовых пегматитов, содержащих в 25% сподумена выявлены по дайке Анаис на глубине 300 м. Дайка Анаис остается открытой во всех направлениях и значительно расширилась после этого бурения.

В ходе бурения также были обнаружены несколько других интервалов пегматитов, содержащих сподумен, отдельно от 202-м интервала, шириной до 21,3 м, содержащих от 20 до 35% сподумена (рис. 1).



Рис. 1 Региональная карта проекта Анатакау (а), план (б) и разрез (в) результатов бурения.

Утолщение пегматитовых интрузий на глубине изучено в процессе бурения, которое направлено на продолжение вкрест простирания даек.

Mirage — один из крупнейших неразработанных проектов лития в коренных породах в Северной и Южной Америке с предполагаемыми минеральными ресурсами в 52,2 млн т при содержании Li_2O 1,08%.

Brunswick Exploration — специализируется на первичной разведке литиевых м-ний в Канаде, Гренландии и Саудовской Аравии.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

PUREPOINT URANIUM GROUP INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ DORADO В БАСЕЙНЕ АТАБАСКА.

17 сентября 2026 г.

Радиоактивный интервал находится в сильно измененных и структурно нарушенных породах фундамента, в отдельной целевой зоне.

Скважина прошла через мощный электромагнитный проводник и достигла несогласия на глубине встретив сильно измененный и разрушенный песчаник. Основной радиоактивный интервал простирался от 284,1 до 291,5 м и имел среднюю мощность 8760 импульсов в секунду на протяжении 7,4 метра, в том числе 0,5 метра со средней мощностью 38 710 импульсов в секунду. На 3,3 м ниже, на отметке 294,8 метра, были обнаружены халькопиритовые (медные) прожилки. На глубине 318 м скважина достигла серицита, глины и хлоритовых измененных пелитовых гнейсов. Второй радиоактивный интервал, расположенный чуть ниже прожилков халькопирита, имел среднюю мощность 1010 бк на 6,2 м от 297,2 до 303,4 м. Пиритовый графитовый пелитовый гнейс с хлоритовыми изменениями и брекчией локальных разломов был пробурен на глубину от 318 до 343 м, после чего был обнаружен неизменный пелитовый гнейс на глубине 551 м. (рис. 1).




Рис. 1 Карта Проекта Dorado, цели Nova, Q23 и Q24 (а) и цели Q23/Q24 - карта компиляции (б)

Было пробурено 3669 м скважин в целевых районах Нова, Q23 и Q24. В ходе программы были изучены различные геологические и геофизические условия в районе Дорадо. Радиоактивность была обнаружена более чем в одном целевом районе, что подтверждает стратегию по систематической оценке нескольких перспективных коридоров в рамках проекта. Результаты Q24, а также Q23 и более обширная геологическая информация, собранная в ходе программы бурения, будут объединены с окончательными структурными интерпретациями MobileMT для определения приоритетов дальнейших ГРП.

На проекте «Дорадо» находится пр-ние «Нова Дискавери», где в результате предыдущего бурения были получены пробы с содержанием до 8,1% U_3O_8 на глубине 0,4 метра и 1,62% U_3O_8 на глубине 2,1 метра. Урановая минерализация была выявлена вдоль перспективного структурного коридора протяженностью около одного км и связана с интенсивными изменениями, структурными нарушениями и графитизированными породами фундамента.

Исследования на Дорадо направлены на развитие Nova Discovery, а также на систематическую оценку дополнительных приоритетных объектов в перспективных структурных и проводящих коридорах проекта, включая участки Q23 и Q24.

Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU) (OTCQB: PTUUF) — управляет проектом «Дорадо», где в результате разведки Nova Discovery были получены подтвержденные результаты с содержанием до 8,1% U_3O_8 ,

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GEIGER ENERGY CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА УРАН В РАМКАХ ПРОЕКТА АБЕРДИН В БАССЕЙНЕ ТЕЛОН, НУНАВУТ.

21 сентября 2026 г.

Два новых пр-ния Фокс и Аполло, открытые на расстоянии 10 км друг от друга, расположены прямо на разломе Эндрию-Лейк. по простиранию от месторождений Киггавик в районе Орано. Коридор простирается на 17 км через проект Абердин, где есть множество аналогичных непроверенных объектов (рис. 1).




Рис. 1 Схема проекта «Абердин», пр-ние Fox и разлом Эндрию-Лейк (а), тренд разлома Эндрию-Лейк на магнитной карте (б) и поперечный разрез зоны урановой минерализации (в).

Минерализация структурно контролируется и приурочена к измененным полевошпатовым порфирам и гранитам, перемежающимся с псаммопелитовыми гнейсами. Уран встречается в основном в виде настурана, умеренно или локально широко распространенной вдоль трещин и брекчий, а также в прилегающих вмещающих породах, с локальными бледно-желтыми вторичными минералами. Изменения обширны и местами интенсивны — сильная глинизация, лимонитизация, сажистый пирит и вторичный красный гематит — классические признаки ураноносных систем в этом регионе.

Фокс расположен прямо на разломе Эндрю-Лейк, главном структурном коридоре. Этот коридор простирается на 17 км. Обе цели были созданы на основе интерпретации гравитационных, магнитных и структурных данных. На участке Фокс три скважины, пробуренные в зоне, определяемой двумя соединенными аномалиями низкой гравитации, подтвердили наличие обширной, структурно контролируемой ураноносной гидротермальной системы с нарастающей радиоактивностью и минерализацией по мере приближения к поверхности. Многие аналогичные гравитационные аномалии вдоль коридора остаются непроверенными.

Эти открытия существенно расширяют возможности компании, выходящие за рамки уже открытых м-ний Татиггак и Каввик, и определяют стратегию: активное развитие пр-ний Fox и Apollo при систематическом тестировании дополнительных объектов вдоль коридора.

Geiger - контролирует 338 тыс га в бассейне Атабаска и 95 тыс га в бассейне Телон в Нунавуте — двух самых перспективных урановых районах в мире. На флагманском проекте Aberdeen (бассейн Телон) были обнаружены м-ния Татиггак и Каввик, залегающие в фундаменте.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

SCANDIUM CANADA LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРП НА СКАНДИЕВОМ ПРОЕКТЕ КРАТЕР-ЛЕЙК (TG) В НУНАВИКЕ, КВЕБЕК.

23 сентября 2026 г.

Скважина пересекла 140 м скандиевой минерализации с содержанием 293 ppm Sc_2O_3 , что является самым длинным участком, включая 30-м высокосортный участок с содержанием 512 ppm. Все 12 пробуренных скважин имеют скандиевую минерализацию, уровни которой соответствуют текущей оценке ресурсов и соответствует прогнозам модели, что потенциально увеличивает протяженность минерализованных зон на 245 метров. Две скважины в районе Дискавери пересекли два узких пироксеновых ферросиенита мощностью до 1 м.

Всего было пробурено 40 скважин общей протяженностью 7701 м (рис. 1).




Рис. 1 План (а) и разрез (б) пробуренных скважин.

Компания получила результаты анализа проб, взятых из 9 скважин, пробуренных для извлечения объёмного образца на TG. Все пробуренные скважины пересекли целевые литологии и минерализацию, а именно ферросиениты с высоким содержанием оливина или пироксена, содержащие скандий, в концентрациях, соответствующих оценке минеральных ресурсов проекта TG.

Scandium Canada Ltd. — компания, специализирующаяся на критически важных материалах, разрабатывающая единственный в Северной Америке вертикально интегрированный источник скандия — проект «Кратер-Лейк» в Нунавике, Квебек


<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

GREENRIDGE EXPLORATION - ПРОГРАММА ГРП НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ HOOK-CARTER, АТАБАСКА.

24 сентября 2026 г.

На территории проекта Хук-Картер находятся предполагаемые северо-восточные продолжения параллельных структурных тенденций, в том числе коридор Дерксона и продуктивный коридор Паттерсон-Лейк («PLC»), вдоль которого к юго-западу от проекта было обнаружено множество урановых м-ний и проявлений.

Денисон и Гринридж провели тринадцать линий электромагнитной съемки с фиксированным контуром («FLEM») общей протяженностью 15,85 линейных км на двух контурах заземления, при этом показания снимались на расстоянии пятидесяти метров от станций в коридоре Дерксона (рис. 1).



что подтверждает статус пр-ния Боа-Виста как второго центра минерализации наряду с Крусетой. Донные отложения — региональный галлий с пиками редкоземельных элементов к югу от пр-ния Боа-Виста (рис. 1).




Рис. 1: Карта образцов почвы, речных отложений и обломков горных пород на объекте Voá Vista Target.

Набор данных позволяет установить первичный источник для поверхностной системы.— крупнозернистый порфировый гранит, расположенный в 2,5 км к северу, демонстрирует самое высокое соотношение MREO/TREO в свежих породах в пределах коридора (28,1%), при этом содержание неодима и празеодима составляет 188 ppm.

Следующие шаги

- отбор проб грунта с близкими интервалами по галлий-скандиевому горизонту для определения поперечного протяжения и границ аномалии;
- систематическое опробование горных пород для определения местоположения и характеристики первичных источников;
- определение вертикальной протяженности редкоземельного горизонта, который остается открытым на глубине;
- минералогическая характеристика исходных материалов, содержащих галлий, скандий и ниобий.

Spark Energy Minerals Inc. —проект Арапайма, включает 92 тыс га в Литиевой долине, Бразилия. Компания обнаружила залежи галлия и редкоземельных элементов в Крусете и в Боа-Виста, где минерализация приурочена к ионно-адсорбционным глинам, образовавшимся на гранитах Каладао. Второстепенным объектом на участке являются литиевые пегматиты.

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>

URANIUMX DISCOVERY CORP. - ГРАВИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА ПРОЕКТЕ МЕРФИ-ЛЕЙК В САСКАЧЕВАНЕ.

25 сентября 2026 г.

Следующим шагом на Мерфи-Лейк станут наземная гравиразведка и расширенная электромагнитная разведка. Ожидается, что программа будет включать в себя гравиметрическую съемку всей территории объекта и расширение охвата MLEM вдоль обоих направлений (рис. 1).




Рис. 1 Система проводников Мерфи-Лейк и запланированные ГРП.

Система проводников не заканчивается на границе проекта. Скважина на участке Q24 прошла 7,4 м в сильно измененных и структурно нарушенных породах фундамента со средней скоростью 8760 каротажных единиц в секунду. Были протестированы шесть целевых участков на протяжении 9,2 линейных км, покрытых MLEM, и в пяти из них была обнаружена аномальная радиоактивность, а также сильные гидротермальные изменения на несогласии в нескольких скважинах. Эти результаты показывают, что система проводников на участке минерализована на протяжении 330 м по простиранию Северного тренда и 1,3 км по простиранию Южного тренда, но они пока не позволяют определить, где именно вдоль этих трендов лучше всего развиты изменения и структуры, которые концентрируют уран в несогласии. Это цель следующего этапа геофизических исследований.

Региональные электромагнитные проводники простираются к югу от участка Мерфи-Лейк в сильно глинисто-серицитово-хлоритовых измененных и структурно разрушенных пелитовых гнейсах с местной брекчированностью разломов и графитовых породах фундамента.

Ведется планирование программы ГРП, включающей (1) гравиметрическую съемку по всему участку и (2) расширение покрытия MLEM как по Северному направлению, где была пересечена смоляная обманка, так и по Южному направлению, где самые высокие показатели гамма-излучения, включая южную часть участка по направлению к границе проекта, для проверки наличия дополнительных проводящих коридоров между шестью целевыми участками, так и за их пределами. Окончательный объем работ, сроки и бюджет будут определены после получения результатов анализа Мерфи-Лейк и их сопоставления с данными бурения.

UraniumX Discovery Corp. — флагманский проект урана Мерфи-Лейк находится на северо-востоке бассейна Атабаска в провинции Саскачеван

<https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases>