ФГБУ «ВИМС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-БЮЛЛЕТЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРР И ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ ПИ

ЧЕРНЫЕ (Fe, Cr, Mn, Ti, CaF_2 и др.),
ЦВЕТНЫЕ (Cu, Mo, W, Sn, Al и др.),
НЕРУДНЫЕ (графит, кремнезем, уголь и др.)
РАДИОАКТИВНЫЕ (U, Th)
РЕДКОМЕТАЛЬНЫЕ (Zr, Nb-Ta, Be, Li и др.)

№ 361

октябрь-ноябрь 2026г.

Редактор-составитель: В.В. Коротков

СОДЕРЖАНИЕ:

Сырье	РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	Стр
Cu Ag	1. COPPER ONE RESOURCES CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-СЕРЕБРЯНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ МАДЖУБА ХИЛЛ, НЕВАДА……..	4
Sb Au	2. SLAM EXPLORATION LTD. - ГРР НА ЗОЛОТО-СУРЬМЯНО-СЕРЕБРЯНОМ ПРОЕКТЕ МУС-ЛЕЙК, НЬЮ-БРАНСУИК……..	4
W Sb	*3.* GOLDERA EXPLORATION LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ЗОЛОТО, ВОЛЬФРАМ И СУРЬМУ НА ПРОЕКТЕ РАЙЛИ БРУК В СЕВЕРНОМ НЬЮ-БРАНСУИКЕ……..	6
Cu Au	4. STAR COPPER CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ «СТАР» В ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……..	7
Cu Mo	5. COAST COPPER – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ COPPER KETTLE НА ОСТРОВЕ ВАНКУВЕР, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ……..	8
Cu	**6.** MIDNIGHT SUN MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ПРОЕКТЕ МЕДИ ДУМБВА В ЗАМБИИ……	9
Cu	7. ALGO GRANDE COPPER – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА СКАРНОВОМ ПРОЕКТЕ ADELITA В БОГАТОМ МЕДНЫМИ РУДАМИ ПОЯСЕ АРИЗОНА-СОНОРА, МЕКСИКА……..	10
Cu Mo	8. COPPER GIANT RESOURCES – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ МОСОА В ПУТУМАЙО, КОЛУМБИЯ……..	11
Cu	9. C3 METALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ КХАЛИСИ, ПЕРУ…	12
VMS	10. ALEX METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА VMS KSO НА ЮГО-ВОСТОКЕ АЛЯСКИ……..	14
Cu Mo	11. GSP RESOURCE CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ АЛВИН В РАЙОНЕ ХАЙЛЕНД-ВЭЛЛИ В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……	15
Fe	12. HIGH TIDE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА LABRADOR WEST IRON PROJECT……	16
Cu Au	13. P2 GOLD INC. - РАСШИРЯЕТ ЗОЛОТО-МЕДНУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗОНЫ LUCKY STRIKE НА ЗОЛОТО-МЕДНОМ ПРОЕКТЕ GABBS В НЕВАДЕ……..	17
Cu Au	14. FIREFLY METALS - ОБНАРУЖЕНА МЕДНО-ЗОЛОТАЯ СИСТЕМА В НЬЮФАУНДЛЕНДЕ……	18
Cu Au	15. NORTHWEST COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ КВАНИКА В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……..	18
VMS	*16.* CANSTAR RESOURCES INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ПРОЕКТЕ VMS МЭРИ МАРЧ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЬЮФАУНДЛЕНДА……..	19
Fe Ti	17. EUREKA METALS CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ХУК В РАМКАХ ПРОЕКТА KM98, КВЕБЕК……..	21
VMS	18. CORE SILVER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА VMS ПРОЕКТЕ ТУЛИРИ, ЮКОН КАНАДА.	21
VMS	19. GOLDHAVEN RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS MAGNO НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……..	24
Cu Mo	20. COPPER ONE RESOURCES CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ MAJUBA HILL, НЕВАДА……	25
Sb	21. NORTH ATLANTIC CRITICAL METALS CORP. - ПРОГРЕСС В РАМКАХ СУРЬМЯНОГО ПРОЕКТА POKIOK В НЬЮ-БРАНСУИКЕ……..	25
VMS	22. LYNX RESOURCES CORP. - ГРР ОБЪЕКТОВ VMS НА ПРОЕКТЕ ТЕРНЕРС-РИДЖ, НЬЮФАУНДЛЕНД……..	26
Cu	*23.* GLADIATOR METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ WHITEHORSE COPPER PROJECT, ЮКОН..……..	27
Cu	24. C3 METALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-СКАРНОВОМ ПРОЕКТЕ KHALEESI, ПЕРУ……	28
Cu Au	*25.* COPPERCORP RESOURCES INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНОГ-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ JUKES, НА ЗАПАДЕ ТАСМАНИИ, АВСТРАЛИЯ……..	29
VMS	26. CHESAPEAKE GOLD CORP. - ПРОГРАММА ГЕОХИМИЧЕЧСКИХ ПОИСКОВ НА ПРОЕКТЕ VMS LUCY, МЕКСИКА……	30
Cu Au	27. ARYA RESOURCES LTD**.** – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО - ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ WEDGE LAKE, САСКАЧЕВАН……..	31
	НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
H	28. MAX POWER MINING CORP. - РАСШИРЯЕТ ПРИРОДНУЮ ВОДОРОДНУЮ СИСТЕМУ САСКАЧЕВАНА……..	32
	РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
RZM	29. SPARK ENERGY MINERALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР TREO В РАМКАХ ПРОЕКТА АРАПАЙМА В ШТАТЕ МИНАС-ЖЕРАЙС, БРАЗИЛИЯ……..	33
U	30. DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ НА УРАНОВОМ NIANFORS PROPERTY В ШВЕЦИИ……	34
U	31. DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ СОГТЪЯРН В ШВЕЦИИ……..	35
U	32. FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ ХЭТЧЕТ-ЛЕЙК В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРОВИНЦИИ САСКАЧЕВАН……..	36

U	33. PURECORE METALS INC. - ОТЧЕТ О РЫНКЕ УРАНА, ЯДЕРНЫЙ СПРОС, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ……	37
U	34. UR-ENERGY INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРОЕКТЕ LOST CREEK SOUTH В ВАЙОМИНГЕ, США……	38
RZM	35. SAGA METALS CORP. - СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТОВ HEAVY REE WOLVERINE, СТРЭНДЖ-ЛЕЙК, ЛАБЛАДОР И ТАНБРИЗ НА ЮГЕ ГРЕНЛАНДИИ……..	39
U V	36. DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ВИКЕН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШВЕЦИИ……	41
U	37. AMERICAN LITHIUM CORP. - УВЕЛИЧИВАЕТ ИЗМЕРЕННЫЕ И УКАЗАННЫЕ РЕСУРСЫ УРАНОВОГО ПРОЕКТА МАКУСАНИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ПЕРУ……	42
U	38. FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ TURKEY LAKE, БАССЕЙН АТАБАСКА……..	42
RZM	39. CANAMERA ENERGY METALS CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА SCHRYBURT LAKE RARE EARTH-NIOBIUM PROJECT, ОНТАРИО……..	44
RZM	40. RARE EARTHS AMERICAS, INC. - ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ НА ПРОЕКТЕ ALPHA, БРАЗИЛИЯ……	45
RZM	41. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. - РАСШИРЯЕТ REE ПРОЕКТ GEM HILLS С ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ИОНОВ, ШТАТ НЕВАДА……	45
U	42. URANIUM ONE MINING CORP. - ПРОГРАММА ГРР НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ YUTY PROMOTEO, ПАРАГВАЙ……...	47
	ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ.	
VMS	43. FIREWEED METALS CORP. – ТЕХНОЛОГИЯ МЮОННОЙ ТОМОГРАФИИ НА ПРОЕКТЕ VMS MACPASS, ЮКОН, КАНАДА……...	49

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

COPPER ONE RESOURCES CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-СЕРЕБРЯНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ МАДЖУБА ХИЛЛ, НЕВАДА.

23 октября 2026 года

Программа направлена на ускорение систематического тестирования приоритетных участков на холме Маджуба и поддержку цели компании по продвижению проекта к получению первой оценки минеральных ресурсов, подготовленной в соответствии с Национальным стандартом «NI 43-101». На сегодняшний день на холме Маджуба пробурено 27,4 тыс м в 100 скважинах.

В ходе ГРР была выявлена крупная гидротермальная минерализованная система, содержащая медь, серебро и золото, которая может быть расширена (рис. 1).




Рис. 1 Целевые зоны бурения на холме Маджуба, пробуренные и планируемые скважины.

В настоящее время исследования направлены на совершенствование геологической модели компании посредством систематического бурения, геологического картирования, геохимического отбора проб и структурной интерпретации для оценки масштабов, непрерывности и значимости минерализации. Для дальнейшего определения масштабов и экономического потенциала минерализованной системы потребуются дополнительные буровые работы и технические исследования.

Copper One Resources Corp. *- флагманский актив компании — медно-серебряно-золотой проект Маджуба-Хилл, штат Невада.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

SLAM EXPLORATION LTD. - ГРР НА ЗОЛОТО-СУРЬМЯНО-СЕРЕБРЯНОМ ПРОЕКТЕ МУС-ЛЕЙК, НЬЮ-БРАНСУИК.

23 октября 2026 г.

Проект «Мус-Лейк», расположен в рудном районе Батерст, охватывает три эпитермальных пр-ния золота и сурьмы: «Скал», «Мус-Лейк» и «Стюарт», которые пространственно связаны с региональной зоной разлома Мус-Лейк, простирающейся в северо-западном направлении, и простираются на 4,7 км. Разлом служит каналом для эпитермальных флюидов, содержащих зоны сильно окремненных брекчий, пронизанные кварцевыми жилами с видимыми антимонитом и арсенопиритом. Зоны брекчии обычно встречаются на контактах между осадочными и гранитными породами.

В Мус-Лейк минерализация приурочена к кремнистой брекчии, состоящей из кремовых, бледно-зеленых и стально-серых кремнистых фрагментов в мелкозернистой кремнистой матрице

от серого до темно-серого цвета, местами пронизанной кварцевыми жилами. Стибнит встречается в виде вкраплений, пузырьков, прожилок и игл вместе с арсенопиритом, а также с небольшим количеством пирита и халькопирита. Минерализованная брекчия сопровождается глинистыми и железо-карбонатными изменениями, которые при выветривании образуют характерные желтые, оранжевые и коричневые поверхности и местами контактируют с брекчией разлома.

Проект охватывает территорию площадью 3,9 тыс га и он расположен в непосредственной близости от медно-никелево-кобальтового проекта Goodwin компании SLAM. Места залегания полезных ископаемых и границы участков проекта Slacks Lake-Moose Lake и медно-никелево-кобальтового проекта Goodwin показаны на рисунке 1. Места залегания полезных ископаемых обозначены желтыми звездочками. Зона разлома Мус-Лейк также пересекает южную часть группы участков Гудвин.




Рис. 1 Объекты ГРР на золото и сурьму в Слэкс-Лейк и Мус-Лейк.

На проекте минерализация сосредоточена в дымчато-сером кварце и кварцевой брекчии в силицифицированных осадочных породах и, возможно, в кислой туфовой брекчии с железо-карбонатными изменениями на выветренных поверхностях. Ширина минерализованных горизонтов, измеренных в траншеях, составляет от 20 до 30 см, простирание — от 100° до 108°, а угол падения — около 80°, субпараллельно простиранию зоны разлома Мус-Лейк.

Тенденции, которые будут определять ГРР в рамках проекта:

- *непрерывность на глубине*: первые пробуренные скважины показали, что брекчирование, изменение состава и видимый стибнит, наблюдаемые в траншеях Мус-Лейк, продолжаются и под поверхностью. Скважина, пробуренная под углом -70°, прошла через измененную брекчию с прожилками на глубину 135 м ниже «воротника»;

- *изменения как вектор:* сильная силикатизация, брекчирование, карбонатно-железистые, глинистые и серицитовые изменения сопровождают минерализацию на обоих пр-ниях и в кернах и служат ориентирами для определения минерализованной структуры;

- *расширение на юго-восток:* примыкающая к Мус-Лейк группа участков Слэкс-Лейк охватывает ряд сурьмяных аномалий, обнаруженных в ходе региональных исследований моренных отложений и связанных с зоной разлома Мус-Лейк, что указывает на возможность продолжения минерализованного тренда за пределы известных месторождений.

Результаты анализа, проведенного в рамках программы бурения траншей в 2026 году, не только позволили выявить аномальные участки для бурения, но и показали возможность зонального распределения металлов:

Зональное распределение металлов: в районе Скалл образцы с высоким содержанием сурьмы (от 1,14% до 3,73% Sb) отделены расстоянием от 150 до 230 м от образцов с высоким содержанием золота и серебра (до 1,965 г/т Au и 73,5 г/т Ag), но с низким содержанием сурьмы. В районе Мус-Лейк преобладает минерализация сурьмой при более низком содержании золота и серебра. Такое разделение материала, богатого сурьмой, и материала, богатого золотом и серебром, указывает на зонирование по металлам, которое компания намерена проверить с помощью систематического отбора проб и бурения.

SLAM Exploration Ltd. *— в основе портфеля компании лежит проект по добыче медно-никелево-кобальтовой руды в Батерст-Майнинг-Кэмпе (VMS) в Нью-Брансуике.*


https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

GOLDERA EXPLORATION LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ЗОЛОТО, ВОЛЬФРАМ И СУРЬМУ НА ПРОЕКТЕ РАЙЛИ БРУК В СЕВЕРНОМ НЬЮ-БРАНСУИКЕ.

26 октября 2026

Проект Райли-Брук расположен в непосредственной близости от Центрального плутонического пояса Нью-Брансуика, перспективного региона для поиска интрузивных систем, содержащих медь, молибден и золото. В этом регионе наблюдается заметный рост интереса к ГРР, особенно в отношении интрузивных систем, содержащих металлы.

В рамках программы была выявлена крупная золотоносно-вольфрамово-сурьмяная (мышьяковая) почвенная аномалия размером 4 х 2 км, а также вторая, меньшая по размеру многоэлементная аномалия размером 300 х 300 м на севере. Обе аномалии не изучены, а отбор проб почвы охватил лишь 30% территории площадью 334,5 км^2 (рис. 1).



а б

Рис. 1 Геохимические аномалии почвы, на вертикальной производной магнитного поля (1VD) на проекте Райли Брук (а) и исследования почвы в 2026 г. (б).

Полученные результаты считаются важными, поскольку они совпадают с электромагнитными и радиометрическими аномалиями, выявленными в ходе предыдущего аэрогеофизического исследования HeliTem, проведенного компанией Goldera, и указывают на наличие проводящих элементов в кислых породах, а также имеют металлический сигнатурный отпечаток, характерный для минеральных систем, связанных с кислыми интрузиями.

Основные моменты:

1. Компания Goldera обнаружила две крупные многоэлементные почвенные аномалии в районе Райли-Брук. Металлический состав характерен для потенциальной интрузивной системы, содержащей драгоценные металлы, и подтверждается наличием в этих районах интрузивных пород кислого состава, а также совпадающими электромагнитными проводниками и магнитными зонами, выявленными в ходе аэрофотосъемки Goldera.

2. Значительная неисследованная территория: обе почвенные аномалии находятся на территории, охваченной исследованием, и пробы почвы были взяты примерно на 30% территории Райли-Брук, так что значительная часть участка еще не изучена.

3. Уточнение целей на следующем этапе: Полученные результаты позволяют определить приоритетные области для дополнительных геологических исследований и последующего изучения поверхности.

Территория Райли-Брук покрыта обширным, но в целом тонким слоем перекрывающих пород, что ограничивает геологические обнажения. В ходе почвенного исследования было отобрано 1273 образца. По результатам исследований в южной части проекта была выявлена значительная аномалия содержания золота, вольфрама и сурьмы (+ мышьяка) (4 х 2 км, с выходом на границы участка). Аномалия совпадает с проводниками электромагнитных волн, которые потенциально могут представлять собой сульфидосодержащие зоны в коренных породах, а также

с радиометрической аномалией, которая, вероятно, представляет собой область кислых пород. Форма аномалии, а также ее металлические и геофизические характеристики указывают на возможность наличия в южной части участка системы кислых интрузий, связанных с золотом и важнейшими минералами, которая также встречается в других частях региона.

Еще аномалия 300 х 300 м золота и сурьмы (а также мышьяка, висмута и теллура) находятся в районе горы Хэйстэк, на севере. Как и южная аномалия, она открыта для изучения. В ходе ГРР в этом районе были обнаружены гематит, пирит и измененные глиной интрузивные породы.

Отбор проб почвы был проведен только на 30% территории проекта Райли-Брук, где ранее не велись поиски эпитермальных м-ний драгоценных металлов или интрузивных м-ний, связанных с ними, что оставляет значительный потенциал для новых открытий в масштабах района.


Goldera Exploration Ltd. *(TSX-V:GERA) —продолжает ГРР на своем флагманском проекте Egan Gold в зеленокаменном поясе Абитиби в Онтарио и на совместном предприятии Acadian Gold Corp. в развивающемся золото-медном районе Нью-Брансуика.*

https://www.mining.com/sponsored-content/goldera-identifies-large-gold-tungsten-antimony

STAR COPPER CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ «СТАР» В ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

27 октября 2026 года

Это крупнейшая кампания, когда-либо проводившаяся в рамках проекта, которая существенно расширила систему медно-золотых порфиров Стар-Мейн во всех направлениях (рис. 1).



а б

Рис. 1 Схема Star Project и районы бурения (а) и СВ расширение Стар-Мейн (б).

В рамках флагманского медно-золотого порфирового проекта было пробурено 9,4 тыс м в 24 скважинах, что успешно расширило участки Copper Creek, Star North и Star East (рис. 2).




Рис. 2 Разрез А-А′ (вид на запад)

Северо-восточная экспансия подтверждена геологическими исследованиями - семь скважин (2489 м) расширили охват за пределы исторического района бурения, выявив широкое распространение халькопирита, калиевых изменений и кварцево-сульфидных жил. Коридор включает 269 м с содержанием меди 0,42% и золота с содержанием 0,198 г/т, а также 183 м с содержанием меди 0,28% CuEq, в том числе 45 м с содержанием меди 0,47% CuEq.

На западе бурение достигло целевого горизонта (525 м по вертикали) и выявило мощные залежи сульфида меди на протяжении 60 м. Скважина S-079 была пробурена до глубины 750 метров и вскрыла мощные видимые залежи сульфида меди на сопоставимом горизонте. Интерпретированный коридор остается открытым на северо-западе и на глубине.

Проведено 37 линейных км 3D-геофизических исследований методом индукции магнитного поля и магнитотеллурического зондирования, получены результаты 2D- и 3D-инверсии, которые сейчас интегрируются с данными бурения.

В ходе ГРР была также выявлена приповерхностная зона с повышенным содержанием меди, которая, по оценкам, простирается на 300 м в длину и 250 м в ширину и залегает на глубине до 100 метров. Под ней находится более обширная гипогенная медно-золотая система, которая простирается на 300 м в длину и 500 м в ширину и залегает на глубине 400 м. Она открыта в нескольких направлениях.

В ходе бурения были выявлены широко распространенные калиевые изменения, кварцево-сульфидные жилы и халькопиритсодержащая минерализация в нескольких скважинах. Была обнаружена медная минерализация, начинающаяся у поверхности. Самая глубокая скважина в северо-восточной части проекта, глубиной 482 м, была пробурена в измененных и минерализованных интрузивных и вулканических породах мощностью более 300 м.

В совокупности данные по северо-восточным скважинам подтверждают предположение компании о том, что гипогенная система Стар-Мейн простирается за пределы ранее разведанной территории, где никогда ранее не проводилось бурение.

Интерпретированный коридор остается открытым на северо-западе и на глубине и является приоритетным для дальнейшего изучения.

Одновременно с бурением было проведено около 37 погонных км усовершенствованных 3D-исследований методом индуцированной поляризации (3D IP) и магнитотеллурического зондирования (MT). На данный момент получены результаты как 2D-инверсии, так и 3D-инверсии. Ожидается, что объединение этих наборов данных с результатами бурения, геологического картирования, геохимии и исторической базой данных позволит получить гораздо более полную трехмерную картину системы, что точнее ответит на вопрос о непрерывности пластов в пределах известных границ, а также определит цели для расширения на глубине.

Следующие шаги:

- объединение базы данных бурения с 3D-инверсией IP и MT для обновления трехмерной геологической модели;
- оценка непрерывности северо-восточного гипогенного коридора и более глубоких западных и северо-западных горизонтов;
- продолжение ГРР для оценки первичных минеральных ресурсов.

Star Copper Corp. *— флагманский проект занимает площадь 6,8 тыс га в «Золотом треугольнике» Британской Колумбии. В рамках проекта разрабатываются несколько пр-ний медно-золотых порфировых руд, в том числе Стар-Мейн, Стар-Норт, Ист и Уэст, Коппер-Крик и Копперлайн.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

COAST COPPER – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ COPPER KETTLE НА ОСТРОВЕ ВАНКУВЕР, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.

26 октября 2026 г.,


Проект включает 270 милн т при 0,37% медного эквивалента ("CuEq" 0,22% Cu) и 315 ppm Mo (до 540 Мт при 0,32% CuEq [0,20% Cu и 245 ppm Mo). Это конечные точки одного концептуального диапазона, а не отдельные или дополнительные цели (табл. 1).

Таблица 1

Целевой диапазон геологоразведочных работ в НТЗ (Медный котел).

	Тоннаж (млн т)	Предельный сорт (CuEq %)	CuEq (%)	Cu (%)	Mo (ppm)
Более высокий тоннаж	540	0.25	0.32	0.20	245
Более низкий тоннаж	270	0.30	0.37	0.22	315

Площадь минерализованного участка с медью составляет ~2500 х 800 м (рис. 1).



а б

Рис. 1 Расположение целевых участков проекта «Медный котел», «Островная медь 1» и «Северный остров 1» (а) и продольные разрезы (б).

Геологическая модель отражает стратиграфию формации Ванкувер с пологим юго-западным падением и включает в себя геологические и структурные границы на севере, востоке и юге. Представлены прерывистые многофазные интрузии и изменения в процессе метаморфизма. Медно-молибденовая минерализация встречается в широких рассеянных и жильных зонах, а также в виде скарновой минерализации с более высоким содержанием.

Целевой диапазон ГРР включает блоки с содержанием выше указанных пороговых значений и в пределах смоделированной области.

Компания Coast Copper изучает окружающую минерализацию меди и молибдена с более низким содержанием полезных ископаемых на предмет возможного расширения целевого диапазона для ГРР. Предполагается, что минерализация простирается в западном и северо-западном направлениях и на глубину. Компания считает, что рассеянная и жильная минерализация, многофазные интрузии и изменения соответствуют системе порфирового типа с локально более богатой скарновой минерализацией. Планируемое геофизическое исследование направлено на выявление геофизических откликов, которые могут помочь в определении целей для бурения на глубине и вдоль простирания. Любое последующее бурение позволит оценить масштабы, непрерывность и степень минерализации, в том числе за пределами текущей модели.

Coast Copper Corp. *— флагманские активы компании включают проект Copper Kettle по добыче меди и молибдена на севере острова Ванкувер, проект Empire Mine по добыче меди и золота*

https://www.newswire.ca/ large-critical-mineral-copper-molybdenum-exploration

MIDNIGHT SUN MINING CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ПРОЕКТЕ МЕДИ ДУМБВА В ЗАМБИИ.

27 октября 2026 г.

Выявлено значительное расширение минерализованной системы в Северном блоке. В ходе бурения была обнаружена приповерхностная медная минерализация, простирающаяся с востока на запад более чем на 2,4 км, что более чем в два раза превышает среднюю ширину ранее разведанного минерализованного коридора Думбва. Это расширение площади охвата представляет собой важное событие в рамках второй фазы ГРР, в ходе которой продолжается бурение для изучения северной части проекта и дальнейшего определения распределения медной минерализации в более широкой системе.

Медная минерализация залегает горизонтально или с небольшим падением пластов и находится на поверхности или очень близко к ней, что является еще одним многообещающим фактором на Думбве (рис. 1).




Рис. 1 Результаты бурения минерализованного коридора Думбва.

Было выполнено бурение 76 скважин общей протяженностью 17,4 тыс м. Результаты включают анализы в рамках программ расширения и оконтуривания, которые продолжаются в Думбве.

Согласно последним результатам, в более широких зонах сульфидной медной минерализации по-прежнему обнаруживаются многочисленные неглубокие залежи с более высоким содержанием меди. Представленные результаты получены по скважинам, пробуренным на различных участках проекта. Основные моменты: 0,47% меди на 31,1 млн, включая – 0,81% меди на 16,0 млн.

Программа, в рамках которой было пробурено 372 скважины общей протяженностью 87 тыс м выявила сульфидно-медную минерализацию на участке протяженностью более 12 км в минерализованном коридоре Думбва, включающем южную часть более крупного коридора протяженностью 20 км, выявленного с помощью геофизических методов и отбора проб грунта.

Программа бурения преследовала две основные цели. Первой целью было найти источник обширной, открытой с боков медной аномалии; вторая цель заключалась в том, чтобы быстро и эффективно определить полную площадь Дамбва. В этом отношении программа также оказалась весьма успешной, о чем свидетельствует обнаружение медной системы протяженностью более 12 км по простиранию, а также недавнее открытие участка, ширина которого в два раза превышает ширину основного участка, по мере того как ГРР продвигаются на север.

Midnight Sun *- развивает проект по добыче меди в Солвези, уделяя особое внимание флагманскому проекту Думбва. Проект расположен в самом сердце меднорудного пояса Замбии и Конго, второго по величине региона по добыче меди в мире*


https://www.mining.com/sponsored-content/midnight-suns-dumbwa-copper-deposit

ALGO GRANDE COPPER – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА СКАРНОВОМ ПРОЕКТЕ ADELITA В БОГАТОМ МЕДНЫМИ РУДАМИ ПОЯСЕ АРИЗОНА-СОНОРА, МЕКСИКА.

28 октября 2026 г.

Компания Algo Grande обнаружила три новых минерализованных скарновых горизонта в недавно обнаруженной зоне протяженностью 110 м, включая 4,15 м с содержанием меди 1,6% на глубине 473,09 м. В более глубоких слоях был обнаружен скарн Маргариты (14,37 м, содержание меди 1,1%), новый золотоносный скарн другого типа, который, по мнению исследователей, залегает вдоль разлома, ранее не считавшегося фактором, влияющим на минерализацию в Аделите. Это первая скважина, подтверждающая модель компании, согласно которой разломы,

пересекающие известняковый коридор, влияют на формирование скарнов, и указывающая на то, что в Аделите может быть несколько скарновых тел за пределами Серро-Гранде (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и разрез (б) скарна Маргарита, вид на северо-северо-запад).

Скарн «Маргарита» залегает на глубине 530 м по вертикали, на расстоянии 250 м. Он проходит по разлому F3NW, одному из четырех разломов северо-западного простирания, которые были нанесены на карту как потенциальные водоносные горизонты, что подтверждает тезис о структурно контролируемой системе в Аделите и указывает на то, что участок открыт для дальнейших исследований за пределами Серро-Гранде. Структуру Маргариты еще предстоит изучить с помощью дальнейшего бурения. Повторная обработка геофизических данных и полевое картирование указывают на то, что на глубине может находиться потенциальная порфировая система, что предполагает классическую модель скарн-порфировой минерализации, аналогичную крупным м-ниям на северо-западе Мексики.


Algo Grande Copper Corp. *—продвигает проект Adelita — мультисистемное пр-ние меди, серебра и золота районного масштаба, расположенное в богатом медными рудами поясе Аризона-Сонора. Проект Adelita площадью 5 тыс га основан на богатом м-нии скарнов Cerro Grande Cu-Au-Ag, которое демонстрирует сильную геофизическую преемственность вдоль коридора протяженностью более 7 км.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

COPPER GIANT RESOURCES – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ МОСОА В ПУТУМАЙО, КОЛУМБИЯ.

27 октября 2026 г.

В скважине на глубине 474 ма было обнаружено 135 м с содержанием 1,60% CuEq* (1,02% Cu и 0,107% Mo) — это самый богатый интервал из более чем 100 м, пробуренных на проекте Мокоа, и он почти в три раза превышает среднее содержание в выявленных минеральных ресурсах (0,54% CuEq*) (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и разрезы (б) результатов бурения модели проекта Мокоа.

Скважина закончилась на глубине 903 м, где также была обнаружена минерализация. Интервал находится в пределах концептуальной «скорлупы» и содержит более высокие показатели, чем те, что были смоделированы в блочной модели.

Интервал с самым высоким содержанием составил более 100 м: 135 м с содержанием 1,60% CuEq* (1,02% Cu и 0,107% Mo) из 474 м, в том числе 52 м с содержанием 2,24% CuEq* (1,36% Cu и 0,164% Mo).

Система брекчий простирается на 184 м к западу от места бурения: 67 м породы с содержанием 0,66% CuEq* (0,51% Cu и 0,028% Mo) на глубине 636 м в третьем коридоре брекчий, к западу на глубине 637 метров от 0,37% CuEq* (0,28% Cu и 0,016% Mo) на глубине 145 м.

Глубже, на северной стороне, в более «горячей» центральной части системы обнаружено 108 м породы с содержанием 0,69% CuEq* (0,50% Cu и 0,035% Mo) на глубине 533 м, а также 699 м породы с содержанием 0,38% CuEq* (0,25% Cu и 0,024% Mo) на глубине 356 м. На глубине 826 м обнаружены калийные отложения, а на глубине 900 м — 123 м с содержанием 0,33% CuEq* (0,17% Cu и 0,031% Mo).

Проект расположен в среднеюрских дацитовых и кварц-диоритовых порфирах, внедрившихся в андезитовые и дацитовые вулканические породы Центральной Кордильеры в Колумбии — тектонического пояса шириной 30 км, который простирается до Эквадора и включает в себя крупные порфировые системы, такие как Мирадор, Варинца, Сан-Карлос и Пананца. В Мокоа наблюдается классическая порфировая зональность: калиевое ядро окружено серицитовыми и пропилит-серицитовыми отложениями. Минерализация представлена в основном вкрапленными халькопиритом и молибденитом, местами с борнитом и халькозином, и связана со штокверковыми жилами и гидротермальными брекчиями.

Минерализация демонстрирует вертикальную непрерывность протяженностью более 1100 м с многочисленными интрузивными фазами, эпизодами брекчирования и генерациями жил, что свидетельствует о динамичной и продолжительной магматическо-гидротермальной эволюции, на которую, вероятно, влиял не один порфировый центр. Мокоа открыто в нескольких направлениях, а несколько сопутствующих объектов на более обширной территории подтверждают, что это минерализованная система районного масштаба.

Оценка минеральных ресурсов1 Мосоа включает указанные ресурсы в размере 0,29 млрд т при среднем содержании 0,54% в медном эквиваленте (CuEq) (0,33% Cu и 0,038% Mo), содержащие 2,13% меди и 0,24% молибдена; и предполагаемые ресурсы в размере 1,60 млрд т при среднем содержании 0,40% CuEq (0,27% Cu и 0,025% Mo), содержащие 9,36% меди и 0,89% молибдена.

Copper Giant Resources Corp. *- сосредоточена на разработке медно-молибденового проекта Мокоа на юге Колумбии, одного из крупнейших неразработанных объектов такого типа в Северной и Южной Америке.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CЗ METALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ КХАЛИСИ, ПЕРУ.

27 октября 2026 г.

Проект Khaleesi расположен в поясе Андауайлас-Яури на юго-востоке Перу, где находятся крупные м-ния медных скарнов и порфиров, а также действующие рудники, такие как Лас-Бамбас (MMG), Констансия (Hudbay Minerals), Антапаккай (Glencore) и другие.

Халиси находится в 8 км к западу от проекта компании «Джаспероид», где компания подтвердила наличие 13 перспективных месторождений скарнов вдоль 28-км пояса скарнов. Монтана-де-Кобре (MCZ) — единственный скарн в 28-км железо-скарновом поясе, который компания на сегодняшний день систематически исследовала с помощью бурения, в результате чего были получены измеренные и предполагаемые минеральные ресурсы на уровне 51,9 млн т с содержанием меди 0,50% и золота 0,20 г/т, что составляет 569,1 млн фунтов меди и 326 800 унций золота.

Проект Khaleesi расположен вдоль благоприятной зоны контакта известняковых и интрузивных пород, которая делит территорию на две части и простирается в северо-северо-

восточном направлении. Известняковые породы являются частью высокопроницаемой формации Ферробамба, а интрузивные породы — частью известного батолита Андауайлас-Яури. В этой зоне контакта находится многофазный интрузивный комплекс, который также простирается с северо-востока на юго-запад, следуя за зоной контакта, которая в основном покрыта тонким слоем ледниковых отложений (рис. 1).




Рис. 1 Региональная карта проектов ГРР C3 Metals и других компаний.

Бурение позволило расширить зону минерализации на 200 м к востоку. Скважины пересекли обширные участки приповерхностной медной минерализации. Пересечены обширные порфировые и скарновые зоны с первичной и вторичной медной минерализацией. В приповерхностной 101,9 м зоне минерализованного габбро-диорита обнаружены 0,31% меди, 0,025 г/т золота, 1,06 г/т серебра, 64 ppm молибдена (0,38% CuEq) на глубине 28,4 м. За этим последовал 70,9 м перехват магнетита и пироксен + гранатового скарна, который показал 0,53% меди, 0,036 г/т золота, 0,88 г/т серебра, 112 ppm молибдена (0,62% CuEq) с глубины 376,6м.

Аналогичным образом пересечена приповерхностная первичная и вторичная медная минерализация. В приповерхностной 81,3 м зоне минерализованного диорита обнаружены 0,27% меди, 0,021 г/т золота, 0,84 г/т серебра, 54 ppm молибдена (0,33 % эквивалента меди) на глубине 36,7 м. Минерализация сохраняется в нескольких направлениях (рис. 2).




Рис. 2 План (а) и разрез (б) результатов бурения на геологической карте (Cu — оранжевым цветом, Mo — синим).

Пробурено 16 830 м в 38 скважинах в зоне контакта между многофазным интрузивным комплексом и карбонатными породами формации Ферробамба, простирающейся в северо-восточном направлении вдоль известного медного пояса Андауайлас-Яури.

Минерализация была пробурена под ледниковыми отложениями и пересекли 109,0 м приповерхностной зоны габбро-диорита с медно-золото-серебряно-молибденовой жильной минерализацией с содержанием 0,29% меди, 0,028 г/т золота, 0,99 г/т серебра, 115 ppm молибдена (0,39% CuEq) на глубине 45,0 м. За этим перехватом в скважине последовала 118,0 м зона магнетитовых скарнов с медно-золото-серебряно-молибденовой минерализацией с 0,30% меди, 0,024 г/т золота, 0,85 г/т серебра, 75 ppm молибдена (0,37 % CuEq) на глубине 354,9 м.

Магнитные и гравитационные геофизические исследования с помощью дронов были расширены на 65 % — с 900 до 1500 га — благодаря тому, что в ходе этих исследований были выявлены многочисленные совпадающие магнитные и гравитационные аномалии. Расширенные геофизические исследования завершены, и проводится обработка данных. Сочетание магнитометрии и гравиметрии доказало свою эффективность при поиске медной минерализации в магнетитовых скарнах, залегающих под тонким слоем ледниковых отложений. Существующие измерения магнитной восприимчивости и удельного веса керна подтверждают модель, повышая достоверность данных магнитометрии и гравиметрии.

Компания также приступила к 3D-сейсморазведке. На данный момент сейсморазведка завершена на 65%. Данные 3D-сейсморазведки имеют решающее значение для бурения в поисках потенциальных источников порфировых руд или интрузивных пород по двум причинам:

1. Определяют участки с высокой заряжаемостью на глубине до 1 км, что указывает на наличие и концентрацию сульфидных минералов;
2. Предоставляют данные о проводимости и удельном электрическом сопротивлении на глубине до 1 км, что позволяет выявить горные породы, которые лучше проводят ток или препятствуют движению минерализующих флюидов.

Данные магнитометрии, гравиметрии и 3D-интерпретации будут инвертированы и использованы в сочетании с наземными и существующими данными бурения и моделями для поиска дополнительных скарновых тел и потенциального источника порфировых руд или интрузивного тела, вызвавшего их образование.


C3 Metals Inc. *—владеет 31 тыс га в порфиро-скарновом поясе Андауайлас-Яури на юге Перу, где находятся проекты компании Jasperoide и Khaleesi.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ALEX METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА VMS KSO НА ЮГО-ВОСТОКЕ АЛЯСКИ.

27 октября 2026 г.

В шести из восьми скважин на участке Хайям была обнаружена богатая медью и золотом вулканогенная массивная сульфидная (VMS) минерализация. Программа бурения на уч-ке Хайям была разработана для изучения массивных сульфидов, залегающих ниже поверхности, с целью определения масштабов, ориентации и характера минерализации. Массивные сульфидные выходы представлены 8 линзами массивного пирита, халькопирита, магнетита, пирротина и сфалерита в стратиграфическом интервале 70 м и протяженностью 300 м (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и разрез (б) результатов бурения на участке Хайям.

Материнские породы представляют собой сильно рассланцованные амфиболиты. Стратиграфия и структурная слоистость преимущественно ориентированы с востока на запад (~280-290°) и круто наклонены на север или юг. Минерализованные участки, пересекаемые бурением, коррелируют между скважинами вдоль плоскости с пологим падением на север, в отличие от преобладающей стратиграфии и структурной слоистости с крутым падением на север. Минерализация, обнаруженная в керне, в настоящее время интерпретируется как преимущественно сульфидная брекчия и несогласное с ней образование. Минерализация, возможно, смещена и изоклинально смята в складки.

Электромагнитное исследование, проведенное спутником SkyTEM, выявило проводящие аномалии в районах Хайям и Стамбл-Он, а также новую крупную аномалию в двух км к западу, получившую название «Три Джи».

Компания Alex Metals обнаружила несколько крупных выходов сульфидов и сульфидных жил, несколько кремнистых горизонтов, которые интерпретируются как эксхалиты, а также самый крупный участок актинолит-гранатовых изменений, связанных с залежами ванадиевой руды. Компания Alex Metals пробурила четыре скважины на двух участках, чтобы исследовать массивную сульфидную минерализацию и сульфидные жилы на поверхности и в пластах, смоделированных на основе данных SkyTEM. В ходе наземных работ была обнаружена обширная зона изменения VMS амфиболитовой фации на поверхности. Последующее картографирование и разведка привели к обнаружению нескольких массивных сульфидных линз и прожилковых зон.

Помимо бурения в рамках двухмесячной программы, компания Alex Metals также провела ГРР, картографирование, магнитную и фотограмметрическую съемку с помощью БПЛА, электромагнитную съемку на поверхности и в скважинах, а также отбор проб почвы и русел рек на проекте KSO. Компания стремится получить и интегрировать эти данные для проведения дальнейших ГРР.

Alex Metals *— основными проектами являются проект KSO площадью 1,4 тыс га и проект Wodski площадью 1,3 тыс га (3346 акров). Оба проекта расположены на юго-востоке Аляски.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

GSP RESOURCE CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ АЛВИН В РАЙОНЕ ХАЙЛЕНД-ВЭЛЛИ В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

27 октября 2026 года

В рамках проекта Алвин оцениваются текущие предполагаемые запасы, составляющие 1,46 млн т со средним содержанием меди 1,08%, что дает 34,6 млн фунтов Cu. Результаты бурения включают открытие новой золоторудной зоны, пересекающейся в пределах двух скважин - 0,8% меди, 0,67 г/т золота и 6 г/т серебра на протяжении 6,54 м; в том числе 5,2 г/т Au на протяжении 0,67м в дополнение к 3% Cu, 1,11 г/т Au и 61 г/т Ag на глубине 3,02 м (рис. 1).




Рис. 1: Поперечное сечение буровых скважин проекта Alwin Mine.

Результаты анализа свидетельствуют о наличии минерализации с высоким содержанием золота в нескольких горизонтах проекта Алвин. Выявлены два золотоносных горизонта, в которых по меньшей мере в пяти отдельных скважинах были обнаружены значительные запасы золота. Эти золотоносные зоны коррелируют с установленными медными залежами, которые были смоделированы в рамках текущего определения минеральных ресурсов проекта Алвин, и, учитывая, что непрерывность залегания меди уже подтверждена, представляют собой привлекательные цели с низким уровнем риска для дальнейшего бурения с целью определения границ золотоносной минерализации, которая пока находится на ранней стадии изучения.

Медно-серебряно-золотой проект Алвин занимает площадь 344 га и расположен на полузасушливом внутреннем плато в южно-центральной части Британской Колумбии. Предполагаемые минеральные ресурсы проекта Алвин составляют 1,46 млн т со средним содержанием меди 1,08%, что дает 34,6 млн фунтов меди.

Проект Алвин расположен рядом с западной границей рудника Хайленд-Вэлли компании Teck Resources, крупнейшего открытого медно-молибденового рудника в западной Канаде. Изменения и минерализация гидротермальной системы Хайленд-Вэлли распространяются на запад от рудника Хайленд-Вэлли до проекта Алвин.

GSP Resource Corp. *—владеет медно-золото-серебряным проектом Алвин в рудном районе Камлупс на юго-западе Британской Колумбии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

HIGH TIDE RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА LABRADOR WEST IRON PROJECT.

27 октября 2026 г.

Лабрадорский прогиб на западе Лабрадора и в прилегающем Квебеке является основным районом добычи железной руды в Канаде. Здесь расположены м-ния мирового класса, которые разрабатываются уже более полувека. На сегодняшний день здесь добыто более 2 млрд т железной руды, и считается, что потенциал роста добычи очень высок. Высокое качество м-ний в этом регионе позволяет получать широкий спектр продукции, в том числе высококачественный концентрат и окатыши как для доменной печи, так и для прямого восстановления железа.

Проект расположен в 20 км к северо-востоку от комплекса рудника Кэрол-Лейк компании Iron Ore Company of Canada в Лабрадор-Сити, Ньюфаундленд и Лабрадор (рис. 1).





Рис. 1 Схема расположения проекта по добыче железной руды в Лабрадор-Уэст

Компания пробурила 27 скважин общей протяженностью 6335 м (рис. 2).



а б

Рис. 2 Проект «Лабрадор Уэст» —план границ залежей, вертикальных разрезов и расположения буровых скважин (а) и длинные разрезы с результатами бурения (б) (*черный шрифт – исторические, красный – текущие*)

Был обнаружен мощный пласт железистых минералов с высоким содержанием железа, начинающийся почти у поверхности вдоль восточной границы проекта, были обнаружены пласты с высоким содержанием железа и большой мощностью, расположенные далеко за пределами нынешней северной границы. Особенно важно то, что эти скважины расположены на расстоянии более 1800 м друг от друга с севера на юг. Вместе они подчеркивают потенциальный масштаб минерализованной системы, которая простирается во всех направлениях.


Компания High Tide *- владеет проектом Labrador West Iron, на территории которого находятся предполагаемые минеральные ресурсы NI 43-101 в размере 655 млн т с содержанием железа 28,84%. Эти ресурсы находятся на поверхности и могут быть добыты открытым способом.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

P2 GOLD INC. - РАСШИРЯЕТ ЗОЛОТО-МЕДНУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗОНЫ LUCKY STRIKE НА ЗОЛОТО-МЕДНОМ ПРОЕКТЕ GABBS В НЕВАДЕ.

28 октября 2026 г.

Скважины были пробурены для изучения южного продолжения зоны Лаки Страйк и для изучения юго-западного продолжения зоны (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и разрез (б) бурения на проекте Lucky Strike.

Все скважины успешно расширили зону. Эти результаты подтверждают, что зона Лаки Страйк расширяется на юг и юго-запад и остается открытой для расширения во всех направлениях.

Золото-медная минерализация в Лаки Страйк локализована в пластовом кварцевом монцоните (основном минерализованном теле) и под ним, подстилаемом пироксенитом, при этом золото и медь более высокой пробы залегают в монцоните в коридоре, простирающемся с севера на юг. Бурение выявило гораздо более мощные пласты монцонита, что позволяет предположить, что эта толща увеличивается в юго-западном направлении, а коридор с более высокой концентрацией полезных ископаемых поворачивает в ту же сторону. В монцоните преобладает

золото, а в нижней части основного минерализованного тела — медно-золотая минерализация. В Лаки Страйк мощность монцонита превышает 150 м, а мощность более глубокого пироксенита в нижней части — от 20 до 60 м, что в сумме составляет более 200 м.

С момента запуска программы было пробурено в общей сложности 114 скважин разведочного бурения, из них 43 — в зоне Салливан и 71 — в зоне Лаки Страйк.

Обновленная оценка минеральных ресурсов ляжет в основу технико-экономического обоснования ввода Габбса в эксплуатацию.

P2 Gold Inc. *—специализируется на продвижении своего золото-медного проекта Габбс в Неваде.*

https://www.newswire.ca/news-releases

FIREFLY METALS - ОБНАРУЖЕНА МЕДНО-ЗОЛОТАЯ СИСТЕМА В НЬЮФАУНДЛЕНДЕ.

27 октября 2026 г.

Скважина на горе Джой вскрыла пласт мощностью 22,5 м с содержанием меди 1,87% и золота 0,64 гр\т на глубине 109 м. Это открытие - обнадеживающий первый признак регионального потенциала для ГРР в районе Грин-Бей, где еще предстоит протестировать несколько дополнительных участков.

Открытие дает компании FireFly еще одну цель для тестирования в дополнение к предполагаемому возобновлению и расширению добычи на м-нии Минг. Более крупная региональная ресурсная база могла бы обеспечить более высокую производительность в течение более длительного срока эксплуатации рудника, хотя масштабы и экономическая эффективность рудника Маунт-Джой еще не определены, и компании еще предстоит решить, как он впишется в ее планы развития.

На участке Маунт-Джой на глубине 112 м было обнаружено девять м породы с содержанием меди 2,95% и золота 0,95 гр\т. В первой скважине на глубине 15,55 ма было добыто 6,45 м породы с содержанием меди 0,81% и 1,19 гр\т золота. Исследование первой скважины выявило электропроводящую породу в 80 м к югу. Такие исследования позволяют измерить электропроводность и определить местонахождение сульфидных тел за пределами скважины.

В ходе бурения было извлечено 40 м полумассивных сульфидов на глубине от 240 до 280 м. Компания считает, что между минерализацией в двух последних скважинах есть разрыв. Еще предстоит проверить более токопроводящие участки. Компания FireFly охарактеризовала Маунт-Джой как вулканогенно-массивную сульфидную систему VMS, с характеристиками, схожими с Мингом и Тилт-Коув. Она расположена на том же геологическом контакте, что и бывший рудник Тилт-Коув.

По предварительным данным запасы м-ния Грин-Бей составляют 60,2 млн т с содержанием меди 1,9% и золота 0,5 гр\т, что соответствует 1,16 млн т меди и 908 000 унций золота.


Планы по возобновлению работ. В предварительной экономической оценке был представлен базовый сценарий переработки 1,8 млн т в год в течение более чем 30 лет. Дальнейший успех ГРР и рост запасов будут способствовать инвестиционному обоснованию проекта FireFly по строительству централизованного перерабатывающего предприятия с более высокими показателями производства в течение более длительного срока эксплуатации.

https://www.northernminer.com/news/firefly-finds-copper-gold-system

NORTHWEST COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ КВАНИКА В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

29 октября 2026 года

Бурение позволило достичь нескольких ключевых целей, в том числе расширить зону минерализации с более высоким содержанием полезных компонентов примерно на 50 м вверх по падению пласта и закрыть геологический разрыв во втором блоке, расположенном вблизи текущих запасов полезных ископаемых. Эти результаты расширяют известные границы минерализации, улучшают геологическую целостность и непрерывность залегания, а также сокращают расстояние между скважинами примерно до 50 м в целевых районах (рис. 1).



а б

Рис.1. Схемаа расположения скважин (а) и поперечный разрез (б) на проекте Кваника.

Расширенная зона с более высокой минерализацией на глубине 50 м. Бурение подтвердило наличие и ориентацию широкой минерализованной структуры на глубине, заполнило пробел в геологической модели, расширив и улучшив непрерывность, выявило дополнительную первичную медно-золотопорфировую минерализацию, обогащенную палладием.

Непосредственно под текущим запасом бурение выявило первичную медно-золотую порфировую минерализацию, что указывает на возможность обнаружения дополнительной минерализации за пределами текущего запаса. Бурение также подтвердило наличие и ориентацию широкой минерализованной структуры под известным оруденениемм, что открывает возможности для выявления параллельной минерализации на глубине.

NorthWest *—занимается разведкой и разработкой проектов меди и золота в Британской Колумбии, включая Kwanika-Stardust, Lorraine-Top Cat и East Niv.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CANSTAR RESOURCES INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ПРОЕКТЕ VMS МЭРИ МАРЧ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЬЮФАУНДЛЕНДА.


29 октября 2026 г.

При бурении было получено - 1,8 м с содержанием цинка 6,13%, серебра 106,3 г/ т, золота 2,00 г/т, свинца 2,53% и меди 0,75% (эквивалент меди 6,0%, "CuEq") в верхнем контакте с риолитом Fleetway, а также - 1,8 м с содержанием меди 4,1% CuEq на 28 м ниже этого контакта. Эти интервалы являются дополнением к самому широкому массиву сульфидов, обнаруженному в ходе проекта. Каждая скважина, пробуренная в рамках программы, пересекала минерализованные участки, и осенняя программа продолжит изучение риолита Флитвей с учетом новых геофизических данных.

На каждом из сульфидных пересечений, выявленных в ходе летней программы бурения, при последующих электромагнитных исследованиях скважин (ВНЕМ) наблюдался токопроводящий отклик. Отклики на пересечениях смоделированы как внескважинные проводники, простирающиеся вниз по риолитовому контакту в неисследованные грунты, что потенциально может свидетельствовать о наличии дополнительной сульфидной минерализации. Программа бурения позволит протестировать эти скважинные проводники и смоделированный контакт риолита Флитвей.

Три массивных сульфидных пласта залегают на разной глубине относительно верхнего контакта риолита: пласт на контакте и пласты на 28 и 60 м ниже него соответственно. Поскольку формация Мэри-Марч подверглась складчатости и разломам, а массивные сульфидные включения ограничены разломами, положение этих включений в исходной системе минерализации пока не может быть определено, и на основании различий в содержании металлов в разных скважинах нельзя сделать никаких выводов. Системы VMS могут образовывать более одной массивной сульфидной линзы в материнском риолите.

По данным бурения и геофизических исследований, риолитовый комплекс Флитвей простирается на 1,2 км вдоль простирания, из которых 700 м прошли через весь риолитовый пласт, видимая мощность которого в местах бурения составляет от 298 до 320 м. Скважина закончилась в риолите, поэтому нижний контакт ниже массивного сульфидного пласта не был исследован с помощью бурения. Были пробурены скважины на небольшом участке этой протяженности, и большая часть участка не была исследована на предмет минерализации. Нижний контакт также считается перспективным для обнаружения линз ванадиевой меди. Риолит Флитвей сравним с кислыми породами, в которых находятся ме-ния Бьюкенс, расположенные в 20 км от проекта; это геологическое сравнение не подразумевает, что степень минерализации в Бьюкенсе такая же, как в Мэри-Марч (рис. 1).



а б

Рис. 1 Проект Mary March в районе Buchans VMS (а) карта перспективности Мэри Марч (б) *(траектории бурения и контур риолита)*.

Исследование BHEM измеряет реакцию электропроводящих пород, таких как массивные сульфиды, как в скважине, так и в окружающей породе. Отклик скважины интерпретируется как обнаружение массивного сульфида, первое обнаружение на проекте. Электромагнитное излучение в скважине реагирует на смежные электропроводящие сульфидные минералы, такие как пирит и халькопирит; сульфид, богатый цинком, может давать слабый отклик или вообще не давать его. Исследования ориентируют на бурение, но не измеряют содержание. Смоделированные проводники были интегрированы с журналами бурения, литогеохимическими данными и данными индуцированной поляризации в трехмерную геологическую модель проекта, которая использовалась вместе с векторами проводников для определения целей бурения.




Рис. 3 3D геологическая модель Мэри-Марч, вид с юго-запада.

Результаты бурения каждой скважины будут использованы для корректировки модели.

Canstar Resources Inc. *(TSXV: ROX) — флагманский проект по разведке м-ний ванадия, молибдена и кобальта Mary March (площадью 148 км²) расположен в районе Бьюкенс в центральной части Ньюфаундленда*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

EUREKA METALS CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ХУК В РАМКАХ ПРОЕКТА KM98, КВЕБЕК.

29 октября 2026 г.

В рамках проекта ведутся поиски м-ний титана, железа и ванадия, связанных с оксидной минерализацией, выявленной в ходе исторических исследований и геофизических изысканий.

В рамках первой программы бурения будут исследованы приоритетные участки протяженностью 5 км, где в ходе предыдущих ГРР была выявлена массивная и полумассивная оксидная минерализация, а также крупные геофизические объекты, которые ранее не исследовались с помощью бурения (рис. 1).




Рис. 1 Приоритетные точки бурения на участке Хук, проект KM98.

В ходе предыдущих ГРР была выявлена массивная и полумассивная оксидная минерализация титана на поверхности участка Хук.

Программа предназначена для изучения приоритетных участков бурения, с планированием восьми скважин на глубину до 200 м. В рамках программы будут изучены магнитные и кондуктивные аномалии под известными поверхностными минерализованными участками и между ними, включая крупный участок Центр. Программа бурения направлена на оценку потенциала оксидной минерализации, содержащей титан, на глубине в районе участка Хук.

Первоначально бурение будет сосредоточено на участках с известной поверхностной минерализацией, а затем на геофизической цели «Центр». Полученные результаты помогут компании лучше понять мощность, ориентацию и непрерывность минерализации, а также будут служить ориентиром для дальнейших исследований на проекте KM98.

Особый интерес представляет цель «Центр» — крупная магнитная аномалия, расположенная вдоль перспективного участка протяженностью около 5 км. Программа первичного бурения позволит впервые провести подземные исследования на участке Хук с целью определить, связаны ли выявленные геофизические аномалии с минерализацией оксидов титана на глубине, и оценить потенциальную непрерывность минерализации за пределами известных поверхностных пр-ний.

Eureka Metals Corp. *—владеет титановым проектом KM98 в Квебеке, и полиметаллическим проектом Кэбин-Лейк в Британской Колумбии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CORE SILVER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА VMS ПРОЕКТЕ ТУЛИРИ, ЮКОН КАНАДА.

29 октября 2026 г.

Проект Тулири — это новое пр-ние массивных сульфидов вулканического происхождения (VMS), расположенное на территории Юкона. Проект Тулири может стать новой значимой системой м-ний массивных сульфидов вулканического происхождения в одном из самых перспективных, но малоизученных минеральных поясов Канады (рис. 1).





Рис. 1 Расположение и инфраструктура проекта Тулири.

В скважинах была обнаружена обширная массивная сульфидная минерализация в стиле VMS, что указывает на непрерывность этой системы и возможность ее отслеживания. Общая интерпретированная протяженность геофизической сигнатуры зоны обнаружения составляет 3,5 км (рис. 2).






Рис. 1 Районы ГРР, пробы почвы (Cu ppm) (а), вид сверху (б) и разрез (в) на минерализованные зоны.

Дополнительные целевые районы, которые были запланированы для тестирования в 2026 году, включают:

Цель - 4 была идентифицирована по 3 км линейной геофизической сигнатуре с коррелирующими образцами почвы с аномальным содержанием меди и цинка. В последнее время никаких последующих работ или исторического бурения в этом районе не проводилось.

Объект 5 был обнаружен по линейному геофизическому сигналу протяженностью 1,2 км, с которым коррелировали аномальные образцы почвы, содержащие медь и цинк. Бурение в этом районе не проводилось.

Объект - 8 был выявлен на основе интерпретированного комплекса с несколькими скоплениями совпадающих аномальных проб почвы и грунта, взятых в шурфах, с повышенным содержанием меди, золота, серебра и цинка В этом районе не проводилось ни новых, ни исторических буровых работ.

Минерализация представлена мелко - и среднезернистыми пузырьковыми и параллельными слоистости вкрапленниками, от полумассивных до массивных сульфидов, включая пирит + халькопирит ± сфалерит ± ковеллин ± борнит ± тетраэдриты.

Кроме того, минерализация, по-видимому, в основном пространственно связана с серицитовыми изменениями и в меньшей степени с окремнением, часто с баритом, которые наблюдались как на периферии, так и внутри минерализованных участков. Корреляция между зонами минерализации и измененных пород указывает на потенциал значительной полиметаллической системы на проекте Тулири.

Общая интерпретированная протяженность геофизической сигнатуры Зоны обнаружения составляет 3,5 км.

Вулканогенно-массивные сульфидные м-ния (VMS) также называют вулканогенно-ассоциированными, вулканогенно-массивными и вулканогенно-осадочными массивными сульфидными месторождениями. Как правило, они представляют собой линзы полиметаллических массивных сульфидов, которые образуются на морском дне или вблизи него в вулканических средах подводного растяжения. М-ния VMS классифицируются в зависимости от содержания цветных металлов, золота и литологии вмещающих пород. Классификация цветных металлов чаще всего используется для разделения конкретных типов м-ний на группы Cu, Cu-Zn, Zn-Cu и Zn-Pb-Cu в зависимости от соотношения этих трех металлов. Содержание полудрагоценных и драгоценных металлов (серебра и золота) может существенно влиять на экономическую эффективность м-ний VMS. На приведенной ниже модели схематично показана типичная система вертикальных придонных источников до и после деформации, демонстрирующая потенциальную геометрию системы Тулеари (рис. 2).




Рис. 2 Схематическая интерпретация деформированной системы VMS, залегающей в метаморфических породах

Проект Тулири представляет собой перспективный геологоразведочный объект благодаря сочетанию благоприятной геологии, зональных изменений, подтвержденных результатами бурения и стратегического расположения в развивающемся инфраструктурном коридоре.

Минерализованный интервал совпал с линейным магнитным минимумом, выявленным с помощью магнитной съемки с вертолета. В ходе бурения были обнаружены повышенные концентрации меди, цинка, свинца, серебра и золота в минерализации типа VMS на участке размером 300 х 100 м в пределах гораздо более крупной геофизической и геохимической

аномалии длиной 1,2 км, что указывает на значительный потенциал для расширения и новых открытий.

Проект Тулири обладает рядом ключевых характеристик, которые обычно присущи крупным м-ниям с высоким содержанием меди, в том числе:

- большой перспективный земельный участок в хорошо изученном геологическом поясе с высоким содержанием меди, где могут быть обнаружены различные типы минерализованных систем;
- большие перспективы для геологоразведки в регионе, где современные систематические исследования практически не проводились;
- наличие как базовых, так и драгоценных металлов, что обеспечивает потенциал для развития в долгосрочной перспективе;
- близость к развивающейся региональной инфраструктуре, в том числе к предлагаемому Северному транспортному маршруту.

Core Silver Corp. *— проект Touleary расположен на Юконе. На территории Touleary находится подтвержденная бурением полиметаллическая вулканогенная массивная сульфидная система (VMS), содержащая м-ния меди, золота, цинка и серебра. В ходе бурения в зоне Дискавери была выявлена значительная минерализация, в том числе на глубине 2,25 м с содержанием меди 7,18%, золота 3,55 г/т, цинка 4,30% и серебра 116 г/т.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

GOLDHAVEN RESOURCES CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ VMS MAGNO НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

29 октября 2026 года

Проект Magno охватывает более 37 тыс га и включает в себя множество разведочных объектов, в том числе пр-ний серебра, свинца и цинка в зоне D и на пр-нии Магно, а также вольфрамосодержащие скарновые системы в районах Кун и Дед-Гоут.

Проект Magno расположен на территории Кассиарского террейна в северной части Британской Колумбии, в том же геологическом регионе, где находится м-ние свинцово-цинково-серебряных руд Сильвертип компании Coeur Mining — хорошо изученное м-ние с замещением карбонатными породами (carbonate replacement deposit, CRD) (рис. 1).




Рис. 1 Расположение проекта Magno, граничащего с участками Coeur’s Silvertip Holdings и Cassiar Gold Corp.

Недавнее бурение в зоне D выявило многочисленные интервалы полумассивной и массивной сульфидной минерализации, что позволило продвинуться в изучении системы серебра, свинца и цинка, обладающей ключевыми геологическими характеристиками

Пробуренные скважины на участке Middle D, пересекли полумассивные и массивные сульфидные залежи, последняя скважина в этом районе пересекла 18,5 м массивной сульфидной и 9 м полумассивной сульфидной минерализации.

Минерализация включает в себя видимые залежи галенита и сфалерита. Бурение продолжается для оценки геометрии и потенциальной целостности системы.

Пр-ние Magno обладает рядом геологических характеристик, присущих м-нию Сильвертип, в том числе свинцово-цинково-серебряной минерализацией, связанной с карбонатными породами, замещением в виде манто и «дымоходов», а также несколькими минерализованными зонами. Эти сходства создают прочную основу для изучения и оценки более широкого потенциала полиметаллической системы Магно.

Компания GoldHaven объединяет современные геофизические данные, геологическое картирование и текущее бурение, чтобы лучше понять распределение и потенциальную непрерывность минерализации на территории площадью более 37 тыс га.

GoldHaven планирует провести следующие ГРР:

1. Бурение на дополнительных участках в системе зоны D.
2. Лабораторный анализ и составление отчетов по результатам исследований после проверки качества.
3. Интеграция геологических, геохимических и геофизических наборов данных для оценки распределения и потенциальной непрерывности минерализации.

GoldHaven Resources Corp. *— специализируется на перспективных проектах в Северной и Южной Америке. Флагманский актив компании — проект Magno в районе Кассиар на севере Британской Колумбии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

COPPER ONE RESOURCES CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ MAJUBA HILL, НЕВАДА

30 октября 2026 г.

Маджуба-Хилл — это бывший медный рудник с обширной базой геологоразведочных данных, включающей 29 тыс м исторических скважин. Это обеспечивает прочную техническую основу для продолжающихся исследований, направленных на дальнейшее определение масштабов и экономического потенциала минерализованной системы.

В скважинах обнаружены самородная медь и оксиды меди:

- продолжающаяся силикатизация позволила углубить скважину сверх первоначальной проектной глубины.

-бурение заканчивается умеренно окремненным риолитом, содержащим прожилки турмалина, следы мелкозернистого пирита и следы сфалерита

В ходе ГРР была выявлена крупная гидротермальная минерализованная система, содержащая медь, серебро и золото, которая может быть расширена. В настоящее время геологоразведочные работы сосредоточены на совершенствовании геологической модели компании посредством систематического бурения, геологического картирования, геохимического отбора проб и структурной интерпретации для оценки масштабов, непрерывности и значимости минерализации. Для дальнейшего определения масштабов и экономического потенциала минерализованной системы потребуются дополнительные буровые работы и технические исследования.

Copper One Resources Corp. *- флагманский актив компании — медно-серебряно-золотой проект Маджуба-Хилл, штат Невада.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

NORTH ATLANTIC CRITICAL METALS CORP. - ПРОГРЕСС В РАМКАХ СУРЬМЯНОГО ПРОЕКТА POKIOK В НЬЮ-БРАНСУИКЕ.

30 октября 2026 г.

Компания пробурила пять скважин общей протяженностью 3,5 тыс м, что составляет 70% от запланированной программы первого этапа. Все пять скважин пересекли геологические структуры и зоны метаморфизма, что согласуется с интерпретацией компанией продолжения исторической минерализованной системы Лейк-Джордж в направлении залегания пластов, включая предполагаемое продолжение системы жил Хиббарда, на долю которой, по имеющимся данным, приходилось около 80% исторической добычи сурьмы на м-нии Лейк-Джордж. В каждой

скважине были обнаружены геологические структуры и изменения, которые соответствуют расширению исторической минерализованной системы Лейк-Джордж.

Программа бурения на этапе I предназначена для изучения предполагаемого продолжения исторической минерализованной системы Лейк-Джордж на прилегающем проекте Покиок.

Текущая программа сосредоточена на территории, простирающейся от северной границы исторического рудника на 365 мв к северу до Покиока. Компания нацелена на предполагаемое продолжение минерализованной системы Хиббард, ключевого компонента исторической добычи сурьмы в Лейк-Джордже.

Согласованность геологических структур и изменений, наблюдаемых во всех пяти пробуренных скважинах, подтверждает геологическую интерпретацию компании.

В ходе ГРР были обнаружены пр-ния сурьмы и вольфрама, а также молибдена и золота. Эти результаты дают дополнительное геологическое обоснование мультипродуктового характера минерализованной системы Лейк-Джордж — Покиок и текущей программы ГРР.

Текущая программа бурения направлена на то, чтобы определить, распространяется ли историческая минерализованная система Лейк-Джордж на территорию проекта, а также оценить наличие сурьмы, вольфрама и молибдена.

Планы ГРР:

- завершить оставшуюся часть программы бурения на участке Фаза I протяженностью 1500 м;
- продолжить геологическую съемку, отбор керна и его интерпретацию;
- оценить целесообразность последующего бурения в направлении предполагаемого продолжения минерализованной системы Хиббард, которое было определено как приоритетный объект ГРР.

Компания считает, что предстоящие результаты анализа станут важным шагом в оценке значимости геологических наблюдений, сделанных на сегодняшний день, и будут определять дальнейшие ГРР на проекте Покиок.

North Atlantic Critical Metals Corp. *—сосредоточена на развитии проекта Pokiok в Нью-Брансуике, Канада. Участок включает 89 смежных участков недр площадью 18,8 км^2, расположенных в непосредственной близости от исторического сурьмяного рудника Лейк-Джордж.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

LYNX RESOURCES CORP. - ГРР ОБЪЕКТОВ VMS НА ПРОЕКТЕ ТЕРНЕРС-РИДЖ, НЬЮФАУНДЛЕНД.

30 октября 2026 г.

Геофизические исследования являются заключительным этапом программы ГРР, которая также включала сбор данных, отбор проб почвы, механическую выемку грунта и отбор проб из траншей. Компания получила результаты программы отбора проб почвы и ожидает результатов анализа проб, взятых при выемке грунта и в канавах. Были получены данные геофизических исследований и предварительные результаты, но окончательная интерпретация еще не завершена.

Программа ГРР была разработана для изучения приоритетных свинцово-цинково-серебряных пр-ний, выявленных в ходе предыдущих работ

Компания завершила геофизическую съемку методом вызванной поляризации и методом сопротивлений, проведенную компанией Simcoe Geoscience Limited с использованием системы вызванной поляризации/сопротивлений во временной области Alpha IP™.

Съемка охватила около 3 линейных км по трем профилям, каждый из которых имел длину 1,0 км и располагался на расстоянии 200 м от другого. При исследовании использовались 100-м расстояния между диполями и конфигурация «диполь-полюс-диполь» для изучения геофизических откликов на глубине до 300 м.

В ходе исследования были получены данные о заряжаемости и удельном электрическом сопротивлении. Исследование проводилось с целью выявления геофизических аномалий в недрах, оценки потенциальных минерализованных зон и определения приоритетных участков для дальнейших поисков, в том числе для возможного бурения.

Компания намерена объявить о существенных выводах по результатам исследования в области интеллектуальной собственности после получения и изучения окончательных результатов и их интерпретации.

Lynx Resources Corp. *—основной проект —Тернерс-Ридж, расположенный в Ньюфаундленде и Лабрадоре, Канада,*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases


GLADIATOR METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ WHITEHORSE COPPER PROJECT, ЮКОН.

29 октября 2026 года

Бурение вернуло обширные зоны медной минерализации с сопутствующими серебром и молибденом Южной оконечности проекта и продолжает давать высокие результаты, в том числе: 36,0 м при 2,63% Cu, 0,09 г / т Au, 12,06 г / т Ag и 856 ppm Mo из 68,0 м; 20,0 млн при 3,61% Cu, 0,12 г/т Au, 13,68 г/т Ag и 732 промилле Mo; 52,2 млн при 1,17% Cu, 0,15 г/т Au, 6,00 г/т Ag и 454 промилле Mo из 70,8 млн; 26,0 м при 2,00% Cu, 0,25 г / т Au, 9,72 г / т Ag и 736 промилле Mo.

Расширение Южного лимба основаны на пересечении на 62,0 м с содержанием меди 1,34%, что подтверждает определение степени и непрерывности минерализации, при этом подтверждена широкая минерализация меди протяженностью 50 м, при этом Южный лимб остается открытым.

Программа бурения на Коули - пробурено 16 тыс м в дополнение к первоначальной программе бурения на 8 тыс м. Дальнейшее бурение направлено на определение границ залежей и расширение минерализованной системы (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) результатов бурения на Коули (а) и разрез результатов бурения на участке «Гладиатор» (б).

Последующее бурение на Южной оконечности в Коули продолжает обеспечивать широкое, высококачественное приповерхностное медное оруденение с высоким содержанием серебра и молибдена, быстро создавая значительный новый фронт роста ресурсов на проекте.

Результаты бурения на уч-ке Нортерн-Лимб продолжают указывать на наличие медно-молибденовой минерализации в центральной части системы Коули (рис. 2).




Рис. 4 План участка Блэк-Каб Коули с указанием пройденных линий IP.

Разрабатываются планы по расширению геофизической «дорожной карты» на более обширную территорию и совершенствованию успешного процесса геофизического таргетинга, включающего гравиметрическую съемку и вызванную поляризацию. Бурение с использованием геофизических методов дало результат: - 40 м, 2,01 % Cu, 0,72 г/т Au и 19,43 г/т Ag на глубине 176 м; 24 м, 3,03% меди, 1,08 г/т золота и 28,91 г/т серебра на глубине 190 м; 35,9 м, 2,68% меди, 1,35 г/т золота и 19,55 г/т серебра на глубине 172,1 м; 22 м, 4,24% меди, 2,16 г/т золота и 31,04 г/т серебра на глубине 172,1 м

В сочетании с разработкой м-ния Грейт-Саузерн к югу от Коули это гарантирует, что компания Gladiator сохранит доступ к высококачественным ресурсам в будущем.

Gladiator Metals Corp. - *Уайтхорс — это проект поисков и разведки богатых м-ний меди, молибдена, серебра и золота в скарновых породах на территории Юкон, Канада.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

C3 METALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-СКАРНОВОМ ПРОЕКТЕ KHALEESI, ПЕРУ.

2 ноября 2026 г.

Проект Khaleesi расположен в поясе Андауайлас-Яури на юго-востоке Перу, где находятся крупные м-ния медных скарнов и порфиров. Проект Khaleesi расположен вдоль благоприятной зоны контакта известняковых и интрузивных пород, которая делит территорию на две части и простирается в северо-северо-восточном направлении. Известняковые породы являются частью высокопроницаемой формации Ферробамба, а интрузивные породы — частью известного батолита Андауайлас-Яури. В этой зоне контакта находится многофазный интрузивный комплекс, который также простирается с северо-востока на юго-запад, следуя за зоной контакта, которая в основном покрыта тонким слоем ледниковых отложений (рис. 1).




Рис. 1 Региональная карта, концессий компании C3 Metals в сравнении с другими проектами ГРР.

Бурение пересекло интервал интенсивной халькопиритовой минерализации, залегающей в пределах основного магнетитового скарнового тела, которое определяется в рамках текущей программы бурения. Высокосортный интервал - 23,3 м с содержанием меди 4,75%, золота 1,84 г/т, серебра 20,4 г/т, молибдена 5 ppm (6,64 % CuEq) на глубине 352,1 м.

Медная минерализация сосредоточена в скарновых породах с интенсивной халькопиритовой минерализацией в виде вкраплений, сантиметровых жил и массивных заполнений.

Это свидетельствует о потенциальной возможности обнаружения богатой минерализации в многокилометровой скарновой системе, выявленной на сегодняшний день в Халиси (рис. 2).




Рис. 2 План (а) и разрез (б) результатов бурения на геологической карте *(Cu — оранжевый цвет, Mo — синий).*

В настоящее время проводится дополнительное бурение для изучения геометрии, непрерывности и потенциальной протяженности участков с богатой медно-золото-серебряной минерализацией.

Предварительная геологическая интерпретация позволяет предположить, что богатая минералами порода может быть связана с благоприятным карбонатным горизонтом и шарниром широкой складки. Эти потенциальные геологические факторы будут изучены в ходе продолжающегося бурения, чтобы лучше понять геометрию и целостность минерализованной зоны.

Ниже основного интервала с высоким содержанием полезных ископаемых скважины продолжали вскрывать дополнительные скарновые и интрузивные породы с более низким содержанием меди, простирающиеся примерно до глубины 549 м.

На сегодняшний день пробурено 16,8 тыс м в 38 скважинах. Бурение ведется в зоне контакта карбонатных пород формации Ферробамба и многофазного интрузивного комплекса, простирающейся в северо-восточном направлении вдоль известного медного пояса Андауайлас-Яури.

Были проведены магнитные и гравиметрические исследования с помощью дронов на площади 1,5 тыс га, и в настоящее время проводится обработка полученных данных. Компания также проводит 3D-сейсморазведку на территории проекта. Данные магнитометрических, гравиметрических и 3D-изображений глубинных интрузий будут включены в 3D-инверсии, которые можно использовать в сочетании с наземными и существующими буровыми данными и моделями для поиска «слепых» скарнов и потенциальных источников порфировых руд или интрузивных тел.

C3 Metals Inc. *—владеет 31 тыс га в порфиро-скарновом поясе Андауайлас-Яури на юге Перу, где находятся проекты компании Jasperoide и Khaleesi.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

COPPERCORP RESOURCES INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНОГ-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ JUKES, НА ЗАПАДЕ ТАСМАНИИ, АВСТРАЛИЯ.

2 ноября 2026 г.

CopperCorp Resources - корпоративный и операционный отчет, в котором освещаются ключевые события ГРР на западе Тасмании, Австралия (рис. 1).




Рис. 1. Территория проекта Jukes с пр-ниями Whaler и Alpine Stellar.

Завершая программу ГРР на объекте Skyline, CopperCorp сообщает окончательные результаты анализа керна на проспекте Джукс - 12,0 м при содержании 0,54% Cu, 0,14 г/т Au и 0,89 г/т Ag (включая 3,0 м при содержании 0,85% Cu, 0,16 г/т Au и 1,05 г/т Ag).

Компания CopperCorp пробурила восемь алмазных скважин общей протяженностью 3,2 тыс м на Джукс, исследовав около 350 м простирания на глубине до 500 м под поверхностью (рис. 2).




Рис. 1 План (а) и разрез (б) результатов бурения на проекте Jukes.

В течение последних шести месяцев компания CopperCorp проводила ГРР к северу и северо-востоку от пр-ния Альпайн-Стеллар. В ближайшее время планируется опубликовать подробные результаты.

CopperCorp Resources Inc. *—владеет проектом АМС (556 км²) и проектом Джаспер-Хиллс (70 км²), в рудном районе мирового класса.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CHESAPEAKE GOLD CORP. - ПРОГРАММА ГЕОХИМИЧЕЧСКИХ ПОИСКОВ НА ПРОЕКТЕ VMS LUCY, МЕКСИКА.

2 ноября 2026 г.

В зонах Дискавери, Сентрал и Вестерн было собрано более 1000 образцов геохимии почв и горных пород. Для проверки недавно выявленных многочисленных целей была запущена программа бурения 5 тыс м (рис. 1).




Рис. 1 Карта ГРР проекта Люси.

В рамках программы ГРР перспективная зона Люси была расширена с 700-м коридора Дискавери до 2000-м зоны поверхностной минерализации. В ходе этой кампании были выявлены

два отдельных эшелонированных минерализованных коридора, и дальнейшая работа позволит определить, связаны ли они между собой.

В ходе геохимического исследования почвы в новых траншеях и образцах горных пород было обнаружено 17,5 метров породы с содержанием 0,87 г/т золота, 27 г/т серебра, 0,20% меди и 1,16% цинка, в том числе 7,5 метров породы с содержанием 1,97 г/т золота, 57 г/т серебра, 0,42% меди и 2,44% цинка в Центральном коридоре.

Еще одна отчетливая тенденция — заметное увеличение содержания цветных металлов в образцах почвы, траншей и скальных каналов в западной зоне, где геофизическая интерпретация данных электроразведки указывает на наличие порфировой системы.

Еще 3000 м будут отведены под новые цели. Эти скважины позволят определить потенциал второго минерализованного коридора. На 6 скважинах общей протяженностью 2,2 тыс м будут изучены две аномалии удельного электрического сопротивления, заряжаемости и магнитные аномалии в зонах Дискавери и Вестерн, чтобы оценить возможность наличия порфирового источника скарновой минерализации.

Chesapeake Gold Corp *- флагманским активом является проект Метатес ("Метатес") в штате Дуранго, Мексика.*


https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ARYA RESOURCES LTD**.** – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО - ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ WEDGE LAKE, САСКАЧЕВАН.

2 ноября 2026 г.

Проект расположен в рудном поясе Ла-Ронж в провинции Саскачеван. На проекте обнаружена минерализация, связанная с богатыми сульфидами железистыми формациями и высокосортными орогенными кварцевыми жилами. Компания Arya проводит ГРР, чтобы оценить масштабы, непрерывность и взаимосвязь этих минерализованных систем.

«Главная зона» представляет собой пр-ние меди и золота. Оно расположено недалеко от озера Нижний Нистоассини, в скальных породах геологического района Ла-Ронж (рис. 1).



а б

Рис. 1 Карта «Главной зоны» проекта (а) и план ГРР (б).

ГРР включали бурение 12 скважин общей протяженностью 1,5 тыс м, в ходе которых было исследовано 244 м простирания пласта на среднюю глубину 122 м.

Минерализация находится в сцементированных кварц-серицит-биотитовых и серицит-хлоритовых сланцах вулканической последовательности, прорванной кварцевым диоритом и гранодиоритом. Сульфиды представлены вкрапленным и местами массивным пиритом и пирротином, а также в меньшем количестве халькопиритом, сфалеритом и золотом. Минерализация обнаружена в сильно смятых участках зоны и местами вблизи контактов интрузий.

В ходе картографирования были обнаружены измененные риолитовые вулканические породы и железорудные формации сульфидной фации в основной толще. Эти интерпретации дают геологический контекст для положительной оценки проекта.

Arya Resources Ltd. *—специализируется на исследовании и разработке м-ний в Саскачеване.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

MAX POWER MINING CORP. - РАСШИРЯЕТ ПРИРОДНУЮ ВОДОРОДНУЮ СИСТЕМУ САСКАЧЕВАНА.

27 октября 2026 года

Бурение на участке «Лоусон 5» в районе Сентрал-Бьютт, Саскачеван, подтвердило наличие системы природного водорода вдоль западной границы эвапоритов прерий (рис. 1).




Рис. 1 Схема тенденций Genesis – 475 км “Природно-водородного шоссе”

Масштабы возможностей использования природного водорода в Саскачеване отчасти объясняются тем, что компания MAX Power обнаружила действующие системы получения природного водорода в трех отдельных районах, расположенных на расстоянии до 365 км друг от друга в центральной и южной частях провинции, от западной окраины эвапоритового бассейна Прерий на юго-западе через комплекс Лоусон (Лоусон 1–4) до пр-ния Брэкен на крайнем юго-западе, недалеко от границы с Монтаной.

Lawson 5 был успешно обсажен после бурения на общую глубину 2175 м и станет частью предстоящей программы доработки Lawson (для анализа извлечено 62 м керна).

Самый нижний комплекс дейдвуда и докембрийского фундамента на Лоусоне 5 характеризуется гораздо более выраженными реакциями окисления, альтерации и серпентинизации железа, чем наблюдалось до настоящего времени на Лоусоне, включая сильное окисление гематита, связанное с повышенным уровнем природного водорода вдоль субвертикальных разломов в пачке экзотических террейновых исходных пород.;

В Нижнем междуречье, над формацией «сухостоя», имеются перспективные зоны для получения гелия, которые будут исследованы на предмет возможного тестирования во время завершения работ.

MAX Power *— пр-ние Лоусон, расположенное недалеко от Сентрал-Бьютт, Саскачеван, представляет собой первую в Канаде подземную систему природного водорода, существование которой подтверждено глубоким бурением и данными, проверенными тремя независимыми лабораториями.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ


ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

SPARK ENERGY MINERALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР TREO В РАМКАХ ПРОЕКТА АРАПАЙМА В ШТАТЕ МИНАС-ЖЕРАЙС, БРАЗИЛИЯ.

23 октября 2026 г.

Полученные результаты позволяют сосредоточить внимание на редкоземельной зоне Боа-Виста на поверхности и выявить аномалии редкоземельных элементов и галлия на неразбуренной цели Энкашойраду (рис. 1).



а б

Рис. 1 Пр-ния Крузета, Боа-Виста и Энкаш-Оэйраду, на проекте (а) и опробование почвы на Боа-Виста (б).

Результаты наземных исследований указывают на новые возможности для ГРР. Магнитные редкоземельные оксиды составляют 35,3% от общего количества редкоземельных оксидов в образце почвы с Боа-Виста; результаты, полученные на поверхности, послужат ориентиром для следующих тестов на двух других участках проекта Арапайма.

Образцы, собранные на сильно каолинизированном гранитном сапролите Каладао в Боа-Виста, показали содержание 15 434 ppm (1,54%) TREO с 35,3% MREO/TREO и 5171 ppm NdPr. Розовая глинистая почва, показала 3047 ppm TREO с 29,3% MREO/TREO. В 40 из 81 образца почвы в Боа-Виста содержание треоктоза превысило 500 ppm. Результаты анализа на содержание галлия в этих образцах - более 50 г/т, до 134,4 г/т.

Зона редкоземельных элементов выявлена на глубине от 20 до 32 м под горизонтом, богатым галлием.

На Энкашуэйраду в шести из 65 образцов донных отложений содержание треоната лития превысило 500 ppm, а максимальное значение составило 1621 ppm; в образце пегматит-биотитовой породы содержание треоната лития составило 2428 ppm, оксида лития — 637 ppm, а оксида галлия — 137,1 г/т; в пяти из 13 образцов почвы содержание оксида галлия превысило 50 г/т.

Следующие шаги.

Отбор проб почвы и бурение в местах выхода на поверхность редкоземельной зоны в Боа-Виста; рытье траншей и отбор проб из каналов в Энкашуэйраду.


Spark Energy Minerals Inc. *—проект Арапайма площадью 92 тыс га в регионе Литиевая долина в штате Минас-Жерайс, Бразилия.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ НА УРАНОВОМ NIANFORS PROPERTY В ШВЕЦИИ.

26 октября 2026 года

Полевая программа была разработана для изучения урановых радиометрических аномалий, выявленных в ходе радиометрической и магнитной съемки с помощью БПЛА на всей территории проекта, а также для определения приоритетных участков бурения. Она включала геологическое картирование, поиски, радиометрическую съемку и геохимический анализ обнажений коренных пород и валунов. Геологические наблюдения и радиометрические измерения с помощью портативного сцинтилляционного счетчика (Exploranium GR-110) проводились на 111 полевых станциях по всей территории (рис. 1).



а б в г

Рис. 1 Точки геохимического опробования: участок Майсабергет (а, б) и участок Нианфорс (в, г)

Всего было собрано 34 образца валунов и обнажений. Образцы показали следующие геохимические показатели: уран (U_3O_8): от 4 до 937 ppm, иттрий (Y_2O_3): от 7 до 667 ppm, молибден (Mo): от <1 до 509 ppm.

На ураново-иттриево-молибденовом пр-нии Майсабергет были отобраны образцы валунов и обнажений с самым высоким содержанием урана — до 937 ppm U_3O_8. Это пр-ние состоит из 889 минерализованных валунов, расположенных на площади 500 х 200 м. Результаты анализа минерализованных валунов Майсабергета показали средневзвешенное значение 1600 ppm U_3O_8 и 1015 ppm в годовом исчислении.

Несмотря на обширную минерализацию поверхности и выявленные значительные количества урана, залежь Майсабергет никогда не подвергалась буровым испытаниям.

Полевая программа была специально ориентирована на изучение наиболее заметных урановых радиометрических аномалий, выявленных в ходе радиометрической и магнитной съемки с помощью БПЛА. Полевые наблюдения, показания сцинтиллометра, геологическое картирование и геохимические результаты будут использованы для уточнения геологической интерпретации объекта и определения участков дальнейших ГРР и возможного бурения.

Обнаружение повышенного содержания урана, иттрия и молибдена в образцах, собранных в районах радиометрических аномалий, свидетельствует о том, что аномалии, выявленные в ходе исследования с помощью БПЛА требуют дальнейшего изучения. Компания объединяет геохимические данные с результатами геологического картирования и радиометрии, чтобы лучше понять объект и определить наиболее перспективные участки для бурения.

District Metals Corp. *- специализируется на флагманском проекте Viken в Швеции. Проект Viken охватывает - крупнейшее в мире неосвоенное м-ние урана, а также значительные запасы ванадия, калия, молибдена, никеля, меди, цинка и других важных и критически значимых видов сырья.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ СОГТЪЯРН В ШВЕЦИИ.

28 октября 2026 г.

В рамках полевой поисковой программы были изучены радиометрические и магнитные аномалии, выявленные в ходе широкомасштабного исследования с помощью БПЛА. Геологические наблюдения и радиометрические измерения с помощью портативного сцинтилляционного радиометра (Exploranium GR-110) проводились на 163 полевых станциях. Всего для геохимического анализа было отобрано 32 образца горных пород как из обнажений, так и из валунов (рис. 1).




Рис. 1 Радиоизотопное датирование урановосных пород с помощью аэрогеотермометрии,

В ходе полевого картирования были обнаружены многочисленные пегматиты и гранитные интрузии в метаморфических породах, а также урановая минерализация как в интрузивных породах, так и в окружающих их гнейсах.

Урановая минерализация, связанная с пегматитами, была обнаружена на участке протяженностью 2 км, простирающемся на северо-запад и юго-восток за пределы ранее исследованной территории. В минерализованных валунах было обнаружено содержание урана до 1179 ppm U_3O_8, что позволяет предположить, что минерализованная система Согтьерн может простираться за пределы ранее изученных границ.

Урановая минерализация также была обнаружена в окремненных зонах окружающего гнейса, при этом содержание минерализованных валунов достигало 3656 ppm U_3O_8. Такой тип минерализации широко распространен на северо-западе участка Sågtjärn 101, в районе Хаммармиран и на большей части участка Sågtjärn 102.

В минерализованных валунах к югу от Ставербергет содержание молибдена достигает 5250 ppm, а в валуне из урановосного гнейса — 333 ppm кобальта и 1800 ppm меди, что указывает на наличие дополнительных металлов, связанных с урановой минерализацией.

В 1–1,5 км к юго-востоку от исторических буровых скважин в районах Хаммармиран и Ставербергет были обнаружены валуны, содержащие урановую руду. Это указывает на дополнительные районы для дальнейших исследований и позволяет предположить, что минерализованные системы могут простираться за пределы ранее изученных территорий.

Была выявлена обширная урановая минерализация на нескольких участках, в том числе как в пегматитах, так и в окружающих гнейсах. Особый интерес представляет наличие минерализованных валунов, простирающихся на 2 км вдоль простирания за пределами исторически разведанного м-ния Согтьерн, а также дополнительная минерализация, выявленная за пределами исторических буровых площадок в Хаммармиране и Ставербергет.

Результаты полевых работ также подчеркивают наличие молибдена, кобальта и меди, связанных с урановой минерализацией. Эти результаты подтверждают потенциал распространения минерализованных систем за пределы ранее исследованных районов и обеспечивают убедительные цели для последующих ГРР.


District Metals Corp. *- специализируется на флагманском проекте Viken в Швеции. Проект охватывает крупнейшее в мире неосвоенное м-ние урана, а также значительные запасы ванадия, калия, молибдена, никеля, меди, цинка и других важных и критически значимых видов сырья.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ ХЭТЧЕТ-ЛЕЙК В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРОВИНЦИИ САСКАЧЕВАН.

27 октября 2026 года

Результаты представлены в виде высококачественного образца с содержанием U_3O_8 1,3% на глубине 1,0 метра в скважине в урановой зоне «Камертон» («TFUZ»). В целом программа бурения выявила урановую минерализацию с содержанием выше порогового значения в 0,05% U_3O_8 в восьми скважинах, расположенных на расстоянии 200 м друг от друга (рис. 1).



а б

Рис. 1 Положение проекта Хэтчет-Лейк (а) и результаты бурения в зоне TFUZ (б).

В рамках программы было пробурено 19 скважин общей протяженностью 3,8 тыс м, в ходе которых были исследованы пять участков, расположенных на расстоянии 50 м друг от друга вдоль простирания пласта TFUZ протяженностью 200 м. В восьми скважинах на четырех из этих участков была обнаружена урановая минерализация, что свидетельствует о наличии урана в нескольких местах вдоль исследуемого пласта.

Минерализованная зона TFUZ остается открытой с севера и юга. На самом северном буровом забое было обнаружено 0,19% U_3O_8 на глубине 2,8 м, что подтверждает необходимость дальнейших исследований на севере, где 250 м перспективного пласта еще не исследованы. В этом районе были пробурены четыре скважины, но они не были расположены так, чтобы можно было оценить целевые участки, которые в настоящее время определены для дальнейшего изучения. цели.

В 600 м к югу от текущего участка простирается перспективная проводящая жила. В этом районе пробурено всего три скважины, и некоторые из наиболее перспективных участков компании остаются неисследованными. Ожидается, что при последующем бурении приоритет будет отдан расширению в обоих направлениях, с особым акцентом на южные участки.

Foremost Clean Energy Ltd. *(NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (WKN: A3DCC8) —владеет 10 участками общей площадью 330 тыс акров в богатом ураном бассейне Атабаска на севере Саскачевана.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

PURECORE METALS INC. - ОТЧЕТ О РЫНКЕ УРАНА, ЯДЕРНЫЙ СПРОС, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.

27 октября 2026 г.

В отраслевом отчете анализируются прогнозируемые мировые предложение и спрос на уран на фоне увеличения потребления электроэнергии благодаря искусственному интеллекту ("ИИ") и инфраструктуре центров обработки данных.

В докладе использованы данные Международного энергетического агентства (МЭА), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Управления энергетической информации США (EIA), Sprott Asset Management, корпорации Cameco и других признанных отраслевых источников. В нем подчеркивается временной дисбаланс между быстрым развитием инфраструктуры искусственного интеллекта и более длительными сроками разработки новых урановых рудников.

Уран и бум искусственного интеллекта — основные моменты отчета. В отчете рассматриваются несколько тенденций, влияющих на мировую урановую промышленность:

Спрос на электроэнергию, управляемый искусственным интеллектом: По прогнозам МЭА, потребление электроэнергии центрами обработки данных может достичь 950 ТВтч в год к 2030 году.

Глобальная ядерная экспансия: Последние прогнозы МАГАТЭ по наращиванию ядерных генерирующих мощностей на период до 2060 года.

Долгосрочные поставки урана: Отраслевые сценарии, указывающие на совокупный дефицит запасов урана от 700 млн до 1,7 млрд т U_3O_8 до 2040 года.

Цены на уран: Среднеотраслевые спотовые и долгосрочные показатели составили 89,63 и 96,50 долларов США за фунт соответственно.[5]

Контракты на энергоснабжение в атомной отрасли: данные ОВОС, показывающие 186,3 млн неисполненных потребностей США в энергоснабжении на 2026-2035 годы.

Глобальная концентрация производства: доля Казахстана в мировой добыче урана на рудниках составляет 40%.[7]

Разведка и разработка: длительные сроки, связанные с вводом в эксплуатацию новых горнодобывающих проектов.

Портфель активов Purecore: урановое месторождение Юрчисон в Саскачеване и месторождение Бэнкьер в Британской Колумбии.

Стратегия Purecore в области урана и критически важных полезных ископаемых

Purecore продолжает придерживаться стратегии, ориентированной на приобретение и разведку м-ний урана и меди в перспективных горнодобывающих регионах.

Урановое м-ние Юрчисон, принадлежащее компании, расположено в районе Волластон на севере Саскачевана и включает в себя 22 заявки на добычу полезных ископаемых на площади 35 тыс га. В соответствии с окончательным опционным соглашением со Skyharbour Resources Ltd., Purecore имеет право на получение до 100% доли в Юрчисоне.[9]

Проект расположен в 75 м к югу от м-ния Рэбит-Лейк компании Cameco и является объектом продолжающейся программы сбора исторических данных и технической экспертизы, призванной помочь в выборе целей для будущих геологоразведочных работ. [9]

С помощью существующего портфеля и постоянной оценки дополнительных возможностей компания Purecore стремится сформировать портфель активов для разведки критически важных полезных ископаемых в рамках более широких тем, связанных с развитием атомной энергетики, электрификацией и растущими мировыми потребностями в электроэнергии.

Глобальное развитие атомной энергетики и поставки урана

Прогнозы МАГАТЭ по развитию атомной энергетики служат дополнительным подтверждением потенциальных масштабов будущего развития атомной энергетики. По данным МАГАТЭ, на конец 2026 года в мире работало 413 ядерных реакторов общей мощностью 377,1 гигаватт.[3]

Согласно сценарию быстрого роста, разработанному агентством, к 2050 году глобальные мощности атомной энергетики могут увеличиться примерно до 1045 гигаватт, а к 2060 году — до

1284 гигаватт, что более чем в три раза превышает показатели 2026 года. Эти цифры являются прогнозами, основанными на сценариях, а не гарантированными результатами. [3]

Согласно анализу рынка урана, проведенному компанией Sprott, совокупный дефицит поставок урана может составить около 700 млн фунтов U_3O_8 к 2040 году при текущих прогнозах спроса. При сценарии, учитывающем глобальные обязательства по достижению нулевого уровня выбросов, совокупный дефицит может составить примерно 1,7 млрд фунтов U_3O_8 за тот же период.

Цены на уран и контракты с энергетическими компаниями

Согласно опубликованным Cameco данным о ценах на уран, средняя по отрасли спотовая цена на уран составляла 89,63 доллара США за фунт U_3O_8 по состоянию на 30 сентября 2026 года по сравнению с 24,63 доллара США за фунт в январе 2020 года. По состоянию на 30 сентября 2026 года средняя долгосрочная цена на уран в отрасли составляла 96,50 долларов США за фунт по сравнению с 35 долларами США за фунт в конце 2020 года.[5]

В докладе рассматривается, как нерешенные вопросы, связанные с заключением контрактов на строительство атомных электростанций в США, а также потенциальное расширение мирового атомного флота могут повлиять на стратегии закупок урана и будущий спрос на первичное производство урана.

Концентрация мировой добычи урана

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2026 году на долю Казахстана приходилось около 40% мировой добычи урана, что делает его крупнейшей страной-производителем урана в мире.

Казатомпром, национальная урановая компания Казахстана и крупнейший в мире производитель урана, сообщил, что в 2026 году на его долю приходилось около 20% мировой добычи первичного урана.[8]

Purecore Metals Inc. *(CSE: PURE) (FSE: J8Y) (OTCQB: PPURF) — канадская компания по разведке критически важных полезных ископаемых, специализирующаяся на формировании портфеля активов по добыче урана и меди в соответствии с долгосрочным прогнозом роста мирового спроса на электроэнергию.*

UR-ENERGY INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРОЕКТЕ LOST CREEK SOUTH В ВАЙОМИНГЕ, США.

29 октября 2026 г.

Lost Creek South является частью проекта Lost Creek —площадью 55 квадратных миль. В рамках программы бурения будет проведена проверка ряда приоритетных участков на протяжении семи миль в направлении основного тренда на предмет возможного расширения рудника, а также региональных участков с высоким потенциалом для размещения новых ресурсов (рис. 1).




Рис. 1 Стратегия развития Ur-Energy: проекты Lost Creek, Shirley Basin, Lost Soldier и North Hadsell.

Характеристики стратегии:

Агрессивная геологоразведка в рамках флагманского проекта: 120 скважин для тестирования вблизи региональных разведочных объектов по трем основным направлениям, а также по более глубоким, менее изученным направлениям.

Испытания на нескольких буровых установках на глубине: в рамках программы одновременно будут работать до трех буровых установок. Скважины будут буриться на глубине от 500 до 800 футов, но иногда и до 1000 футов.

Большой, малоизученный земельный участок: площадь участка Лост-Крик составляет 55 квадратных миль, из которых на текущие запасы полезных ископаемых приходится менее 10%. Проект Лост-Крик-Саут непосредственно примыкает к зоне залегания оруденения и занимает ~16 квадратных миль от общей площади проекта.

Исторические данные указывают на перспективность широкого бурения: выбор скважин для новой программы основан на данных примерно о 520 исторических скважинах на участке Лост-Крик-Саут, многие из которых были пробурены на небольшой глубине.

Ускорение органического роста: программа бурения на Лост-Крик-Саут является частью стратегии Ur-Energy по развитию нескольких активов. Следует отметить, что компания находится на завершающей стадии подготовки технического отчета по проекту Lost Soldier, после чего ожидается принятие решения о строительстве, а также планирование дополнительного разведочного бурения в Норт-Хадселле в продолжение весьма успешной программы первичного бурения, реализованной в начале этого года.


Ur-Energy *- владеет и управляет урановым рудником и центром переработки Lost Creek ISR на юге центрального Вайоминга и рудником Shirley Basin ISR в центральном Вайоминге*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

SAGA METALS CORP. - СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТОВ HEAVY REE WOLVERINE, СТРЭНДЖ-ЛЕЙК, ЛАБЛАДОР И ТАНБРИЗ НА ЮГЕ ГРЕНЛАНДИИ.

29 октября 2026 г

SAGA представляет геологическое сравнение проекта по добыче тяжелых редкоземельных элементов Wolverine на Лабрадоре с двумя проектами РЗЭ, вмещающие породы которых также обогащены цирконием, ниобием и тяжелыми редкоземельными элементами: Strange Lake на границе Квебека и Лабрадора и в Танбризе на юге Гренландии (рис. 1).



а б

Рис. 1 **а.** - Проекты по добыче редкоземельных элементов Wolverine, Страндж-Лейк и и Танбриз;
б. - три проекта расположены рядом в одном масштабе *(синим цветом обозначены вмещающие породы каждого проекта).*

Различные вмещающие породы, общий набор элементов: минерализация в Росомахе сосредоточена в щелочных вулканических пепловых туфах с субвулканическими гидротермальными жилами и пегматитовыми пластами. В то время как Странное озеро (щелочные граниты и пегматиты) и Танбриз (слоистые нефелиновые сиениты) являются интрузивными породами.

Редкоземельные оксиды, в том числе иттрий, составляют в среднем около 28 % от общего количества редкоземельных оксидов (TREO) в образцах, полученных в ходе бурения методом обратной циркуляции (RC) на проекте Вулверайн.

На проекте Вулверайн минерализованные вулканические породы залегают полого и находятся на поверхности или близко к ней.

На рисунке 1б показаны вмещающие породы каждого проекта и минерализация редкоземельных элементов, нанесенная на карту на поверхности.

Геологический контекст: вмещающие породы

Большинство месторождений редкоземельных элементов связаны с щелочными магматическими породами. К ним относятся месторождения Стрейндж-Лейк и Танбриз, которые залегают в щелочных интрузиях: гранитах, пегматитах и нефелиновых сиенитах соответственно. Вулверайн залегает в щелочных вулканических туфах, а его интрузивный источник до сих пор не изучен. Преимущественно недеформированные вулканические породы привели к образованию пологих минерализованных горизонтов, залегающих на поверхности или вблизи нее.

Wolverine — Лабрадор, Канада (SAGA Metals)

В районе Вулверайн перспективные вулканические породы (участки 3, 4 и 5) были нанесены на карту на площади 26,6 км² из 294,5 км². По результатам бурения содержание тяжелых редкоземельных оксидов в туфе составило в среднем около 28%. На сегодняшний день в туфе обнаружены редкоземельные элементы, используемые в высокопроизводительных постоянных магнитах. Минерализованные вулканические породы залегают полого и были разведаны на глубине до 305 м.

В отличие от систем с интрузивными породами в Странджа-Лейк и Танбризе, вулканический туф в Вулверайн имеет другую геометрию и потенциально может быть использован для поисков. Программа бурения (22 скважины, 3241 м) была разработана для проверки целостности приповерхностного горизонта, получения материала для минералогических и металлургических исследований, а также для сбора данных, необходимых для оценки минеральных ресурсов.

Странное озеро — Квебек, Канада (Torngat Metals)

Стрэйндж-Лейк — это система щелочных гранитов и пегматитов, расположенная на границе Квебека и Лабрадора. Запасы составляют 492 млн т с содержанием редкоземельных оксидов в среднем 0,90% (~278 млн т при содержании редкоземельных оксидов 0,93% и ~214 млн т при содержании редкоземельных оксидов 0,85%), при этом тяжелые редкоземельные оксиды составляют примерно 38% от общего содержания редкоземельных оксидов. Проект богат редкоземельными элементами: неодимом, празеодимом, диспрозием и тербием, которые используются в производстве магнитов.

Танбриз расположен в слоистом какортоките (разновидность нефелинового сиенита) в комплексе Илимауссак на юге Гренландии. Текущие минеральные ресурсы составляют 45 млн т (~25,4 млн т с содержанием TREO 0,37% и ~19,5 млн т с содержанием TREO 0,39%), в среднем 0,38% TREO, при этом тяжелые редкоземельные оксиды составляют 27% от общего содержания TREO. Более обширная вмещающая порода какортокита оценивается в 4,7 млрд т, хотя эта цифра отражает объем вмещающей породы, а не минеральные ресурсы.

Проведенные ГРР на Вулверайн показали, что минерализация редкоземельных элементов находится на поверхности или близко к ней, имеет пологий наклон и приурочена к различным вулканическим образованиям, состоящим из раздробленного и гидротермально измененного пепла, туфа и лавовых потоков. Эта гидротермальная среда вулканического происхождения отличается от магматической и магматическо-гидротермальной среды Танбриз и Стрейндж-Лейк, связанных с интрузиями редкоземельных элементов. Обнаружение субвертикальных минерализованных разломов и брекчиевых структур, а также гидротермальных питающих комплексов в вулканических породах является уникальным и отличает минерализацию редкоземельных элементов в районе Вулверайн от более глубоких объектов, связанных с интрузиями редкоземельных элементов. Потенциал для ГРР в районе Вулверайн остается высоким благодаря выявленным стратиформным и субвертикальным минерализованным структурам.

Дальнейшие исследования позволят расширить границы стратиформной минерализации, контролируемой трещинами. Самое важное — проследить за минерализованными субвертикальными питающими сетями, уходящими вниз, в потенциально специализированные

гидротермально-интрузивные породы, подобные гидротермально измененным породам, содержащим редкоземельные элементы, которые образуют Стрейндж-Лейк. Обнаружение субгоризонтальной и субвертикальной минерализации редкоземельных элементов в сочетании с возможностью проследить субвертикальные жилы редкоземельных элементов в гидротермально измененных интрузивных породах дает Saga Metals беспрецедентный потенциал для открытия новых м-ний в вулканогенно-интрузивной толще, которая простирается на обширной территории.

Программа бурения была разработана для проверки непрерывности минерализации в пологих вулканических породах на участке бурения протяженностью 800 м с целью создания обширной базы аэрофотосъемки, на основе которой можно будет провести первичную оценку ресурсов проекта Вулверайн.

В «Росомахе» содержание тяжелых редкоземельных оксидов, в том числе иттрия, в среднем составляет около 28% от общего содержания редкоземельных оксидов.

SAGA Metals Corp. *— проект Radar Ti-V-Fe занимает площадь 24,2 га и полностью охватывает интрузивный комплекс Дайкс-Ривер площадью 160 км² на поверхности в районе Картрайт, Лабрадор.*

https://www.canadianminingjournal.com/press-release

DISTRICT METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ВИКЕН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШВЕЦИИ.

2 ноября 2026 года

Успешное пересечение «черных» сланцев продолжает демонстрировать, что геофизическая съемка MobileMT, проведенная компанией District, выявила неглубокую и мощную толщу графитовых глинистых сланцев, связанных с сильнопроводящими аномалиями, выявленными на цели A. Эти результаты подтверждают правильность подхода компании к геофизическому таргетированию проводящих аномалий MobileMT, которые, по всей видимости, эффективно отображают глинистые сланцы за пределами месторождения Викен.

Эти результаты бурения демонстрируют ее потенциал в выявлении неглубоких, но мощных пластов глинистого сланца, выходящих за пределы проекта Викен. Эти проводящие пласты на территории Викен изучаются чтобы определить, содержат ли они дополнительные потенциально рентабельные минерализованные системы. Успех в выявлении таких систем может значительно расширить возможности проекта и предоставить компании District большую гибкость в оценке потенциальных сценариев ГРР (рис. 1).




Рис. 1: Расположение целевых участков проекта Viken (а) и бурения в целевой зоне A (б)

District продолжит бурение в широком масштабе на целевых площадях A и B, интегрируя геологические данные бурения с геофизическими интерпретациями, чтобы улучшить понимание распределения и непрерывности залегания алюмокалиевых сланцев.

Потребуются геохимические результаты для определения наличия, качества и непрерывности минерализованных горизонтов алюмосиликатных сланцев, поскольку визуального каротажа керна при бурении и только радиоактивности недостаточно для установления минерализации.

District Metals Corp. *— на проекте Viken находится крупнейшее в мире неосвоенное м-ние урана[i], а также значительные запасы ванадия, калия, молибдена, никеля, меди, цинка и других важных и критически значимых видов сырья.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

AMERICAN LITHIUM CORP**.** - УВЕЛИЧИВАЕТ ИЗМЕРЕННЫЕ И УКАЗАННЫЕ РЕСУРСЫ УРАНОВОГО ПРОЕКТА МАКУСАНИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ПЕРУ.

2 ноября 2026 года

Макусани является крупнейшим известным неразработанным урановым проектом в Южной Америке. Обновленный MRE проекта Macusani выглядит следующим образом:

- Измерено: 10,482 млн т при 179 ppm U_3O_8, что составляет 4,13 млн фунтов U_3O_8.
- Указано: 111,426 млн т при 216 ppm U_3O_8, что составляет 53,03 млн фунтов U_3O_8.
- Предполагается: 114,873 т при 258 ppm U_3O_8, что составляет 65,32 млн фунтов U_3O_8.

Макусани извлекает выгоду из приповерхностной минерализации урана, благоприятных металлургических результатов, включая быстрое выщелачивание и низкое потребление кислоты.

Геологическая интерпретация и блоковое моделирование проводились с использованием программного обеспечения Datamine®. Ресурсы полезных ископаемых были оценены с помощью метода кригинга по множественным индикаторам (Multiple Indicator Kriging, MIK) для двух минерализованных зон (A и B), которые ориентированы субпараллельно поверхности базальной минерализации. Была применена динамическая анизотропия, позволяющая вращать поисковые эллипсоиды и модели вариограмм на уровне отдельных ячеек, что отражает пологое залегание урановой минерализации.

Блочные модели были построены с использованием размеров исходных ячеек 50 × 50 × 3 м на хорошо изученных участках и 100 × 100 × 3 м на менее изученных участках, с учетом возможных сценариев добычи как открытым, так и подземным способом. Выбранный подход к оценке адекватно отражает крайне неравномерное распределение содержания урана и интерпретируемую геометрию минерализованных горизонтов. Оценки тоннажа были получены на основе данных об измеренной объемной плотности. Классификация полезных ископаемых была основана на сочетании геостатистических параметров, включая эффективность кригинга, геологическую достоверность, расстояние между буровыми скважинами и соображения обеспечения качества (“QAQC”).

В рамках обновления компания QP пересмотрела и подтвердила достоверность существующих моделей с помощью статистического анализа, визуальной проверки и оценки результатов бурения. Компания QP также пересмотрела критерии классификации, включив в них расстояние между буровыми скважинами, геологическую целостность, достоверность оценки и практические аспекты добычи полезных ископаемых. Обновленная модель была ограничена рамками концептуальных открытых карьеров и, где это применимо, оценена с точки зрения возможности подземной добычи.

American Lithium *- занимается разработкой двух крупнейших в мире литиевых проектов: литиевый проект TLC в Неваде и литиевый проект Falchani в южной части Перу, где также находятся глобально значимые запасы цезия, а также урановый проект Macusani, расположенный в том же регионе.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

FOREMOST CLEAN ENERGY LTD. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ TURKEY LAKE, БАССЕЙН АТАБАСКА.

2 ноября 2026 года

Программа предназначена для проверки приоритетных целей, выявленных в результате интеграции данных гравиметрической съемки, с данными бурения, электромагнитными, магнитными и геологическими данными.

Пересечения указывают на потенциал проекта и служат основой для дальнейших ГРР. На проекте имеется более 10 км слабоизученных проводящих пластов, а приоритетные цели были уточнены с помощью гравиметрической съемки.

Учитывая небольшую глубину залегания (менее 50 м песчаника), большинство поисковых объектов можно протестировать, пробурив относительно небольшое количество м. Планируется пробурить 1 тыс м, чтобы протестировать примерно четыре целевых участка.

Ценность гравиметрической съемки заключается в том, что она помогает выделить целевые участки в длинном проводящем коридоре. Приоритет отдали участкам, где гравитационные минимумы совпадают с проводниками и/или интерпретируемыми структурными особенностями, а затем использовали данные бурения, чтобы получить ценный геологический контекст для планирования конкретных целей бурения. Программа направлена на то, чтобы проверить, отражают ли эти особенности изменений и структуры, в которых может происходить урановая минерализация, как вблизи неглубокого несогласия, так и в фундаменте.

Учитывая расположение Тёрки-Лейк на окраине бассейна Атабаска, целевые объекты находятся на относительно небольшой глубине, что позволяет тестировать несколько объектов, пробурив относительно небольшое количество метров (рис. 1).




Рис. 1 Расположение проекта Тёрки-Лейк.

Данные бурения, геофизических и геохимических исследований служат основой для уточнения и тестирования целей на озере Терки. В ходе бурения была выявлена урановая минерализация, в том числе: 0,16% U_3O_8 на глубине 0,6 м непосредственно над несогласием под формацией Атабаска и 0,12% U_3O_8 на глубине 0,5 м.

Гравиметрическое исследование помогант определить приоритетность целей вдоль более широкого коридора.

Проект расположен на краю бассейна Атабаска, что означает, что он охватывает как покрытую песчаником территорию, так и открытый фундамент за пределами края бассейна. Там, где присутствует песчаник, его мощность составляет менее 50 м, что позволяет установить контакт песчаника с фундаментом, или несоответствие, на небольшой глубине. Несоответствие является обычной мишенью для поисков уранового оруденения.

Новые гравиметрические данные помогают определить приоритетные участки для тестирования в пределах более широкого коридора (рис. 2).




Рис. 2 Сводная грави-карта проекта Тёрки-Лейк

Гравиметрическая съемка, проведенная в январе 2026 года, выявила многочисленные аномалии низкой гравитации. Они интерпретируются как возможные зоны гидротермальных изменений и потенциальные пути движения флюидов. Некоторые из них совпадают с электромагнитными проводниками и магнитными аномалиями, что позволяет компании сосредоточить бурение на участках, где несколько геологических особенностей и наборов данных указывают на наличие общего геологического объекта.

Основные цели, выявленные в ходе гравиметрической съемки, были разделены на (1) те, что расположены вдоль края бассейна Атабаска и потенциально могут содержать минерализацию в несогласиях («Цели на краю бассейна»), и (2) те, что находятся за пределами бассейна и не имеют песчаникового покрова, а значит, представляют собой цели для поиска минерализации в фундаменте («Цели BEX»).

Foremost Clean Energy Ltd. *- владеет 10 участками общей площадью 330 тыс акров в бассейне Атабаска на севере Саскачевана.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CANAMERA ENERGY METALS CORP. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА SCHRYBURT LAKE RARE EARTH-NIOBIUM PROJECT, ОНТАРИО.

2 ноября 2026 г.

Эта программа является первым бурением в рамках проекта и включает в себя бурение трех наклонных скважин NQ общей протяженностью 1,5 тыс м. Скважины предназначены для изучения приповерхностных проекций трубчатых магнитных аномалий, смоделированных под участками «Голубая сойка», «Старлинг» и «Блэкберд».

Программа включает три наклонных скважины NQ глубиной 500 м каждая на участках Blue Jay, Starling и Blackbird. Моделирование магнитной инверсии преобразует данные аэромагнитной съемки в трехмерную модель распределения магнитных пород под поверхностью. На озере Шрайбурт с помощью этого метода моделирования были выявлены трубчатые магнитные аномалии под Комплексом, простирающиеся на глубину от 600 до более чем 1000 м под поверхностью. Нынешние скважины предназначены для изучения приповерхностных проявлений этих аномалий.

Места для бурения были выбраны на основе геологоразведочных данных, результатов моделирования магнитной инверсии, радиометрии и отбора проб с поверхности (рис. 1).




Рис. 1 Предлагаемые места бурения на озере Шрайбурт

Проект «Озеро Шрайбурт» включает в себя 252 непатентованных участка площадью 4,9 тыс га. На территории проекта находится комплекс — мезопротерозойская карбонатитовая интрузия возрастом около 1145 млн лет, состоящая из карбонатитовых и силико-карбонатитовых пород, простирающихся в радиусе 3,3 км. Были определены пять целевых участков: голубая сойка, щегол, скворец, чёрный дрозд и колибри.


Canamera Energy Metals Corp. *— компания, занимающаяся поисками и разведкой м-ний редкоземельных элементов, с растущим портфелем проектов в Бразилии, США и Канаде.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

RARE EARTHS AMERICAS, INC. - ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ НА ПРОЕКТЕ ALPHA, БРАЗИЛИЯ.

2 ноября 2026 г.

Результаты первой серии лабораторных тестов на выщелачивание, проведенных компанией SGS на материале, полученном в рамках проекта «Альфа» (рис. 1).



а б

Рис. 1 Расположение RZM проекта Альфа (а) и план основных целей (б).

Тестирование, проведенное компанией SGS, позволило получить ключевые данные для первичной оценки. После выбора предпочтительного реагента для выщелачивания исследование продвигается к запланированному выпуску и призвано дать предварительное представление о потенциальном плане разработки м-ния, профиле производства, капитальных и эксплуатационных затратах, а также об экономических показателях проекта, если это будет оправдано полученными результатами.

Компания SGS добилась извлечения 40% всех редкоземельных элементов, за исключением церия (TREE-Ce), по сравнению с предполагаемым показателем в 27% в предыдущем кратком техническом отчете. Это показатель только на этапе выщелачивания, а не на этапе извлечения конечного продукта, пригодного для продажи, и он отражает другие условия испытаний. Если этот процесс можно будет повторить и масштабировать, то извлечение большего количества редкоземельных элементов из того же добытого материала может улучшить экономические показатели проекта.

В исследуемом композите неодим, празеодим, диспрозий и тербий составляли примерно 37% редкоземельных элементов, не считая церия; тяжелые редкоземельные элементы составляли примерно 29%. Эти процентные показатели относятся к исследуемому композиту, а не к минеральному ресурсу.

Предполагаемые запасы полезных ископаемых на м-нии Альфа составляют 202 млн т с содержанием TREO 1520 ppm при пороговом значении 1000 ppm TREO. Магнитные редкоземельные элементы неодим и празеодим (NdPr), а также диспрозий и тербий (DyTb) составляют 21% и 3% от общего содержания TREO соответственно.

Сульфат аммония был выбран в качестве предпочтительного реагента для выщелачивания с учетом баланса извлечения редкоземельных элементов, поведения примесей и возможных эксплуатационных факторов; лабораторные результаты показывают, что умеренная кислотность может помочь ограничить растворение нежелательных металлов. Дальнейшие испытания позволят оценить эффективность процесса и возможность его масштабирования.

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. - РАСШИРЯЕТ REE ПРОЕКТ GEM HILLS С ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ИОНОВ, ШТАТ НЕВАДА.

02 ноября 2026 г.

Проект расположен на восточном склоне гор Кловер в округе Линкольн, на юго-востоке штата Невада, примерно в 170 км к северо-востоку от Лас-Вегаса. Каждый участок занимает площадь 8,36 га, общая площадь составляет 167,22 га (рис. 1).



Рис. 1 Карта расположения проекта в Гем-Хиллс.

Проект Gem Hills связан с минерализацией редкоземельных элементов (, обнаруженной в ходе региональной геологоразведочной кампании. Участок расположен за пределами рудного района на юго-восточной окраине кальдерного комплекса Кальенте третичного периода. ГРР, в том числе отбор проб поверхностных пород, ручная траншейная разработка и отбор проб из отвалов исторических выработок, подтвердили наличие минерализованного участка протяженностью 90 м, который остается открытым с севера и юга.

Минерализация редкоземельными элементами развилась непосредственно на брекчированном/разломном контакте с девонскими известняками/доломитами и распространилась дальше в виде зоны смешанной глинистой брекчии из карбонатных и вулканических пород с более низким содержанием минералов, которая местами простирается до глинисто-филлитовых измененных вулканических пород. По всей видимости, фрагменты карбонатных пород были замещены минералами, богатыми редкоземельными элементами, а также, в основном, но не всегда, более или менее многочисленными минералами черного оксида марганца.

Проект «Джем Хиллс» отличается высоким содержанием оксидов редкоземельных металлов (TREO), значительным обогащением тяжелыми редкоземельными элементами (HREE) и благоприятным для окружающей среды профилем радиационного фона, близким к нулевому.

Минерализация характеризуется высоким содержанием как легких редкоземельных элементов (LREE), в частности празеодима и неодима, так и критических HREE, включая гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий и эрбий. Также наблюдается заметное обогащение иттрием, результаты анализов достигают 0,435%

Важно отметить, что в минерализации Джем-Хиллз отсутствуют опасные урановые и ториевые аномалии, а уровень радиации соответствует нормальному фоновому. В то время как в м-ниях редкоземельных элементов с низкой радиоактивностью (таких как карбонатиты) обычно отсутствуют тяжелые редкоземельные элементы, необходимые для современных технологий, в Джем-Хиллз сочетаются экологически чистый профиль с низким уровнем радиации и относительно высокая доля тяжелых редкоземельных элементов. Это уникальный, менее затратный и более безопасный способ извлечения критически важных металлов без рисков для окружающей среды и соблюдения нормативных требований, связанных с высокорадиоактивными рудами.

Бастнезит был единственной обнаруженной дискретной минеральной фазой РЗЭ, присутствующей в следовых количествах — до 0,18%. Следовательно, основная часть РЗЭ (более 90%) адсорбирована на глинистых минералах — накритах, гиббситах и нордстрандитах, а незначительная часть потенциально содержится во флюорите.

Макроскопически обильное содержание глиноподобных минералов (до 50%) характеризует характерную для проекта «черно-белую пятнистую брекчию». Результаты рентгеноструктурного анализа подтверждают, что белые вкрапления состоят из накрита, гиббсита и нордстрандита, а окружающая их черная матрица представляет собой смесь оксидов марганца и карбонатных минералов.

Генетическая модель месторождения Джем-Хиллс.

На основе местных геологических условий и минеральных комплексов была разработана комплексная генетическая модель.

Проект редкоземельных элементов (РЗЭ) Джем-Хиллс представляет собой сильно локализованную многостадийную магма-гидротермальную систему, сформированную поздними региональными флюидами и перекрытую системой изменений кальдеры в масштабах района. Оруденение структурно локализовано вдоль почти вертикальной зоны разлома, простирающейся с северо-запада на юго-восток, вблизи третичного края кальдеры, и представляет собой химическую ловушку на контакте между реактивными палеозойскими карбонатными породами на западе и известково-щелочными риолитами и латитами на востоке.

Формирование минерализации редкоземельных элементов в Джем-Хиллз происходило в три перекрывающихся (сдвинутых) гидротермальных этапа:

Этап 1: глубокое щелочное магматическо-гидротермальное воздействие — первоначальное поступление магматических флюидов, образовавшихся в результате внедрения щелочных монцонит-сиенитов, с выделением высокоинвазивных флюидов, богатых фтором, углекислым газом, легкими и тяжелыми редкоземельными элементами.

Этап 2: ослабление влияния аргиллитов и ловушка для адсорбции редкоземельных элементов — кислые, более холодные гидротермальные флюиды образовали относительно высокотемпературный накрит и гидроксиды алюминия, создав идеальную среду для адсорбции глинистых минералов, в которой задерживаются мигрирующие редкоземельные элементы.

Этап 3: образование парофазной кальдеры в масштабах района и региональное окисление флюидов — на позднем этапе в результате окисления флюидов в брекчии появляются многочисленные оксиды марганца и железа, формирующие темную матрицу.

Проект редкоземельных элементов Джем-Хиллз является уникальным и может представлять собой совершенно новый класс гидротермально-метасоматических м-ний редкоземельных элементов, связанных с адсорбцией ионов. В то время как типичные м-ния, образовавшиеся в результате ионной адсорбции, залегают в реголите и формируются за счет медленных процессов поверхностного выветривания, в результате которых образуются м-ния с низким содержанием полезных ископаемых, Джем-Хиллс отличается исключительно высоким содержанием редкоземельных элементов, образовавшихся в результате работы мощной многоступенчатой гидротермальной системы. Такое уникальное генетическое происхождение делает Джем-Хиллс уникальной целью с потенциально прорывной экономикой для сектора критически важных полезных ископаемых.

Globex Mining Enterprises Inc. *- проект «Джем Хиллс» сочетает в себе исключительный профиль обогащения тяжелыми редкоземельными элементами (HREE) с весьма благоприятными предварительными минералогическими и экологическими показателями.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

URANIUM ONE MINING CORP. - ПРОГРАММА ГРР НА УРАНОВОМ ПРОЕКТЕ YUTY PROMOTEO, ПАРАГВАЙ.

2 ноября 2026 года

Урановый проект Юти Прометео —площадью 90 тыс га расположен в бассейне реки Парана на юго-востоке Парагвая.

Uranium One приступила к реализации первой программы ГРР, направленной на проверку исторических данных, оценку ранее выявленных геохимических аномалий, связанных с ураном, и оценку перспективных участков для определения и приоритизации будущих целей бурения (рис. 1).




Рис. 1 Карта проекта Юти Прометео с прилегающими проектами Uranium Energy Corp.

Полевые работы будут включать радиометрические измерения, фотофиксацию, геопривязку с помощью GPS, осмотр доступных обнажений горных пород, а также сбор до 100 репрезентативных образцов горных пород или почвы для геологической интерпретации и планирования будущих ГРР.

«Прометео» занимает площадь 27,7 тыс га и непосредственно примыкает к проекту «Юты» компании UEC. На территории проекта пробурено 27 скважин, средняя глубина которых составляет 165 м. Спектрально-гамма-каротаж скважин показал наличие урана в семи скважинах, глубина которых в среднем составляла 175 метров. В шести из семи скважин были обнаружены аномально высокие значения содержания урана — 0,01–0,02 % U_3O_8, а в седьмой скважине на протяжении 107 м была обнаружена сильно минерализованная порода с содержанием урана от 0,05% до 0.10% U_3O_8.

Данные ГРР свидетельствуют о том, что блок Прометео расположен вдоль геологического разлома, соединяющего UEC’с прилегающим блоком Трансандес.

Концессии Сан-Хосе охватывают территорию площадью 62,2 тыс га на трех смежных участках, расположенных вдоль границы между верхнепермскими и каменноугольными отложениями. Радиометрическое картографирование, проведенное на территории 40 х 10 км, выявило значительные урановые аномалии. В совокупности эти участки представляют собой стратегически выгодные и перспективные пр-ния урана в одном из самых многообещающих урановых районов Южной Америки.

Uranium One Mining Corp. *—проекты компании включают Quark Uranium Project, Yuty Prometeo Uranium Project и Nucleon Uranium Project, каждый из которых обладает значительным потенциалом для ГРР и расширения ресурсной базы.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ ГРР


ТЕМЫ:

Научно-методические основы, технологии, методы и методики, технические средства, прогнозно-поисковые комплексы

FIREWEED METALS CORP. – ТЕХНОЛОГИЯ МЮОННОЙ ТОМОГРАФИИ НА ПРОЕКТЕ VMS MACPASS, ЮКОН, КАНАДА.

29 октября 2026 г.

Бурение на проекте выявило два пересечения минерализации в нижней части пласта, а также массивные сульфиды на глубине от 163,17 м до 181,92 м, состоящие из брекчированного сфалерита, галенита и барита, а также массивных галенита и сфалерита, разделенных прослойкой черного аргиллита. Порядок залегания «полосатых» отложений Макмиллан-Пасс, минерализации в нижней части пласта, массивных сульфидов, черных аргиллитов, за которыми следует обратный порядок залегания черных аргиллитов, массивных сульфидов, минерализации в нижней части пласта и «полосатых» отложений, указывает на паразитическую складчатость минерализованной зоны в этом районе (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и 3D разрез (б) на проекте VMS Macpass.

В рамках исследования с помощью мюонной томографии были пробурены три скважины. Успешное внедрение приборов мюонной томографии в трех скважинах на проекте для определения слоистых и массивных сульфидов. Целью исследования с помощью мюонной томографии является выявление признаков высокой плотности стратифицированных и полумассивных сульфидов. Исследование планируется проводить автономно в течение зимы с целью более точного определения геометрии оруденения, изучения возможного смещения или разлома в минерализованных зонах, а также для планирования будущей целевой разведки.

Этот интервал включает в себя преимущественно массивные сульфиды на глубине от 191,44 м до 210,39 м, состоящие из массивного сфалерита, галенита и небольшого количества барита, которые редко перемежаются с черными аргиллитами. Залегание и осадочные пластинки по периферии ориентированы субперпендикулярно оси ядра.

Fireweed Metals *—владеет вольфрамовым проектом Мактунг и цинково-свинцово-серебряный (галлий-германиевый) проектом Макпасс.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases