ФГБУ «ВИМС»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-БЮЛЛЕТЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРР И ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКИХ ПИ

ЧЕРНЫЕ (Fe, Cr, Mn, Ti, CaF_2 и др.),
ЦВЕТНЫЕ (Cu, Mo, W, Sn, Al и др.),
НЕРУДНЫЕ (графит, кремнезем, уголь и др.)
РАДИОАКТИВНЫЕ (U, Th)
РЕДКОМЕТАЛЬНЫЕ (Zr, Nb-Ta, Be, Li и др.)

№ 362

ноябрь 2026 г.

Редактор-составитель: В.В. Коротков

СОДЕРЖАНИЕ:

Сырье	РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	Стр
Sb Au	1. CANAGOLD RESOURCES LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ЗОЛОТО-СУРЬМЯНОМ ПРОЕКТЕ POLARIS GOLD В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……	4
Cu	2. OSISKO METALS INCORPORATED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ ГАСПЕ В ВОСТОЧНОМ КВЕБЕКЕ……	4
Cu Mo	3. EDGE COPPER CORPORATION - ОБНАРУЖИЛА КРУПНУЮ МЕДНО-ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНО-МОЛИБДЕНОВУЮ ПОРФИРОВУЮ СИСТЕМУ НА ПРОЕКТЕ ZONIA COPPER PROJECT В АРИЗОНЕ……	5
Cu Mo	4. ANDINA COPPER CORPORATION - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО БУРЕНИЯ НА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ КОБРАСКО, В ЧОКО, КОЛУМБИЯ……	6
Cu Mo	5. DOMESTIC METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА Cu-Mo ПРОЕКТЕ CRD SMART CREEK, МОНТАНА……	7
Cu Au	6. PACIFIC EMPIRE MINERALS CORP - РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРОЕКТАХ TRIDENT И PINNACLE COPPER-GOLD В КЕСНЕЛЬСКОМ ТЕРРЕЙНЕ НА СЕВЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……	8
Cu	7. SURGE COPPER CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА BERG COPPER PROJECT В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……	8
Cu	8. EASTPORT CRITICAL METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ «МАЦИТАМА» НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ БОТСВАНЫ……	9
Cu	9. MUNDORO CAPITAL INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДЬ В ПРЕДЕЛАХ МАГМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТИМОК, СЕРБИЯ……	10
Sn	*10.* ALPHAMIN RESOURCES CORP. – ПРОИЗВОДСТВО ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА НА ПРОЕКТЕ BISIE В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО……	11
Cu Au	11. TINTINA MINES LIMITED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ DOS AMIGOS В ЧИЛИ……	11
VMS	12. FIREFLY METALS LTD**.** - РАСШИРЯЮТ ЗОНУ VMS НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ GREEN BAY В НЬЮФАУНДЛЕНДЕ И ЛАБРАДОРЕ, КАНАДА……	12
Ni	13. FPX NICKEL CORP. - ВЫЯВЛЯЕТ ПРИПОВЕРХНОСТНУЮ ЗОНУ ВЫСОКОСОРТНОГО НИКЕЛЯ AWARUITE НА ПРОЕКТЕ ADVOCATE NICKEL В НЬЮФАУНДЛЕНДЕ……	13
Sb	14. CRITICAL ONE ENERGY СООБЩАЕТ - УВЕЛИЧИВАЕТ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ СУРЬМЫ НА ПРОЕКТЕ ОЗЕРА ХАУЭЛЛС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОНТАРИО, КАНАДА……	14
Cu Mo	15. C3 METALS INC. - ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ КХАЛИСИ, ПЕРУ……	15
PGE	**16.** ARYA RESOURCES LTD. - ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ НА ПРОЕКТЕ PGE RAMP EAST НА СЕВЕРЕ САСКАЧЕВАНА……	16
Cu Mo	17. PROSPECTIVA RESOURCES LTD - ИДЕНТИФИЦИРУЕТ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ САН-ФРАНЦИСКО В РУДНОМ ПОЯСЕ БОРБОРЕМА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ БРАЗИЛИИ……	18
Sb Au	18. NEW AGE METALS INC. – ПРОБООТБОР В РАМКАХ ЗОЛОТО-СУРЬМЯНОГО ПРОЕКТА SENTINEL, НЬЮФАУНДЛЕНД……	19
Cu Au	19. AMERICAN EAGLE GOLD CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ NAK В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……	20
Cu Au	20. ARRAS MINERALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО-ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ ELEMES В КАЗАХСТАНЕ……	21
VMS	21. GUNNISON COPPER CORP. - ПОДТВЕРДИЛА НАЛИЧИЕ ОРУДЕНЕНИЯ МЕДИ, ЦИНКА И СЕРЕБРА НА ПРОЕКТЕ VMS STRONG & HARRIS В ЮЖНОЙ АРИЗОНЕ……	22
Cu	22. CANTERRA MINERALS CORPORATION – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ LEMARCHANT В РАЙОНЕ БУЧАНС, НЬЮФАУНДЛЕНД……	22
Ni	23. ZEB NICKEL CORP. - НАЧИНАЕТ БУРЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА ZEB NICKEL В ПРОВИНЦИИ ЛИМПОПО, ЮЖНАЯ АФРИКА……	23
Cu Mo	24. MIDLAND EXPLORATION INC. - ИССЛЕДОВАНИЯ АВИА-ГРАВИТАЦИОННЫМ ГРАДИЕНТОМЕТРОМ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ LA PELTRIE В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АБИТИБИ, КВЕБЕК……	23
Cu Au	25. AMARC RESOURCES LTD. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ МЕДНО-ЗОЛОТОГО ПОРФИРА В РАЙОНЕ ДЬЮК, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ……	24
Cu Mo	26. MINSUD RESOURCES CORP. - БУРЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ ЧИТРА-ВЭЛЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ БРЕКЧИЙ - ПОРФИРОВ CU-MO-AU-AG В ПРОВИНЦИИ САН-ХУАН, АРГЕНТИНА……	25
Cu	27. FITZROY MINERALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ БУЭН РЕТИРО, ЧИЛИ……	26
Cu	28. NORTHWEST COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ КВАНИКА В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……	27
Cu Au	29. COPPERNICO METALS INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ СОМБРЕРО В АЯКУЧО, ПЕРУ……	28
W	30. WESTERN STAR RESOURCES INC. - МАГНИТНЫЙ БЕСПИЛОТНИК ОТСЛЕЖИВАЕТ СКАРНОВЫЙ ГРАНИТНО-ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КОНТАКТ НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ ИГЛ-ПОЙНТ, ШТАТ НЬЮ-МЕКСИКО……	29

Cu Au	31. AMARC RESOURCES LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ ДЖОЙ НА СЕВЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ……....	31
Cu Au	32. VISIONARY METALS CORP**.** - ПРОГРАММА ГРР НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ SLIPSTREAM, В ОКРУГЕ БОКС-ЭЛДЕР, ШТАТ ЮТА,……	32
PGE	33. TALON METALS CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА НИКЕЛЕВО-МЕДНО-КОБАЛЬТОВОМ ПРОЕКТЕ ТАМАРАК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МИННЕСОТЕ……..	34
Ni Cu	34. SAMA RESOURCES INC. - БУРЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ И РАСШИРЯЕТ ПРИПОВЕРХНОСТНУЮ НИКЕЛЬ-МЕДНУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ НА НИКЕЛЬ-МЕДНОМ ПРОЕКТЕ SAMAPLEU-GRATA В КОТ-Д'ИВУАРЕ, ЗАПАДНАЯ АФРИКА……..	35
	НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
H	35. BRUTUS MINING INC. - ПРИОБРЕТЕТ ВОДОРОДНЫЙ ПРОЕКТ BAY OF ISLANDS В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НЬЮФАУНДЛЕНДА……..	37
	РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
U	36. FORTUNE BAY CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА УРАНОВЫХ ПРОЕКТАХ «МУРМАК» И «СТРАЙК» НА СЕВЕРЕ САСКАЧЕВАНА……	39
U	*37.* ISOENERGY LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР В РАМКАХ LAROCQUE EAST PROJECT НА ТЕРРИТОРИИ М-НИЯ HURRICANE В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА АТАБАСКА……	39
U	38. STANDARD URANIUM LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ДЭВИДСОН, БАССЕЙН АТАБАСКА……	41
RZM	*39.* CATALYST ONE EXPLORATION CORP. - ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕКТА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ BC REE PROPERTY, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ……..	43
Li	40. SCOTIA METALS CORP. - НАЧИНАЕТ ПРОГРАММУ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ACADIA LITHIUM, НА ЮГО-ЗАПАДЕ НОВОЙ ШОТЛАНДИИ……..	43
RZM	41. APEX CRITICAL METALS CORP. - РАСШИРЯЕТ ЗОНУ TRINITY НА RZM ПРОЕКТЕ RIFT, ШТАТ НЕБРАСКА, США……	45
RZM	42. RARE EARTHS AMERICAS, INC. - РАСШИРЯЕТ RZM МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА HOMER В ЩЕЛОЧНОЙ ПРОВИНЦИИ ГОЯС В БРАЗИЛИИ……...	46
U	43. ASARIAN ENERGY LIMITED - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПР-НИИ НАМИБПЛААС НА ПРОЕКТЕ NORASA В НАМИБИИ……	47
Ni	44. NIOBIUMX MINING INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ НАЗЕМНОЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ НА НИОБИЕВОМ ПРОЕКТЕ ШИПШОУ, В КВЕБЕКЕ……..	48
	ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ.	
	45. SEEQUENT EXPLORATION INC**.** - ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕДР……	50
	46. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ САСКАЧЕВАНА И КОМПАНИЯ HITACHI СОТРУДНИЧАЮТ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИЗА МИНЕРАЛОВ…….	50
RZM	47. FULCRUM METALS PLC - ТЕХНОЛОГИИ EXTRAKT PROCESS SOLUTIONS ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ RZM НА ПРОЕКТЕ ТЕК- ХЬЮЗ В КИРКЛЕНД-ЛЕЙК, ОНТАРИО…..	51

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

CANAGOLD RESOURCES LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА ЗОЛОТО-СУРЬМЯНОМ ПРОЕКТЕ POLARIS GOLD В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

3 ноября 2026 г.

Программа бурения была разработана для дальнейшего определения и расширения высокосортной сурьмяной минерализации, выявленной на Нью-Поларис, а также оценки ее потенциального вклада в проект (рис. 1).




Рис. 1 Результаты бурение на проекте Polaris.

Завершенная программа бурения протяженностью 7.3 тыс м в 14 скважинах была нацелена на зону с высоким содержанием золота и сурьмы.

Canagold Resources Ltd. *— компания занимается продвижением проекта New Polaris на этапах технико-экономического обоснования,*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

OSISKO METALS INCORPORATED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ ГАСПЕ В ВОСТОЧНОМ КВЕБЕКЕ.

3 ноября 2026 г.

Компания сосредоточена на расширении ресурсной базы Гаспе, где текущие измеренные и предполагаемые минеральные ресурсы составляют 1,83 млрд т со средним содержанием меди в эквиваленте 0,32% и предполагаемые минеральные ресурсы составляют 239 млн т со средним содержанием меди в эквиваленте 0,46% (в соответствии со стандартом NI 43-101).

Результаты включают 38 минерализованных пересечений в 15 скважинах. Пересечения находятся в пределах модели MRE 2026 года и их цель — повысить категорию предполагаемых минеральных ресурсов до измеренных или предполагаемых категорий, в зависимости от ситуации. «Расширяющиеся» участки расположены за пределами модели MRE 2026 и включают в себя либо 1) расширение в пределах карьера, что дает возможность превратить отходы в дополнительные ресурсы в пределах карьера Уиттл по модели MRE 2026; либо 2) расширение за пределами карьера, то есть минерализацию, расположенную за пределами карьера Уиттл по модели MRE 2026, что потенциально может привести к выявлению новых ресурсов (рис. 1).




Рис. 1

На уровне скарнов зон B и C, включая промежуточные порцелланиты, содержание меди составляло в среднем 0,42%, а серебра — 2,39 г/т.

Проект Гаспе относится к медно-порфировому/скарновому типу, оруденение представлено вкраплениями и штокверками халькопирита с пиритом или пирротином, а также небольшим количеством борнита и молибденита. На Медной горе были обнаружены одна прогрессивная и по меньшей мере пять ретроградных минерализаций в виде жил и штокверков, которые перекрывают более ранние стратиформные скарны, образовавшиеся в результате замещения карбонатов, и минерализацию, связанную с порцелланитом, по всей системе Гаспе.

Текущая программа бурения направлена на то, чтобы перевести большую часть оставшихся ресурсов, отнесенных к категории MRE Inferred, в категории Measured и Indicated, а также проверить возможность расширения общих ресурсов в западном направлении и на юг/юго-запад в сторону Игл-Ист и Игл-Маунтин соответственно.

Osisko Metals Incorporated *—компания сосредоточена на расширении ресурсной базы проекта Гаспе*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

EDGE COPPER CORPORATION - ОБНАРУЖИЛА КРУПНУЮ МЕДНО-ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНО-МОЛИБДЕНОВУЮ ПОРФИРОВУЮ СИСТЕМУ НА ПРОЕКТЕ ZONIA COPPER PROJECT В АРИЗОНЕ.


5 ноября 2026 г.

Все 13 скважин, пробуренных ниже оксидного оруденения, пересекли сульфидную минерализацию примерно на 3 км в длину; семь были расширены, чтобы проверить ее на глубине.

Исследования с индуцированной поляризацией (IP) показывают существенно большую зону заряжаемости, примерно 5 км в длину и 1 км в ширину на глубине 600 м. При широкозахватном бурении было исследовано 60% этой протяженности, и несколько самых глубоких скважин вскрыли минерализацию.

Все 13 скважин, пробуренных ниже оксидного оруденения, пересекли сульфидную минерализацию Cu-Au-Ag-Mo на участке протяженностью 3 км. Шесть скважин были пробурены для определения оксидной минерализации и остановлены вскоре после выхода на сульфидную породу; семь скважин были продолжены для изучения сульфидной минерализации Cu-Au-Ag-Mo на глубине. Площадь распространения минерализации простирается на 5 км по простиранию, что указывает на то, что система больше, чем площадь, пробуренная на сегодняшний день.


Основной результат - пересеченная минерализация оксида меди с содержанием 0,33% от общего объема меди (разрез) на высоте 277 футов от поверхности (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и разрез (б) бурения на проекте Zonia.

Две геофизические съемки методом вызванной поляризации (IP) и методом электрического сопротивления охватывают Зонию: 13 исторических линий северо-запад — юго-восток (около 28 км), и шесть недавних линий (20 км), в том числе спектральная линия IP длиной 6 км вдоль оси проекта. В обоих случаях использовались диполь-дипольные массивы во временной области с 200-метровыми диполями, а данные были объединены в ходе трехмерной инверсии, проведенной компанией Mira Geoscience. Исследования показали наличие одного когерентного заряженного тела, движущегося с северо-востока на юго-запад (рис. 2).



а б

Рис. 2. Общий и локальный планы (а) и разрез (б) съемки IP.

Edge Copper учитывает новые результаты при составлении обновленных геологических моделей и моделей оценки ресурсов поекта Зония. Текущие работы включают в себя:

- завершение оставшейся программы бурения оксидных пр-ний, которая направлена на определение масштабов оксидной минерализации;
- уточнение границы оксидных, смешанных и сульфидных пр-ний с помощью последовательного анализа содержания меди и данных сканирования керна;
- проведение металлургических испытаний репрезентативных образцов оксидной минерализации;

Edge Copper Corporation *—владеет проектом Zonia Copper в рудном районе Уолнат-Гроув в Аризоне*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ANDINA COPPER CORPORATION - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО БУРЕНИЯ НА МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОМ ПРОЕКТЕ КОБРАСКО, В ЧОКО, КОЛУМБИЯ.

5 ноября 2026 г.

Кобраско — это крупный новый объект медно-порфировых руд, находящееся на ранней стадии оценки. На сегодняшний день пробурено 14 скважин общей протяженностью 11 тыс м, которые позволили выявить большой объем медной минерализации на площади 1300 х 550–700 м. В северо-западной части участка скважина прошла 76 м с содержанием меди 1,00% на глубине 52 м, в том числе 32 м с содержанием меди 1,48% на глубине 60 м, подтвердив распространение неглубокой богатой минерализации (рис. 1).




Рис. 1 Вид сбоку на проект Кобраско, приповерхностная медная минерализация с содержанием более 0,5%.

На глубине до 104 м минерализация продолжается в магматическо-гидротермальной брекчии в виде вкраплений халькопирита и пирита с прожилками молибденита и локальными вкраплениями сфалерита в трещинах, после чего брекчия переходит в кварцевый риолитовый порфир на глубине около 130 м. На глубине от 130 до 200 м содержание меди в риолитовом порфире с вкраплениями халькопирита и пирита с молибденитом в трещинах снижается, что соответствует картине, где медная минерализация в риолитовых порфирах слабее, чем в микродиоритах и магматическо-гидротермальных брекчиях. Примерно с глубины 200 м содержание меди снова увеличивается в зоне разлома и прилегающем риолитовом порфире с вкраплениями халькопирита и борнита, причем борнит частично замещает халькопирит на глубине от 246 до 252 м. На глубине от 264 м содержание меди снижается до менее чем 0,2% в риолитовом порфире со следами вкраплений халькопирита и пирита с молибденитом в кварцевых жилках. Нижняя зона более слабой медной минерализации с халькопиритом и борнитом в виде вкраплений и на трещинах в риолитовом порфире, измененном серицитом, и в связанной с ним зоне разлома залегает на глубине 364 м от поверхности.

Andina Copper Corporation *—владеет двумя крупными проектами в Андском медно-порфировом поясе, который является крупнейшим в мире по добыче меди, в Аргентине и Колумбии, а также перспективным неразбуренным медно-золотым объектом в рудном районе Прибрежных Кордильер в Чили.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

DOMESTIC METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА Cu-Mo ПРОЕКТЕ CRD SMART CREEK, МОНТАНА.

05 ноября 2026 г.

Целью программы является определение границ минерализации типа «замещающие карбонаты» (Carbonate Replacement Deposit, CRD) на участке Голд-Коин - 109,7 м, содержание меди 0,75%, в том числе 89 м с содержанием 0,97%.

Последующее бурение на проекте Смарт-Крик будет направлено на расширение этой зоны и изучение потенциальных связей медно-молибденовых порфировых м-ний с этой минерализацией в районе Смарт-Крик, а также с новыми эпитермальными и порфировыми м-ниями в районах Смарт-Крик, Санрайз и Радио-Тауэр.

В скважинах были обнаружены известковые алевролиты с различной степенью окремнения, карбонатными изменениями, развитием хлорита и эпидота, а также локальным замещением известково-силикатными породами, связанным с медно-цинково-серебряной минерализацией. Минерализация представлена в основном халькопиритсодержащими кварцево-карбонатными жилами, заполненными сульфидами трещинами и зонами замещения, связанными с пиритом, пирротином и местами сфалеритом. Медная минерализация обнаружена у поверхности на глубине 13,5 м и 53,6 м, а также на дополнительных сульфидсодержащих участках на глубине 123,33 м, 152,3 м и 342,65 м. На глубине 342,65 м в окремненном слоистом известковом алевролите обнаружена кварцевая жила со сфалеритом и пирит-халькопиритом по краям, а также,

возможно, с теннантитом. Наблюдаемые комплексы минералов и изменений соответствуют гидротермальной системе, включающей структурно-контролируемые сульфидные жилы и замещение карбонатов, хотя непрерывность и геометрия минерализованных зон еще не установлены. Обширные изменения и различные типы сульфидной минерализации указывают на наличие крупной гидротермальной системы, связанной с замещением карбонатов, которая, вероятно, формировалась на пересечении благоприятных стратиграфических и структурных условий.

Domestic Metals Corp. *— проект охватывает территорию площадью 8 тыс га и расположен в рудном районе Бьютт, где было добыто 24,8 млрд фунтов меди. Смарт-Крик считается перспективным местом для добычи медно-порфировых и медно-золото-серебряных карбонатных руд.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

PACIFIC EMPIRE MINERALS CORP - РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРОЕКТАХ TRIDENT И PINNACLE COPPER-GOLD В КЕСНЕЛЬСКОМ ТЕРРЕЙНЕ НА СЕВЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

5 ноября 2026 г.

Компания пробурила 14 скважин общей протяженностью 4548,5 м: восемь скважин (2410,6 м) на проекте «Трайдент» и шесть скважин (2137,9 м) на проекте «Пиннакл» (рис. 1).




Рис. 1 План бурения на проектах Trident-Pinnacle.

Пробурены: зона A, восточная аномалия IP, восточная брекчия и западная брекчия на проекте «Трайдент», а также южная часть «Пиннакла» - «Пиннакл Аплит». Три участка бурения «Трайдент» выходят за пределы зоны A и центральной порфировой зоны.

Программа позволила взглянуть на Trident и Pinnacle как на одну большую медно-золотую порфировую систему.


Pacific Empire *— компания по разведке м-ний меди и золота владеет проектом площадью 17 тыс га в северо-центральной части Британской Колумбии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

SURGE COPPER CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА BERG COPPER PROJECT В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

6 ноября 2026 года

Программа бурения является частью грр по повышению полноты и качества базы данных о минеральных ресурсах Berg (рис. 1).



а б

Рис. 1. Региональная (а) и локальная (б) схемы проекта (а) с указанием мест бурения.

Полевая программа была направлена на сбор дополнительных геотехнических, гидрогеологических, геохимических и экологических базовых данных для обоснования технико-экономического обоснования, экологической оценки, получения разрешений и долгосрочного планирования проекта. Компания пробурила 31 скважину общей протяженностью 6,3 тыс м.

Surge Copper Corp. *—Бергский медный проект включает пр-ния меди, молибдена, серебра и золота в центральной части Британской Колумбии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

EASTPORT CRITICAL METALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ «МАЦИТАМА» НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ БОТСВАНЫ.

6 ноября 2026 г.

Проект «Мацитама» включает шесть лицензий на ГРР площадью 1845 км^2 на северо-востоке Ботсваны (рис. 1).




Рис. 1 Схема проекта Матситама, аномалии содержания меди в почве и геологические структуры.

В ходе гравиметрической съемки на площади 291 км^2 были обнаружены многочисленные исторические разведочные траншеи протяженностью более 12 км, с которыми связана обширная видимая медная минерализация.

Обнаружена зона медной минерализации шириной 2 м. В образце породы из траншеи обнаружены хризоколла, брошантит, шаттукит, малахит (медные минералы) и самородное золото.

Компания приступила к программе по вскрытию, картированию и отбору образцов из этих траншей.

Медная минерализация представлена хризоколлой — ярко-синим или зеленым водным филлосиликатным минералом, который образуется в зонах окисления м-ний медных руд и здесь связан с шаттукитом и малахитом. Силикаты меди, такие как хризоколла и шаттукит, образуются непосредственно над первичным источником меди и обладают небольшой латеральной

подвижностью. Эти минералы присутствуют в трещинах, жилах и рассеяны в кварцевой матрице, что свидетельствует о минерализации коренных пород.

Компания приступила к реализации программы геофизических исследований, включающей гравиметрическую и электромагнитную разведку, для определения потенциальных объектов ГРР. Визуальные признаки медной минерализации были обнаружены на поверхности в траншеях на той же территории, где проводились геофизические исследования.


Eastport Critical Metals Corp. *— самый перспективный актив компании — медный проект Матситама, дополнительные проекты включают: Selebi East — проект по добыче никеля, меди и кобальта, проект по добыче редкоземельных элементов Semarule, урановый проект Foley; алмазный проект Jwaneng и проект Keng, направленный на добычу никеля, меди и редкоземельных элементов.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

MUNDORO CAPITAL INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДЬ В ПРЕДЕЛАХ МАГМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТИМОК, СЕРБИЯ.

6 ноября 2026 г.

Бурение на четырех участках - пробурено 4,4 тыс м, получены геологические данные, подтверждающие целесообразность продолжения ГРР на участках Скоруса-Ист и Тилва-Рош-Саут (рис. 1).



а б

Рис. 1 - Расположение программ Timok (а) **и** поисковые цели (б).

Проведены магнитометрическая съемка на площади 178 км² с трехмерной моделью удельного электрического сопротивления, а также гравиметрическая съемка с 1131 станцией. Интерпретация данных продолжается.

Повторная геологическая съемка позволила по-новому взглянуть на целевые участки, которые еще не были пробурены. Все семь участков входят в программы Central Timok и Borsko. Готовы к бурению: Borsko Target 1, Tilva Rosh North, Tilva Rosh South, Skorusa West и Skorusa East. На стадии выбора: Skorusa North и Borsko South.

Борско, цель 1: скрытый порфировый комплекс, открытый с юго-востока. Для проверки этой цели предложено пробурить четыре скважины.

Тильва Рош Норт: непроверенное калийное месторождение. Повторное бурение позволяет составить карту внешних зон порфировой системы.

Скроуса Уэст: векторы в направлении порфирового центра. Минерализованные дайки, жилы типа А и калиевые изменения в историческом керне; предложено пробурить три скважины.

Внедрение новых методов геофизики (аудиомагнитотеллурического зондирования и гравиметрии), стандартизированное повторное каротажирование в масштабах района и систематическая переклассификация данных по керну позволили добиться значительных успехов в картировании зон изменений, распределении плотности жил и межминеральных интрузивных фазах. Такой комплексный подход позволил компании не рассматривать аномалии по отдельности, а создавать целостные трехмерные модели пр-ний, благодаря чему были открыты семь месторождений, пять из которых перешли на стадию бурения. Результаты бурения в рамках

программы Central Timok на участках Скоруса-Ист и Тилва-Рош-Саут показали геологические векторы, которые оправдывают проведение дополнительных буровых работ.

Mundoro *— канадская компания, портфель активов которой сосредоточен на добыче меди в двух рудных районах: Западно-Тетийском поясе в Восточной Европе и Ларамийском поясе на юго-западе США.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ALPHAMIN RESOURCES CORP. – ПРОИЗВОДСТВО ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА НА ПРОЕКТЕ BISIE В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО.

09 ноября 2026 г.

Производство до 3600 т олова в год в течение первых двух лет составляет менее 20% от запланированного объема производства Bisie.

Бизи — крупнейший в мире рудник по добыче олова, на котором в настоящее время добывается 20 тыс т олова в год. Рудник Биси станет источником сырья для новых плавильных предприятий NT в США и важным шагом на пути к созданию диверсифицированной глобальной клиентской базы для высококачественного оловянного концентрата, добываемого на Биси.

Alphamin начала активно диверсифицировать свою клиентскую базу и поддерживать развитие западных мощностей по переработке олова. Эта стратегия соответствует целям Pax Silica — инициативы под руководством США, для создания безопасных и устойчивых цепочек поставок важнейших минералов и технологий, необходимых для эпохи искусственного интеллекта. ОАЭ играют признанную роль партнера в рамках Pax Silica, и IRH поддерживает это соглашение.

Alphamin Resources Corp. *— основным активом компании является оловянный проект Биси в Демократической Республике Конго. Биси — крупнейший в мире рудник по добыче первичного олова и один из самых значительных источников олова за пределами Азии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases


TINTINA MINES LIMITED – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ DOS AMIGOS В ЧИЛИ.

9 ноября 2026 г.


Программа бурения, основанная на существующей оценке минеральных ресурсов проекта и предварительной экономической оценке (ПЭО), призвана обеспечить перевод предполагаемых минеральных ресурсов в категорию выявленных в поддержку запланированного технико-экономического обоснования.

Основные показатели: 460 м при 0,50% CuEq2 от глубины 200 м до забоя (0,31% Cu и 0,24 г/т Au).

В настоящее время компания наращивает объемы бурения на проекте, уделяя особое внимание определению границ оруденения и выходу на предполагаемые участки минеральных ресурсов. В настоящее время буровые работы сосредоточены на территории участка Дос-Амигос и вокруг него, где основная часть первичных сульфидных ресурсов находится на площади ~700x500 м (рис. 1).



а



б

Рис. 1 План участка бурения на фоне аэрофотоснимка (а) и. разрез (с видом на север) результатов бурения (б).

На глубине 224 м жилы типа M и A встречаются чаще, при этом визуально увеличилось содержание магнетита и степень калиевых изменений. Содержание халькопирита и пирита менялось до конца бурения и было тесно связано с интенсивностью залегания жил и калиевыми изменениями. Халькоцит был обнаружен в верхней части скважин в составе контактной брекчии в сильно выветренной породе. Содержание меди и золота хорошо согласуется с блоковой моделью, лежащей в основе проекта, и имеет хорошую корреляцию между зонами со средним и высоким содержанием.

Tintina Mines Limited *—реализует проект по добыче меди и золота Dos Amigos в регионе Атакама в Чили*
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

FIREFLY METALS LTD**.** - РАСШИРЯЮТ ЗОНУ VMS НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ GREEN BAY В НЬЮФАУНДЛЕНДЕ И ЛАБРАДОРЕ, КАНАДА.

08 ноября 2026 г.

Бурение расширило зону Core Zone в боковом направлении, выявив глубинную минерализацию за пределами существующей оценки минеральных ресурсов (MRE) и ближе к поверхности.

Исключительные результаты важны, поскольку они указывают на продолжающийся рост в зоне высокосортного оруденения - 18,1 млн т при 4,3% экв по измеренным и прогнозируемым (M & I) ресурсам и 7,0 млн т при 4,4% Экв по предполагаемым минеральным ресурсам. Боковой, направленный вверх характер удлинений означает, что дополнительная минерализация будет легко доступна.

Результаты демонстрируют потенциал увеличения количества дополнительных тонн меди на вертикальный метр, что может еще больше повысить экономическую эффективность ГРР.

Текущий объем MRE в Грин-Бей составляет 60,2 млн т при 2,4% у.е. в категориях M & I с более высокой степенью достоверности плюс еще 23,5 млн т при 2,5% у.е. в предполагаемых минеральных ресурсах. Высокие результаты заполняющего бурения на высокосортных вулканогенных массивных сульфидах (VMS) продолжают демонстрировать потенциал для высокой скорости перевода предполагаемых ресурсов в категории M & I.

Эти результаты будут включены в пересмотренный MRE, который ляжет в основу Окончательного технико-экономического обоснования (DFS) базового варианта - 1,8 млн т в год, изложенного в PEA; MRE и DFS (рис. 1).




Рис. 1 результаты бурения на **Core Zone.**

Высококачественная зона остается открытой как в горизонтальном направлении, так и в глубину, при этом самая глубокая скважина, пробуренная на сегодняшний день, дала результат 49,0 м при 6,1% CuEq**.**

Стратегия развития FireFly по-прежнему направлена на продвижение проекта Green Bay Ming Mine в сторону возобновления крупномасштабных ГРР на медь и золото.

FireFly Metals *Ltd (ASX, TSX: FFM) —специализируются на* ***медно-золотом проекте Грин-Бей*** *в Ньюфаундленде, Канада.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

FPX NICKEL CORP. - ВЫЯВЛЯЕТ ПРИПОВЕРХНОСТНУЮ ЗОНУ ВЫСОКОСОРТНОГО НИКЕЛЯ AWARUITE НА ПРОЕКТЕ ADVOCATE NICKEL В НЬЮФАУНДЛЕНДЕ.

9 ноября 2026 г.

Учитывая высокие результаты, достигнутые на объектах «Бирчи Норт» и «Вулверайн», первоначальная программа бурения была расширена с изначально запланированных 4 тыс м до 5 тыс м.

Цель "Березовый север": значительные перехваты - 279,0 м с содержанием извлекаемого никеля 0,11% ("DTR"), включая 54,0 м с содержанием никеля 0,14% DTR на глубине 29,0 м. Буровые скважины определяют высококачественную никелевую минерализацию awaruite шириной 350 м и глубиной 300 м. Запланированное бурение на мишени Росомахи было расширено и включает девять скважин протяженностью 1,8 тыс м.

Участок Advocate Nickel площадью 237,5 км^2 включает перспективные серпентинизированные ультраосновные породы и офиолитовый комплекс Advocate протяженностью более 45 км. (рис. 1)





Рис. 1. Расположение проекта Advocate Nickel на полуострове Бей-Верте, Ньюфаундленд.

На участке Birchy North Target пробурено восемь скважин общей протяженностью 2,4 тыс м на площади 1250 м в ширину и до 600 м в глубину.

Первые четыре скважины, пробуренные вдоль одного бокового участка в Бирчи-Норт, дали содержание никеля DTR по всей их длине, которое в среднем значительно превышает расчетное пороговое содержание в 0,06% никеля DTR на м-нии FPX Baptiste в Британской Колумбии (указанный ресурс составляет 1,8 тыс т при 0,129% никеля DTR при пороговом значении 0,06%;

Вскрывается северная часть Берчи на протяжении 1250 м и демонстрируется видимая минерализация аваруита на значительных интервалах во всех скважинах (рис. 2).



а б

Рис. 2 План (а) и разрез (б) северного участка Берчи.

Продолжается бурение на мишени «Росомаха», расположенной примерно в 24 км к северо-востоку от мишени «Бирчи Норт». На основании положительной визуальной интерпретации содержания аваруита в первых скважинах запланированная программа на пр-нии Вулверайн была расширена и теперь включает до девяти скважин общей протяженностью 2,8 тыс м. Как показано на рисунке 3, запланированное бурение теперь охватит участок протяженностью около 1,8 км.




Рис. 3 План бурения на пр-нии Вулверайн.

Общее содержание никеля в образцах ультраосновных пород, полученных в результате бурения на Birchy North, составляет от 0,18% до 0,25%. Эти значения соответствуют типичным фоновым значениям содержания никеля в ультраосновных породах, отобранных по всему миру, и не отражают потенциально извлекаемый никель. Высокие показатели извлечения никеля по методу Дэвиса указывают на то, что никель в этих целевых районах в основном содержится в аваруите с достаточно крупными зернами, чтобы их можно было извлечь методом магнитной сепарации.

Компания FPX Nickel Corp. *- занимается разведкой и разработкой проекта Батист-Никель, расположенного в центральной части Британской Колумбии, а также других объектов с таким же уникальным природным минералом — сплавом никеля и железа, известным как аваруит.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CRITICAL ONE ENERGY СООБЩАЕТ - УВЕЛИЧИВАЕТ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ СУРЬМЫ НА ПРОЕКТЕ ОЗЕРА ХАУЭЛЛС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОНТАРИО, КАНАДА.

9 Ноября 2026

Все скважины пересекли залежи сурьмы и золота, расширяя минерализованную систему, для которой компания Micon International Limited определила цель ГРР, измеряемую млн т с содержанием сурьмы в несколько процентов (рис. 1).




Рис. 1 Геологическая карта проекта Хауэллс-Лейк.

Три дополнительные скважины расширяют зону распространения сурьмяных минералов в Восточной зоне на 100 м к северо-западу от ранее обнаруженных участков с высоким содержанием - 4,52 %.

Компания определила цель ГРР на озере Хауэллс — от 2 до 6 млн т с содержанием сурьмы от 3% до 8%, — которую сейчас тестирует программа бурения. Компания планирует пробурить восемь дополнительных скважин в Восточной зоне. Данные бурения подтверждают целесообразность ГРР на Хауэллс-Лейк с целью выявления от 2 до 6 млн т сурьмы с содержанием от 3% до 8%.

Бурение сосредоточено на расширении Восточной зоны в северо-западном направлении, примерно под углом 300°. Бурение подтвердило, что минерализация продолжается в этом направлении по мере того, как вмещающая порода меняется с порфировой на сильно измененные серицитом и кремнеземом вулканические породы, что указывает на то, что минерализованная система не ограничивается порфировой породой. Все три скважины были пробурены на глубину за пределами основной Восточной зоны, что позволило обнаружить дополнительные участки золото-сурьмяной минерализации в графитовых метаосадочных породах и вулканических отложениях. Эти пересечения с залежами золота позволяют компании лучше понять минерализацию к западу от Восточной зоны и под ней и помогут оценить потенциальное включение золота в будущие запасы полезных ископаемых.

Дополнительное бурение было проведено дальше на северо-запад и на большей глубине, где Восточная зона остается открытой. Дополнительные скважины направлены в Восточную зону, причем скважины запланированы на глубине до 400 м под поверхностью.

Critical One Energy Inc. *—развивает флагманский проект по добыче сурьмы и золота в районе озера Хауэллс в Онтарио, Канада,*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

C3 METALS INC. - ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ КХАЛИСИ, ПЕРУ

9 ноября 2026 г.

Завершены расширенная магнитная съемка с помощью дронов и наземная гравиметрическая съемка на площади 1,5 тыс га.

Результаты магнитных и гравиметрических исследований с помощью дронов включают три крупномасштабные совпадающие магнитные и гравитационные аномалии, выявленные на обширной территории проекта Халиси, в том числе крупный новый участок, расположенный в 2 км к северо-востоку от основной скарновой зоны (рис. 1).




Рис. 1 (Слева) Магнитное изображение с дрона, три основные магнитные аномалии, на которые нацелена компания. Они четко ориентированы с северо-востока на юго-запад. (Справа)

Основной скарн в Халиси определяется совпадающими сильными магнитными и гравитационными аномалиями размером 500 х 600 м, которые простираются за пределы участка на северо-восток.

Вторая, значительно более крупная совпадающая магнитная (1500 х 1200 м) и гравитационная (1000 х 900 м) аномалия, расположенная примерно в 2 км к северо-востоку от основного скарнового проекта Халиси. Геологическое картирование подтвердило наличие магнетитового скарна на площади 200 х 150 м и обширного эндоскарна в редких обнажениях. Эта перспективная зона никогда не подвергалась бурению.

Новый перспективный участок был обнаружен к юго-востоку от основного скарнового проекта Халиси, где наблюдается прерывистая, но дискретная совпадающая магнитная и гравитационная аномалия. Этот участок никогда не бурили.

Поперечные срезы трехмерной модели магнитной инверсии A-A' и модели гравитационной инверсии B-B' демонстрируют глубинные магнитные и гравитационные аномалии в главном скарновом месторождении Халиси и на новом перспективном участке к северо-востоку от него.

Бурение в районе крупномасштабной совпадающей магнитной и гравитационной аномалии на главном участке Кхалиси продолжает пересекать обширные зоны интрузивного и скарнового медно-золото-серебряно-молибденового оруденения.

Эти наборы геофизических данных повысят точность определения местоположения оруденения и позволят сосредоточить ресурсы на благоприятных геофизических объектах с совпадающими гидротермальными изменениями на поверхности. Проводится анализ геофизических и геологоразведочных данных перед разработкой следующего этапа бурения.

Компания продолжает раскрывать потенциал района Халиси и более обширной территории, где в ходе картографических и геофизических исследований были выявлены многочисленные пр-ния скарнов и порфиров.

По результатам программы бурения были обнаружены обширные зоны интрузивной и скарновой медно-золото-серебряно-молибденовой минерализации, которые простираются на север, восток и запад. Компания объявила о наиболее продуктивном результате на Халиси - 64,9 млн т меди с содержанием 2,53%, 0,87 г/т золота, 11,6 г/т серебра и 6 ppm молибдена, в том числе 23,3 млн тонн меди с содержанием 4,75%, 1,84 г/т золота, 20,4 г/т серебра и 5 ppm молибдена. Этот результат демонстрирует потенциал для крупномасштабной минерализации в более обширной многокилометровой скарновой системе в Халиси.

Наборы данных о магнитном поле и гравитации повышают способность компании выявлять глубоко залегающие и скрытые скарновые тела, как это было продемонстрировано на примере основного скарнового объекта Халиси. Компания уделяет приоритетное внимание изучению совпадающих гравитационных и магнитных аномалий вдоль минерализованного скарнового и интрузивного комплекса, простирающегося с северо-востока на юго-запад.

CS Metals Inc. *—владеет 31 тыс га в порфирово-скарновом поясе Андауайлас-Яури на юге Перу, где находятся проекты компании Jasperoide и Khaleesi.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ARYA RESOURCES LTD. - ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ НА ПРОЕКТЕ PGE RAMP EAST НА СЕВЕРЕ САСКАЧЕВАНА

Аэро-съемка выявила несколько приоритетных областей электромагнитного реагирования включая мощный проводник, который остается обнаруживаемым в последнем зарегистрированном временном канале. Самая сильная электромагнитная аномалия расположена вдоль тренда Ramp Metals Ranger.

Проект Ramp East расположен в поясе Роттенстоун, где добывают золото, никель, медь и элементы платиновой группы. Результаты исследования побудили Arya добавить дополнительные участки, ориентированные вдоль этого северо-восточного тренда. Компания добавила 11,3 тыс га к своим заявкам в результате недавнего стейкинга, в результате чего общая площадь проекта Ramp East составила 27 тыс га (рис. 1).




Рис. Схема проекта Ramp East.

В ходе съемки HeliTEM были собраны магнитные, электромагнитные во временной области (TDEM) и радиометрические данные с шагом 200 м. Компания in3D Geoscience Inc. собрала, проанализировала, обработала и интерпретировала геофизические данные для проекта Arya.

Анализ включал оценку качества данных, улучшение наборов магнитных и электромагнитных данных, а также интерпретацию проводящих свойств и магнитных линеаментов. Наборы данных были скомпилированы в Geoscience Analyst и Geosoft Oasis montaj с использованием координат WGS84 UTM Zone 13N (EPSG: 32613). Радиометрические данные были импортированы в компиляцию, но не подвергались дальнейшей обработке.

Приоритетные электромагнитные отклики

Ряд аномальных электромагнитных откликов, возникающих в конце процесса, наблюдается в основном в северной части исследуемой территории, при этом самый сильный электромагнитный проводник дает четкий отклик в последнем записанном временном канале. При исследовании использовалась базовая частота 15 Гц, что позволило регистрировать отклики позже, чем при использовании стандартной системы с частотой 30 Гц.

При интерпретации основное внимание уделялось скорости изменения электромагнитного поля (дБ/с) и константе затухания электромагнитного поля (тау). Также выделили пики на отдельных каналах электромагнитного поля с вертикальной составляющей, чтобы сравнить их с магнитными данными. Магнитный анализ линеаментов использовался для выявления тенденций, которые могут помочь в дальнейшей интерпретации и определении приоритетности целей.

Для регионального контекста были включены изображения общедоступных геофизических данных с привязкой к местности, полученные на соседних участках. Различия в цветовом масштабировании изображений не позволяют проводить прямое сравнение. Выявленные электромагнитные отклики являются объектами ГРР и сами по себе не свидетельствуют о наличии минерализации.

Рекомендуемые дальнейшие работы включают наземные исследования с помощью магнитометра с фиксированной петлей для более точной характеристики электромагнитных откликов, полученных с воздуха, и уточнения геометрии цели перед бурением. При проектировании ГРР будут учитываться расположение передатчика, ориентация цели, частота передатчика и пригодность датчиков дб/дт и магнитного поля. Компания также рассматривает возможность проведения дополнительных аэрогеофизических исследований с помощью HeliTEM для сбора магнитных, TDEM и радиометрических данных на недавно приобретенных участках.

Отдельные электромагнитные отклики, полученные на ранних и средних этапах, также могут потребовать тестирования с использованием более мощного передатчика с фиксированной петлей.

Arya Resources Ltd. *—специализируется на исследовании и разработке м-ний в Саскачеване.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

PROSPECTIVA RESOURCES LTD - ИДЕНТИФИЦИРУЕТ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ САН-ФРАНЦИСКО В РУДНОМ ПОЯСЕ БОРБОРЕМА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ БРАЗИЛИИ.

09 ноября 2026 г.

Поверхностные и скважинные электромагнитные исследования выявили дополнительные проводящие объекты, которые, по-видимому, связаны с массивной и полумассивной сульфидной минерализацией. Эти результаты подтверждают правильность текущей программы бурения компании и будут служить ориентиром при проведении дальнейших ГРР на проекте Сан-Франциско.

Основные моменты:

При скважинном электромагнитном исследовании (DHEM) был обнаружен мощный проводник. Моделирование показывает, что источник проводимости может выходить за пределы скважин, что является дополнительным фактором для следующего бурения.

Исследования методом динамического электрохимического зондирования, проведенные в скважинах, выявили новые сильные проводящие реакции, которые могут указывать на новые или потенциальные расширения текущей целевой зоны.

С помощью электромагнитной съемки с фиксированным контуром (Fixed-Loop Electromagnetic, FLEM) были обнаружены две смоделированные проводящие цели на расстоянии 120 и 420 м от разведанного участка SF11 — полиметаллического пр-ния Cu-Pb-Zn-Au, расположенного в 10 км от Сан-Франциско [зона SF1].

Исследования методом динамической электроразведки, проведенные в скважинах, выявили новые сильные проводящие ответные сигналы, которые могут указывать на новые или потенциальные расширения текущей целевой зоны.

В ходе первичного исследования методом электроразведки методом электроразведки с использованием метода прецессии, проведенного компанией Prospectiva, был выявлен ряд проводящих объектов, которые впоследствии были включены в программу бурения.

В ходе дополнительных исследований методом FLEM была выявлена новая электропроводящая аномалия, которая в значительной степени совпадает с исходными геофизическими моделями. Эти результаты дают дополнительную информацию для уточнения интерпретации электропроводящих объектов на территории проекта Сан-Франциско (рис. 1).




Рис. 1. План проекта, распределение смоделированных электромагнитных проводников.

Модели имеют схожую ориентацию и позволяют предположить, что скважины пересеклись с проводником вблизи его края. Эти отклики могут свидетельствовать о наличии одного сложного проводника или близко расположенных проводящих тел, что указывает на потенциальные ответвления, требующие дальнейшего изучения. Дополнительные исследования методом динамического электрохимического зондирования выявили дополнительные проводящие ответвления, что позволило уточнить интерпретацию распределения и геометрии проводящих тел в минерализованной системе Сан-Франциско.

Пр-ние SF11 расположено в 10 км от основного района бурения Сан-Франциско (SF1) и представляет собой крутопадающую или субвертикальную полиметаллическую медно-свинцово-цинково-золотую (Cu-Pb-Zn-Au) минерализацию, залегающую в метаморфизованных сланцах. Оруденение обладает геохимическими характеристиками, сопоставимыми с теми, что наблюдаются на участке SF1, что подчеркивает его потенциал в качестве дополнительной цели для поисков.

Prospectiva Resources Ltd. *—специализируетяся на поисках и разведке м-ний меди и золота в Бразилии и реализует портфель проектов в масштабе района в перспективной, но малоизученной провинции Борборема на северо-востоке Бразилии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

NEW AGE METALS INC. – ПРОБООТБОР В РАМКАХ ЗОЛОТО-СУРЬМЯНОГО ПРОЕКТА SENTINEL, НЬЮФАУНДЛЕНД.

10 ноября 2026 года

Программа направлена на тестирование крупного геофизического проводника вдоль регионального структурного коридора, в котором расположен бывший сурьмяный рудник Бивер-Брук (рис. 1).



Рис. 1 Региональный обзор проектов New Age Metals по добыче сурьмы и золота на Ньюфаундленде,

Основные моменты программы:

- проводится отбор проб базальных отложений на проекте Sentinel, в том числе около 250 проб базальных отложений, предназначенных для изучения геохимии коренных пород под толстым ледниковым покровом на предмет наличия золота и сурьмы;
- проект Sentinel включает 222 участка площадью 5,5 тыс га, расположенных вдоль структурного тренда пр-ния сурьмы Бивер-Брук площадью 19,3 тыс га;
- на проекте расположен крупный проводник TDEM, вдоль регионального структурного тренда Бивер-Брук. Кондуктор представляет собой привлекательную цель для систематического геохимического исследования на наличие золота и сурьмы;
- при отборе проб ледниковых отложений материал собирается непосредственно над поверхностью коренных пород, что делает этот метод хорошо подходящим для обнаружения скрытой минерализации под мощным слоем перекрывающих пород;

Крупный геофизический проводник вдоль минерализованного коридора

Ранее выполненная вертолетная Xcite электромагнитная съемка во временной области (TDEM) и лидарная съемка выявили большой тренд электропроводности на проекте. Компания интерпретирует проводник как занимающий тот же более широкий структурный коридор, что и сурьмяный рудник Beaver Brook, добывавшийся в прошлом, где историческое исследование индуцированной поляризации (I.P.) (Lambert Geosciences Ltd.) выявило удлиненную аномалию заряжаемости вдоль минерализованного тренда. Исследования TDEM и I.P. направлены на изучение различных физических свойств, охватывают разные участки и не проводятся одновременно. Их связь с региональной структурой подтверждает геологическую обоснованность тестирования проекта Sentinel (рис. 2).




Рис. 2 Обзор проекта Sentinel с указанием проводника Xcite TDEM на территории NAM

Отклик геофизических приборов в Бивер-Брук отражает в первую очередь наличие горизонтов графитовых черных сланцев, связанных с плоскостями надвига, а не непосредственно сурьмяную минерализацию. Соответственно, проводник TDEM Sentinel интерпретируется как возможный маркер перспективной структуры, а не как свидетельство наличия минерализации. Текущая программа изучения базальных отложений позволит выявить совпадающие геохимические аномалии Au-Sb и элементов-маркеров и поможет определить приоритетные цели для последующих ГРР.

Важно отметить, что геофизический объект «Сентинел» оценивается исходя из его собственных геологических и геохимических характеристик. Отбор проб базальных отложений компанией направлен на изучение того, есть ли у этого геофизического объекта геохимическая сигнатура золота и сурьмы под ледниковым покровом.

New Age Metals — молодая компания состоит из четырех подразделений: по добыче элементов платиновой *группы (Садбери, Огненное кольцо и Тандер-Бей, Онтарио, а также проект «Генезис» на Аляске), по добыче лития и редких металлов (Манитоба), по добыче золота и сурьмы (Ньюфаундленд) и подразделение по добыче золота и критически важных металлов в горнодобывающих районах Кенора.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

AMERICAN EAGLE GOLD CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ NAK В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

10 ноября 2026 г.

Все девять скважин пересекали протяженные участки минерализации, в том числе 844 м с содержанием 0,30% CuEq, 410 м с содержанием 0,37% CuEq, 711 м с содержанием 0,32% CuEq и 277 м с содержанием 0,41%.

Основные моменты:

- все девять скважин фазы 1 пересекали длинные участки минерализации, подтверждая непрерывность между более ранними скважинами, расширяя минерализацию грунта, который ранее считался слабоминерализованным или неминерализованным, и увеличивая объем на площади 1,7 x 1,5 км;

- 844 м с содержанием 0,30% CuEq на глубине 58 м, в том числе 410 м с содержанием 0,37% CuEq, с борнитом и халькопиритом до конца скважин.

Модель ГРР на втором этапе проста и воспроизводима: следуйте за контактом и бурите глубже.

American Eagle Gold Corp. *- реализует проект медно-золотых порфировых руд в районе Бабин-Порфири в Британской Колумбии*


https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ARRAS MINERALS CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО-ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ ELEMES В КАЗАХСТАНЕ.

10 ноября 2026 года

Расположенный в богатом Бозшаколь-Чингизском металлогеническом поясе, Елемес находится недалеко от крупных региональных м-ний, в том числе от медно-золото-серебряного м-ния Бескауга (~80 км к востоку) и медно-золотого рудника «Бозшаколь» компании KAZ Minerals (~60 км к северо-западу).

С геологической точки зрения, оруденение связано с переслаивающимися вулканическими и осадочными породами, пронизанными многочисленными дайками диорита и монцодиорит-порфирового комплекса. Медно-золотая минерализация встречается в пластовых и штокверковых кварц-халькопиритовых жилах, связанных с этими интрузиями. На территории проекта также были обнаружены эпитермальные жилы с высоким содержанием меди и низким содержанием сульфидов, которые представляют собой дополнительный объект для поисков (рис. 1).



а б в

Рис. 1 **а.** – план бурения по золоту; **б.** – геологическая карта и результаты бурения по меди; **в.** – разрез изменений пород на участках Березецки.

В рамках программы отбора проб почвы на всей территории проекта были выявлены два обширных геохимических тренда Cu-Mo-As: Березский и Аймандаи. В рамках программы бурения на участке Березский была обнаружена медно-золотая минерализация порфирового и эпитермального типа. Было завершено бурение на 10 тыс м и планируется пробурить еще 40 тыс м

Площадь Березски значительно увеличилась, и, что самое важное, результаты бурения на уровне коренных пород (KGK) показывают, что минерализованная зона может быть значительно расширена за пределы текущих границ бурения, возможно, еще на 50–100 %

Arras Minerals Corp *- продвигает портфель медных и золотых активов на северо-востоке Казахстана, включая проект Elemes по разрабртке медно-золотого порфира.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

GUNNISON COPPER CORP. - ПОДТВЕРДИЛА НАЛИЧИЕ ОРУДЕНЕНИЯ МЕДИ, ЦИНКА И СЕРЕБРА НА ПРОЕКТЕ VMS STRONG & HARRIS В ЮЖНОЙ АРИЗОНЕ.

10 ноября 2026 года

Результаты бурения включают обнаружение значительного пересечения массивных сульфидов меди, цинка и серебра на проекте Стронг-энд-Харрис, а также продолжение реализации масштабной программы металлургических испытаний компании. Результаты проекта подтверждают наличие богатой минерализации в ресурсной модели и указывают на дополнительный потенциал богатой минерализации в более широком районе Ганнисон по мере проведения комплексных исследований.

Основные моменты:

- в скважине на глубине 40 футов были обнаружены 5,15% меди, 11,99% цинка и 16,38 г/т серебра (примерно 0,53 унции/т) в более широком минерализованном интервале мощностью 311 футов с содержанием 1,39% меди и 2,29% цинка, что подтверждает наличие зоны с высоким содержанием, представленной в существующей модели ресурсов;
- широкая зона распространения медной минерализации на проекте – на глубине 790,3 фута с содержание меди 0,46%, а на глубине 738,3 фута содержанием меди 0,43%.
- программа бурения - 120 скважин общей протяженностью 138 тыс футов (пробурено 27,9 фута);

В ходе бурения на проекте Стронг-энд-Харрис были обнаружены значительные запасы медно-цинковой минерализации, в том числе массивные сульфидные интервалы с высоким содержанием, что подтверждает наличие высокосортной зоны, представленной в существующей модели оценки ресурсов.

Gunnison Copper Corp. *— флагманский проект имеет основные измеренные и предполагаемые минеральные ресурсы, содержащие 846 млн т руды с общим содержанием меди 0,33%,*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CANTERRA MINERALS CORPORATION – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ LEMARCHANT В РАЙОНЕ БУЧАНС, НЬЮФАУНДЛЕНД.

10 ноября 2026 года

Лемаршан — крупнейший медный проект в центральной части Ньюфаундленда (рис. 1).




Рис. 1 Участки компании Canterra в районе Бучанс, проект Лемаршан в сравнении с другими объектами.

В результате бурения семи скважин на проекте Лемаршан на глубине 18,75 м было обнаружено 5,35% CuEq. После недавно объявленного увеличения объема выявленных минеральных ресурсов на ключевом пр-нии Лундберг на 55% до 26,1 млн т компания Canterra приступает к следующему этапу реализации своей стратегии в отношении демонстрации потенциала дополнительной минерализации с высоким содержанием на прилегающих пр-ниях-сателлитах, что позволит увеличить масштабы и ценность рудного района Бучанс

Основные моменты программа бурения:

- 18,75 м высокосортной полиметаллической минерализации на глубине 238 м, содержащей в среднем 0,61% Cu, 6,00% Zn, 1,45% Pb, 77,2 г/т Ag и 1,72 г\т Au;

- 5,15 м с содержанием 8,83% CuEq из 240,85 м, с содержанием 1,03% Cu, 7,89% Zn, 2,65% Pb, 165,4 г/т Ag и 2,98 г/т Au**;**

- на глубине 190,9 м было обнаружено 13,1 м с содержанием 1,21% CuEq, в том числе 2,10 м с содержанием 3,86% CuEq (0,61% Cu, 3,61% Zn, 0,44% Pb, 26,2 г/т Ag и 1,72 г/т Au). Интервал включает в себя полумассивные сульфиды, подстилаемые сильно измененными кислыми брекчиями с сульфидами в виде штокверков.

Бурение подтверждает непрерывность полиметаллической массивной сульфидной минерализации Лемаршан и выявляет перспективный вмещающий горизонт, который остается открытым по простиранию и на глубине за пределами бурения.

Ожидаются дополнительные результаты**,** в том числе по дополнительным скважинам в Северо-Западной зоне и по более глубоким геофизическим поисковым целям.

Canterra Minerals *— проекты компании включают разработку семи объектов VMS - медь, цинк, свинец, серебро и золото.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ZEB NICKEL CORP. - НАЧИНАЕТ БУРЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА ZEB NICKEL В ПРОВИНЦИИ ЛИМПОПО, ЮЖНАЯ АФРИКА.

10 ноября 2026 г.

Первоначальная программа включает восемь запланированных скважин общей протяженностью 3,8 тыс м, ориентированных на минерализацию элементов платиновой группы (PGE) в Зоне 2 проекта.

Программа разработана для улучшения геологического контроля и проверки непрерывности минерализации Зоны 2.

Цель состоит в том, чтобы собрать дополнительные геологические и аналитические данные для оценки первичных минеральных ресурсов в Зоне 2. Любая оценка будет зависеть от результатов бурения, проверки данных и достаточной геологической и количественной непрерывности, а также от соблюдения других требований Национального стандарта NI 43-101) и применимых стандартов определения запасов полезных ископаемых. Нет никаких гарантий, что в рамках этой программы будут выявлены минеральные ресурсы или доказана экономическая целесообразность.

Расположение, ориентация и конечная глубина скважин могут корректироваться по мере продвижения бурения и внесения геологической информации в модель. Первоначальная программа по Зоне 2 сама по себе не обеспечивает преемственность с другими минерализованными зонами и не позволяет определить источник непроверенных геофизических проводников.

Zeb Nickel Corp *- занимается поисками и разведкой таких металлов как никель, графит, литий, кобальт, марганец, медь и алюминий. В настоящее время компания сосредоточена на развитии своего флагманского проекта Zeb Nickel, расположенного в провинции Лимпопо, Южная Африка. Проект Zeb Nickel расположен в Бушвелдском комплексе в Южной Африке.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

MIDLAND EXPLORATION INC. - ИССЛЕДОВАНИЯ АВИА-ГРАВИТАЦИОННЫМ ГРАДИЕНТОМЕТРОМ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОМ ПРОЕКТЕ LA PELTRIE В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АБИТИБИ, КВЕБЕК.

10 ноября 2026 г.

Воздушная гравитационно-градиентометрическая геофизическая съемка на территории площадью 291 км^2 будет проводиться компанией XCalibur с использованием системы FALCON AGG общей протяженностью 5165 линейных км и охватит весь проект, включая минерализацию меди, золота, серебра и молибдена, выявленную в ходе бурения. В систему включен сбор магнитных данных высокого разрешения. Цель этого исследования — уточнить геологические и

структурные данные по проекту, чтобы лучше понять геологию коренных пород, лежащих в основе важных участков ледниковых отложений. С помощью гравитационного градиентометра можно выявить различия в плотности горных пород и составить карту литологических комплексов на территории проекта.

Это исследование позволит получить дополнительные геологические данные, которые будут использованы для определения новых целей ГРР в районе минерализации Cu-Au-Ag-Mo.

Была завершена программа отбора проб почвы MMI, в рамках которой было отобрано 768 образцов на расстоянии 50-100 м друг от друга и вдоль линий, расположенных на расстоянии 200-400 м друг от друга. Сетка охватывает зону минерализации Cu-Au-Ag-Mo и простирается на север до южного контакта с интрузией Кархейл.

Программа отбора проб почвы позволила успешно определить область минерализации Cu-Au-Ag-Mo, а также предположить ее расширение в западном направлении. Некоторые аномалии коррелируют с аномалиями, выявленными в ходе геофизических исследований и еще не были подтверждены бурением. Кроме того, компания SRK Consulting провела структурный анализ аэромагнитной съемки высокого разрешения, чтобы улучшить структурное и геологическое понимание зоны медной минерализации.

Midland *- нацелена на использование минерального потенциала Квебека для открытия новых м-ний критически важных металлов.*


https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

AMARC RESOURCES LTD. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ МЕДНО-ЗОЛОТОГО ПОРФИРА В РАЙОНЕ ДЬЮК, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.

11 ноября 2026 г.

Район Дьюк площадью 808 км^2 расположен в регионе Бэбин, хорошо минерализованном медно-порфировом поясе Британской Колумбии, где находятся бывшие медно-порфировые рудники Белл и Грэнисл, принадлежавшие компании Noranda Mines, а также разрабатываемое м-ние Моррисон.

Программы ГРР позволили существенно расширить проект Cu-Mo-Au-Ag DUKE до площади 900 х 600 м. Эти программы дополнительно выявили потенциал для поисков медно-порфирового оруденения Cu-Au, при этом были эффективно отсеяны менее перспективные участки (рис. 1).



а **б**

Рис. 1 Схема рудного района Бабин (а) и результате бурения на проекте Дюк (б).

ГРР включали:

- 45 км геофизических исследований методом вызванной поляризации (IP);
- 19 км геофизических исследований методом магнитотеллурического зондирования;
- 235 геохимических проб почвы;
- биогеохимические пробы;
- геохимические пробы газообразной элементарной ртути;
- 400 км^2 поверхностного геологического картирования с помощью лидара для уточнения результатов геохимического отбора проб.

Программа бурения была разработана для проверки ряда пр-ний медно-порфирового типа, выявленных и/или уточненных в ходе геофизических, геохимических и геологических исследований (рис. 2).




Рис. 2 Структурная периодичность вдоль ЮВ трендового магнитного коридора НАК-ДЬЮК.

Объекты, выбранные для бурения, расположены вдоль магнитного коридора НАК-ДЮК, простирающегося в юго-восточном направлении, и характеризуются равномерно расположенными повторяющимися скоплениями магнитных аномалий с интервалом в 6 км. Месторождение Дьюк расположен в 6 км к юго-востоку от перспективного м-ния NAK Cu-Au компании American Eagle

Amarc Resources Ltd. *— продвигает проекты JOY, DUKE и IKE, расположенные в богатых порфирами регионах на севере, в центре и на юге Британской Колумбии,*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases


MINSUD RESOURCES CORP. - БУРЕНИЕ НА ПРОЕКТЕ ЧИТРА-ВЭЛЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ БРЕКЧИЙ - ПОРФИРОВ CU-MO-AU-AG В ПРОВИНЦИИ САН-ХУАН, АРГЕНТИНА.

10 ноября 2026 года

В рамках программы бурения (10,5 тыс м) на проекте Читра-Вэлли выявлены порфировые проявления:

1) полиметаллическое сульфидное Чинчильонес с предполагаемыми ресурсами в 1014 тыс. куб. футов меди в эквиваленте при 0,44% эквивалента меди и предполагаемые ресурсы в размере 2823 тыс. экв. меди при содержании 0,36% эквивалента меди;

2) оксидов Читинского Южного порфирового (ЧСП) с предполагаемыми ресурсами в размере 19 тыс. экв. меди при содержании 0,30% меди и предполагаемыми ресурсами в размере 510 тыс. экв. меди при содержании 0,29% меди (рис. 1).



а б

Рис. 1 Схема аномалий меди на целевых участках (а)
и стратиграфическая колонка с положением минерализации (б).

Бурение вскрыло 696 м сплошной сульфидной минерализации от основания кровли на глубине 50 м до а глубины 746 м. Скважина вскрыла: (1) богатый пиритом филлический ореол и зону высокого сульфидирования (HS) медь-золото-серебро, расположенную в дацитовом порфире (Dac1), (2) зону промежуточного сульфидирования (IS) цинк-свинец-серебро в интрузивной брекчии и дацитовом порфире (Dac2) и (3) зону глубокой высокосортной медно-золотой брекчии HS, которая переходит в богатую молибденом сульфидную минерализацию в отдельной фазе диоритовой интрузии (E_D3). С увеличением глубины оценка повышается.

Проект «Чита-Вэлли» — это крупная порфировая система с широко распространенной медно-золотым и полиметаллическим медно-свинцово-цинковым оруденением. В рамках проекта разрабатываются две открытые ресурсные базы, соответствующие требованиям NI 43-101, включающие полиметаллическое сульфидное пр-ние Чинчильонес и медно-порфировое пр-ние Чита-Саут.

Minsud Resources Corp. *—специализируется на разработке флагманского проекта по добыче меди, молибдена, золота, серебра, свинца и цинка в Читинской долине в провинции Сан-Хуан, Аргентина.*


https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

FITZROY MINERALS INC. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ БУЭН РЕТИРО, ЧИЛИ.

11 ноября 2026 г.

Бурение на Буэн-Ретиро, что в общей сложности составляет 31,2 тыс м. Ожидается, что первая оценка минеральных ресурсов станет основой для запланированной компанией предварительной экономической оценки («PEA»). MRE будет включать в себя измеренные, предполагаемые и выявленные ресурсы на целевых участках Тенорита, Нативо и Ортусар.

Также запланированы еще 3,3 тыс м бурения, которое поможет преобразовать предполагаемые ресурсы в измеренные и индикативные. Бурение направлено на поиск оксидов меди и смешанной медной минерализации на участках Тенорита, Нативо и Ортусар для включения в обновленный отчет о предполагаемых ресурсах и в планируемое предварительное технико-экономическое обоснование («ПТЭО») (рис. 1).



а б

Рис. 1 План (а) и разрезы (б) бурения на проекте Буэн-Ретиро, Копьяпо, Чили.

Результаты бурения подтверждают геологические данные.

Медная минерализация в Тенорите простирается на северо-северо-запад и круто понижается к востоку. Тенорита стабильна по простиранию и остается открытой на юго-восток.

Пр-ние Нативо простирается с севера на юг и имеет субвертикальное залегание. Нативо сливается с Тенoритой на юге и продолжается на север. Медная минерализация как на Тенорите, так и на Нативо сосредоточена в железистых брекчиях шириной около 70 м.

Там, где эти два пр-ния сливаются, присутствует третья железистая брекчия и широкая зона неглубокой медной минерализации. Большая часть минерализации, обнаруженной на этих двух участках, представлена оксидом меди и смешанными минералами (оксидом меди и вторичным выщелачиваемым сульфидом) на глубинах 120–150 м.

Ортусар геологически отличается от Тенориты и Нативо и демонстрирует большую вариативность и сложность. Ортусар простирается на юг до середины исторического карьера Манто-Негро. Преобладающая минерализация в Ортусаре — это рассеянные вкрапления, контролируемые литологией и наклоненные примерно на 30° к северо-западу. Мантос имеют относительно небольшую глубину окисления (60-80 метров), и по мере погружения халькопирит становится преобладающим медным минералом. Структура, ориентированная с севера на юг, характерная для района Нативо, по-видимому, продолжается в районе Ортусар, образуя окисленную часть Ортусара к северу и востоку от исторического карьера Манто-Негро. Кроме того, была выявлена метасоматическая медная минерализация (халькопирит) на контакте диоритовых интрузий.

Fitzroy Minerals *- специализируется на разведке и разработке медных проектов с высоким потенциалом роста в Чили. Два основных медных проекта —Буэн-Ретиро и Кабальос в Чили.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

NORTHWEST COPPER CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ НА МЕДНОМ ПРОЕКТЕ КВАНИКА В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ.

11 ноября 2026 г.

На глубине 61,9 м обнаружен рудный пласт с содержанием меди в эквиваленте 1,01% («CuEq»).

Результаты ГРР указывают на наличие богатой минерализации в 50 м к северу, подтверждают наличие дополнительных минерализованных интервалов у поверхности и на глубине и указывают на возможности потенциального расширения проекта на уч-ке North Pit Extension.

Компания сообщает о результатах бурения семи из 43 скважин, пробуренных на проекте Кваника, общая протяженность которых составила 12,3 тыс м. На рисунке 1 показан план бурения.




Рис. 1 Карта расположения скважин на центральном участке Кваника.

После 39 м вскрышных пород скважина пересекла минерализованный интервал мощностью 65 м, состоящий из измененного калием монцонита от светло-оранжевого до желтовато-коричневого цвета с кварцевыми жилами от плоских до неправильных, протяженностью до 75 м, затем пласт с пропилитовым измененным темно-серо-зеленым и пятнисто-оранжевым калиевым измененным монцонитом, рассеченным жилками ангидрита от плоских до неправильных 93 м, за которыми следует поздняя дайка 96 метров и залегающая тектоническая брекчия 102 м. Последовательность монцодиоритов от оранжевого до темно-зелено-серого цвета и монцонитов от темно-серо-зеленого до бледно-оранжевого цвета продолжается до конца скважины, где встречаются короткие участки минерализации. Сохранение более мощного интервала позволяет расширить участок с юга на 50 м.

Минерализация начинается в зоне разлома и продолжается до 143 м в измененном калием порфировом монцоните светло-серого до оранжевого цвета с неправильной формы кварцевыми прожилками длиной до 152 м. Широкая низкосортная минерализация продолжалась в окремненном и измененном калием желтовато-сером порфировом монцоните до 182 м, включая интенсивный кварцевый штокверковый субинтервал между 167 и 169 м. Другой минерализованный интервал залегает между 190 и 199 м, коррелируется с пластом с повышенным содержанием палладия. Минерализация прерывается поздней дайкой на глубине от 201 до 208 м, а с другой стороны минерализация продолжается до 231 м, простираясь до конца скважины, где заканчивается минерализацией.

NorthWest *— компания, занимающаяся разведкой и разработкой м-ний меди и золота, с портфелем перспективных и находящихся на ранней стадии реализации проектов в Британской Колумбии, включая Kwanika-Stardust, Lorraine-Top Cat и East Niv.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

COPPERNICO METALS INC. - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ СОМБРЕРО В АЯКУЧО, ПЕРУ.

10 ноября 2026 г.

Компания представляет программу бурения, которая включает 20 тыс м бурения на девяти участках. Первоначальное бурение планируется начать на участке Fierrazo (рис. 1).




Рис. 1 Цели проекта «Сомбреро», предполагаемые скважины над магнитными, гравиметрическими и зарядочувствительными максимумами. Целевая область Типиканча выделена лавандовым цветом.

Многоцелевая программа, разработанная для тестирования крупных м-ний, охватывающая 20 тыс м бурения, включает девять объектов в эоценовых медно-золотых скарн-порфировых системах в Каскабамбе (включая Фиеррасо) и Ниоке, а также в более молодой эпитермально-порфировой системе в Типиканче.

Программа включает бурение с расширением на Фиеррасо, в районах Ниок и Типиканча, а также ГРР множества перспективных месторождений, скрытых под тонким слоем вулканического покрова. Программа предназначена для изучения приповерхностной минерализации и перспективных месторождений, скрытых под тонким слоем вулканического покрова.

Второй этап предназначен для изучения основных минерализованных систем, выявленных на проекте Сомбреро, в рамках единой поэтапной программы. Объекты находятся на разных стадиях ГРР. На Фьеррасо уже проводились буровые работы, и там обнаружена медно-золотая минерализация. Планируемое бурение направлено на расширение зоны распространения минерализации и проверку ее целостности. На Ниок и Типиканча на поверхности обнаружена медная минерализация, но бурение там не проводилось. Большинство оставшихся пр-ний залегают под постминеральным покровом и определяются в основном с помощью геофизических

методов и геологического картирования. Полный объем этих перспективных систем еще предстоит определить с помощью бурения.

Программа бурения рассчитана на 20 тыс м. Основные цели:

- расширить и протестировать непрерывность медно-золотого оруденения в Фиерразо, вдоль богатого магнетитом скарнового массива длиной 700 м, из которых пробурено только 200 м в длину, и проверить связанную с этим аномалию глубинной заряжаемости;
- завершить буровые испытания на Nioc и Типиканча, где были взяты пробы минерализации меди на поверхности;
- проведите первичные испытания скрытых целей, определяемых магнитными, гравитационными аномалиями и аномалиями заряжаемости, включая Чумпи-1, Чумпи-2 и Хуачана.;
- провести последующее бурение в Хохоте, Корралесе и Северном Корралесе, основываясь на результатах этапа 1, для уточнения интерпретации интрузивных контактов, изменений и структуры; и
- улучшить трехмерное понимание геологии, изменений и структуры Сомбреро, в том числе за счет использования ориентированного керна бурения, для уточнения дальнейшего определения местоположения и оценки того, насколько эффективно новые геофизические данные могут быть использованы для определения направления минерализации.


Coppernico *—сосредоточена на целевых районах Каскабамба (ранее называвшемся Сомбреро-Майн), Ниок и Типиканча в рамках проекта Sombrero в Перу, который является ее флагманским проектом.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases


WESTERN STAR RESOURCES INC. - МАГНИТНЫЙ БЕСПИЛОТНИК ОТСЛЕЖИВАЕТ СКАРНОВЫЙ ГРАНИТНО-ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КОНТАКТ НА ВОЛЬФРАМОВОМ ПРОЕКТЕ ИГЛ-ПОЙНТ, ШТАТ НЬЮ-МЕКСИКО.

11 ноября 2026 года

В ходе исследования был составлен геологический разрез контакта между интрузивным гранитом и известняком Хоркилла, что позволило с уверенностью определить, где этот контакт проходит под осыпями и поверхностными отложениями. Этот контакт является перспективным горизонтом для вольфрамсодержащей скарновой минерализации. Магнитная интерпретация была интегрирована в трехмерную геологическую модель компании и в программу бурения 17 скважин (рис. 1).



а б



В Г

Рис. 1 а. - Суммарная магнитная индукция по данным магнитной съемки с помощью дрона;
б.- Первая вертикальная производная RTP с интерпретируемым контактом гранита и известняка,
в. - Производная от угла наклона магнитного поля RTP;
г. - Нулевой контур - границы магнитных источников, как контакт гранита и известняка.

Основные моменты:

С помощью дрона была проведена магнитная съемка высокого разрешения на площади около 4,9 км² в южной и западной частях участка Игл-Пойнт.

Широкая дугообразная область с высоким магнитным полем, ограниченная с северо-запада резким перепадом на фоне магнитоспокойной области, предположительно отражает залегание гранита, а магнитоспокойная область соответствует известняку Хоркилла. Градиент между ними интерпретируется как приблизительный контакт гранита и известняка, в которых залегают скарны.

Интерпретируемый контакт прослеживается на 3 км, изгибаясь от северо-восточной части участка на юго-запад через западную часть участка, где он выходит на поверхность под тонким слоем почвы и не может быть нанесен на карту.

Основной скарновый выход, образцы которого находятся на южном конце интерпретируемого контакта, что обеспечивает прямую связь между магнитным каркасом и известной шеелитовой минерализацией.

Программа бурения 17 скважин протяженностью 1,9 тыс м была проведена на предполагаемом контакте. Шесть скважин пробурены на расстоянии 400 м к северо-западу, чтобы исследовать контакт под осыпным покровом.

Результаты анализа 23 образцов будут сопоставлены с магнитными данными и трехмерной моделью для окончательного определения целей бурения.

В Игл-Пойнте были обнаружены скарны, содержащие шеелит, образовавшиеся вдоль контакта между интрузивным гранитом и известняком Хоркилла. Шеелит связан с гранатом, эпидотом и небольшим количеством кварца. Контактный слой круто обрывается под углом 80^0, но большая его часть скрыта под обширным осыпным покровом, поэтому его полную протяженность и геометрию невозможно определить только по результатам поверхностного картографирования. Основной целью съемки с помощью дрона было составление карты этого контакта под покровом растительности.

Магнитные данные показывают широкий дугообразный магнитный максимум, который простирается с востока на запад через северную часть исследуемой территории, изгибается на юго-запад через западную часть участка и продолжается в южной части участка. На северо-западе он ограничен резким магнитным градиентом, примыкающим к области с низким магнитным полем. Область с низким магнитным полем соответствует известняку, расположенному к северу и западу от гранита, а высокий магнитный градиент — граниту и его границе. Компания считает, что градиент соответствует границе между гранитом и известняком.

Согласно этой интерпретации, контакт прослеживается на протяжении 3 км по всей обследованной территории, в том числе в западной части участка, где он выходит на поверхность под тонким слоем почвы. Это напрямую связывает магнитную структуру с известной минерализацией шеелита на территории участка и дает компании основания для изучения контакта за пределами обнаженного скарна.

Данные магнитной интерпретации были включены в трехмерную геомодель Leapfrog, разработанную компанией. Модель поддерживает запланированную программу бурения 17 скважин (1850 м). Скважины предназначены для неглубокого бурения крутопадающего скарнового контакта и расположены вдоль предполагаемого магнитного контакта.

Результаты будут сопоставлены с интерпретацией магнитных данных, геологического картирования и трехмерной модели для окончательного определения целей бурения. Картирование и отбор проб будут продолжены на северо-западе вдоль предполагаемого контакта, в том числе в траншеях.

Western Star Resources *— компания развивает портфель вольфрамовых проектов в Неваде и Нью-Мексико, в том числе вольфрамовый проект Игл-Пойнт в Нью-Мексико и вольфрамовые проекты Роуленд и Уайт-Стар в Неваде, а также продолжает ГРР на Вестерн Стар в Британской Колумбии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

AMARC RESOURCES LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ ДЖОЙ НА СЕВЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

12 ноября 2026 г.

Проведено геологическое картирование территории площадью 45 км^2.

Были отобраны 967 образцов почвы, 358 образцов щебня, 102 образца мелкообломочных пород и 125 образцов ила при геохимических поисках.


Также были пройдены 64 погонных км геофизических исследований методом вызванной поляризации (IP). В рамках ГРР были расширены известные и выявлены новые крупные сульфидные системы вдоль формирующегося 12-км тренда AuRORA, простирающегося с востока на северо-восток. Тренд включает группу медно-порфировых сульфидных систем, которые еще предстоит разведать.

В ходе ГРР вдоль тренда AuRORA:

Расширили первоначальную систему сульфидов NWG на 4,5 км^2, в которой находится пр-ние AuRORA Au-Cu, на восток на территорию, которая в настоящее время занимает 7 км^2 и которая еще не прошла полное бурение.

Обнаружена новая сульфидная система протяженностью 4,5 км^2, названная ROE Target, примыкающая к востоку от расширенной сульфидной системы NWG.

Расширена сульфидная система УАЙТ-ПАСС, в которой находится историческое м-ние Бренда Au-Cu, с 3,0 км^2 до 5,0 км^2 (рис. 1).



а б

Рис. 1 Крупномасштабные минеральные системы проекта Джой (а) и сульфидные системы NWG, ROE, WHITE PASS и NUB, а вдоль тренда Аврора (б).

Расширена система NUB sulphide, в которой потенциально могут находиться несколько центров порфиров, и где в ходе ГРР и первоначального разведочного бурения в предыдущие годы было обнаружено наличие изменений в стиле обогащенного золотом, медью и серебром порфира в скважинах scout drill

На проекте Джой находится богатое металлами золото-медное пр-ние Аврора. Оно может стать ключом к развитию не только этого района, но и всего региона Тудоггон. В районе Джой также находится множество других перспективных пр-ний. Проект Дьюк расположен в рудном районе Бэбин, одном из самых богатых медно-золотых порфировых поясов Британской Колумбии (рис. 2).



Рис. 2 Тренд AuRORA на проекте Джой простирается на 12 км к востоку-северо-востоку.

Компания Amarc только начала раскрывать потенциал трех своих районов и повышать акционерную стоимость за счет хорошо финансируемых ГРР, ориентированных на открытие новых м-ний

Amarc Resources Ltd. - *продвигает проекты JOY, DUKE и IKE, расположенные в богатых порфирами регионах северной, центральной и южной частей Британской Колумбии*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

VISIONARY METALS CORP**.** - ПРОГРАММА ГРР НА МЕДНО-ЗОЛОТОМ ПРОЕКТЕ SLIPSTREAM, В ОКРУГЕ БОКС-ЭЛДЕР, ШТАТ ЮТА,

12 ноября 2026 г.

Проект Slipstream включает перспективные участки в коридоре протяженностью 37 км в северо-восточном направлении, содержащего медно-золотую минерализацию, связанную с порфирами, а также проксимальные скарны и дистальные свинцово-цинково-серебряные пр-ния с замещением карбонатами (CRD), сосредоточенные вокруг порфировой интрузии гранодиорита в рудном районе Лусин на северном Пилотном хребте.

Были обнаружены пр-ния меди и золота в выходящих на поверхность кварц-полевошпатовых порфировых дайках северо-северо-восточного простирания и прилегающих параллельных кварц-сульфидных жилах.

Петрографические исследования образцов, собранных вокруг западного тела гранодиоритов, подтверждают наличие признаков, характерных для медно-порфировой системы.

Был взят образец сильно окремненного, серицитизированного и минерализованного кварц-полевошпатового порфира (QFP) для тонкого среза, содержащий 0,85 г/т Au, 89,19 г/т Ag и 0,31% Cu. Дайка расположена на краю западного тела гранодиоритов. Подобные измененные дайки QFP часто встречаются над медно-порфировыми системами или внутри них по всему миру. Считается, что они представляют собой источник тепла и флюидов, которые приводят в движение такие системы. В ходе дальнейшихГРР была обнаружена еще одна близлежащая область измененного кварцевого полевого шпата с вкраплениями черного халькозина, что было подтверждено качественным рентгенофлуоресцентным анализом (ожидается количественный многоэлементный лабораторный анализ).

Медная минерализация обнаружена в интрузивных, скарновых и промежуточных сульфидных жилах. Полированные шлифы подтверждают классическую супергенную последовательность: халькопирит замещается борнитом и окаймляется халькозином.

Компания приступила к структурному картированию, чтобы лучше понять относительную хронологию до-и постминерализации разломов, и планирует провести магнитную съемку с помощью дронов и лидарную съемку с высоким разрешением на участке площадью 50 км^2.

Петрографические результаты и важные наблюдения, касающиеся порфирового потенциала:

- гранодиорит богат кварцем, содержит плагиоклаз с осциллирующей зональностью (щелочной полевой шпат с выделениями альбита, биотит и магнетит). Такая текстура указывает на глубинное плутоническое внедрение. Метаморфизм слабо пропилитный (серицит после полевых шпатов, хлорит после биотита). Само основное интрузивное тело не имеет выраженной минерализации. Однако оно пространственно связано с краевыми скарнами, дайками кварц-полевошпатовых руд и минерализацией цветных и драгоценных металлов. Оно рассматривается как потенциальный источник более молодых порфировых даек и порфировых гидротермальных флюидов, содержащих медь.

- в доломитах и известняках наблюдается мраморизация и скарнирование с образованием коричневого граната и пироксена. Коричневый цвет граната и наличие пироксена интерпретируются как признаки близости к источнику тепла и флюидов. В нескольких образцах наблюдается ретроградное изменение (пироксен превращается в серпентин ± доломит; карбонат замещает гранат). Также присутствует следовое количество гидротермального биотита.

- сильно измененные кварц-полевошпатовые порфиры демонстрируют интенсивное окремнение основной массы и замещение ортоклазовых вкрапленников серицитом, что характерно для филлитовых изменений (рис. 1).




Фото 1 Микрофотография образца кварц-полевошпатового порфира.

- медная минерализация встречается в кварц-полевошпатовых порфирах, промежуточных кварцевых сульфидных жилах и структурно-напряженных кварцевых жилах. На полированных тонких срезах видна классическая супергенная последовательность: халькопирит (Cp) замещается борнитом (Bn) и окаймляется халькозитом (Cc) в гетитовых корочках.

Петрографические наблюдения в совокупности подтверждают интерпретацию медно-порфировой системы, сосредоточенной в западном гранодиорите или связанной с ним, с развитием скарнов в непосредственной близости от пр-ния, даек кварцевого полевого шпата с филлитовыми изменениями и более раннего золотоносного кварцевого жильного пр-ния.

Компания проводит дополнительное структурное картирование западного участка, чтобы лучше определить относительную хронологию и ориентацию до- и постминерализованных разломов. Эта работа призвана улучшить понимание факторов, влияющих на формирование ранних золотоносных кварцевых жил и более поздних изменений и минерализации, связанных с порфирами.

Компания также приступит к магнитному и лидарному сканированию участка с помощью дронов с высоким разрешением и шагом съемки 50 м. Исследование направлено на выявление возможных скрытых интрузий, зон интенсивной скарновой метаморфизации, структурных

особенностей, а также на определение приоритетных участков с более интенсивными метаморфическими процессами или потенциальных центров порфировых пр-ний для последующего бурения.

Visionary Metals Corp. *— развивает два проекта по добыче сульфидов никеля и меди на территории площадью 40 км² в Гранитных горах штата Вайоминг; а также медно-золото-серебряного порфирового пр-ния Слипстрим в штате Юта.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

TALON METALS CORP. - РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР НА НИКЕЛЕВО-МЕДНО-КОБАЛЬТОВОМ ПРОЕКТЕ ТАМАРАК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МИННЕСОТЕ.

11 ноября 2026 г.

Результаты включают в себя самый мощный на сегодняшний день минерализованный интервал 138-й зоны, а также дополнительные участки с высоким содержанием полезных ископаемых и геофизические данные, полученные в ходе ГРР вблизи зоны Вэлт.

Основные моменты

- в скважине на глубине 162,37 метра была обнаружена минерализация — самый мощный интервал в зоне 138 на сегодняшний день;

- при бурении в 50 метрах к востоку от ранее обнаруженной минерализации на глубине 778 м были обнаружены узкие жилы с высоким содержанием сульфидов (Massive Sulphide Unit, "MSU"), которые по составу схожи с минерализацией зоны Свода. Последующее скважинное электромагнитное исследование ("BHEM") выявило аномалию вне скважины, которая была протестирована при бурении;

- дополнительные минерализованные пересечения в буровых скважинах предоставляют дополнительную информацию о степени минерализации на этих уровнях;

- узкое, высокосортное пересечение минерализации MSU и Смешанной массивной сульфидной единицы ("MMS") в буровой скважине дает дополнительное представление о взаимосвязи между ранее зарегистрированными минерализованными пересечениями в зоне свода.

Зона 138 расположена над зоной «Хранилище» и состоит из прослоек рассеянных и сетчатых сульфидных минералов, залегающих в перидотите и полевошпатовом перидотите. Поверхностное бурение в зоне хранилища продолжает пересекать вышележащую зону 138, что позволяет получить дополнительные геологические данные из этой области (рис. 1).




Рис. 1 На изображении показаны выбранные примечательные интервалы геологического анализа.

Зона хранилища была выявлена после бурения под ресурсной зоной Тамарак. Буровая скважина пересекла два интервала MSU и MMS, начинающихся на отметках 762,34 м и 795,16 м, с общим содержанием 34,9 м 14,86% Ni, 15,37% Cu, 0,11% Co, 24,96 г/ т Pt+ Pd и 9,18 г/ т Au (28,88% NiEc или 57,76% CuEq).

Talon продолжает оценивать результаты бурения, анализа и геофизических данных по мере продвижения работ в зоне Vault.

Talon *— компания занимается разработкой никель-медных м-ний в США, в том числе проектом Eagle Mine а проектом по добыче никеля, меди и кобальта в Тамараке в центральной Миннесоте.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

SAMA RESOURCES INC. - БУРЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ И РАСШИРЯЕТ ПРИПОВЕРХНОСТНУЮ НИКЕЛЬ-МЕДНУЮ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ НА НИКЕЛЬ-МЕДНОМ ПРОЕКТЕ SAMAPLEU-GRATA В КОТ-Д'ИВУАРЕ, ЗАПАДНАЯ АФРИКА.

12 ноября 2026 г.

Результаты продолжают демонстрировать ресурсный потенциал никель-медного проекта Samapleu-Grata в Кот-д'Ивуаре в районном масштабе.

Основные моменты программы ГРР в Еплеу:

- в Еплеу пробурено 26 скважин общей протяженностью 2 тыс м для проведения первичной оценки запасов полезных ископаемых

- получены результаты анализа 14 скважин, в том числе: 36,15 м, 1,04% CuEq или 0,88% NiQ (0,40% Ni, 0,24% Cu, 0,02% Co, 0,43 г/т Pd, 0,21 г/т Pt, 0,23 г/т Au) с глубины 11,00 м, а также 56,60 м, 0,57% CuEq или 0,48% NiQ (0,25% Ni, 0,14% Cu, 0,01% Co, 0,19 г/т Pd, 0,09 г/т Pt, 0,08 г/т Au) с глубины 11,15 м.

Результаты подтверждают наличие широкой и неглубокой никель-медной минерализации в Еплеу с сопутствующими палладием, платиной и золотом. Еплеу находится примерно в 25 км к югу от пр-ний, оцененных в ходе предварительной экономической оценки, что делает его потенциальным дополнительным центром роста ресурсной базы в регионе.

В рамках программы ГРР было пробурено 4,5 тыс м в 32 скважинах: 26 скважин для определения границ залежей на участке Еплеу, пять скважин для региональных поисков и одна скважина на участке Самаплеу. Параллельно с этим была проведена гравиметрическая съемка приоритетных электромагнитных объектов для уточнения их местоположения и планирования дальнейших исследований. Приповерхностная полиметаллическая минерализация по своим характеристикам сопоставима с минерализацией на месторождении Самаплеу-Майн, хотя для определения его размеров, непрерывности и потенциальной экономической значимости необходимы дальнейшее бурение и моделирование ресурсов. Программа ГРР подтвердила непрерывность минерализации между удаленными друг от друга историческими скважинами и расширила зону минерализации в нескольких направлениях. Минерализация остается открытой для дальнейшего расширения в нескольких направлениях (рис. 1).




Рис. 1. Карта полиметаллического медно-никелевого месторождения Самаплеу-Грата с указанием зоны PEA, результатов бурения, данных аэроэлектромагнитной разведки, минерализованных зон и результатов бурения

На м-нии Еплеу пробурено 26 скважин общей протяженностью 2 тыс м для подготовки первоначальной оценки минеральных ресурсов с упором на приповерхностную и полиметаллическую минерализацию крупнотоннажного типа.

Программа из 26 скважин была разработана для улучшения охвата бурением юго-восточной части Еплеу и тестирования минерализованного тренда, простирающегося на 500 м к юго-востоку. Бурение позволит провести геологическое моделирование и оценить ресурсный потенциал м-ния.

Sama Resources Inc. *—ориентированана на разработке медно-никелевого проекта Самапле в Кот-д'Ивуаре, Западная Африка.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

НЕРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

BRUTUS MINING INC. - ПРИОБРЕТЕТ ВОДОРОДНЫЙ ПРОЕКТ BAY OF ISLANDS В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НЬЮФАУНДЛЕНДА.

5 ноября 2026 г.

Проект включает три участка общей площадью 83,5 км^2 и считается перспективным с точки зрения добычи природного водорода.

В районе залива Бей-оф-Айлендс находится крупный серпентинитовый ультраосновной комплекс, расположенный рядом с задокументированными структурами и разломами, которые считаются благоприятными для залегания природного водорода»

В ходе исторических исследований м-ний нефти и газа в районах Литтл-Порт, Боттл-Коув, Трампет-Коув и Чимни-Коув были обнаружены выходы битума, пиробитума и следовые количества нефти и битума, а также углеводородные пятна — все это является положительными факторами для поисков природного водорода (рис. 1).




Рис. 1. Водородный проект в заливе Островов — региональная геологическая карта западного Ньюфаундленда.

Атлантическая Канада становится весьма перспективным регионом для поисков м-ний водорода. В западной части Ньюфаундленда в последнее время наблюдается рост числа проектов, таких как проект Ophiolite-X компании First Atlantic Nickel и проект Lewis Hills Hydrogen Claims компании Luma Hydrogen, которые расположены в непосредственной близости от проекта Brutus Bay of Islands и в геологически схожих с ним районах.

В исследовании, посвященных оценке природного водородного потенциала в Квебеке, отмечается, что «потенциал природного водорода в южной части Квебека не обязательно ограничивается этими районами».

Основные области интересов: 1) офиолитовые комплексы, аналогичные комплексу залива Островов в Ньюфаундленде, где взяты пробы сильнощелочных и сильновосстановительных источников воды, содержащих растворенный водород.

Аналогичным образом, высказывается предположение, что офиолиты комплекса Бей-оф-Айлендс (где расположен проект Ophiolite-X компании First Atlantic Nickel) и прибрежного комплекса (где расположен проект Brutus Bay of Islands) сформировались в главном океаническом

бассейне (то есть в раннепалеозойском океане Япетус) вдоль центра спрединга морского дна и трансформного разлома между хребтами соответственно.

Дальнейшая оценка проекта будет проведена с использованием общедоступных геонаучных данных и структурной интерпретации, что приведет к предлагаемому исследованию почвенных газов и сейсмическому картированию.

Brutus Mining Inc. *(CSE: BRU) (FSE: ZI3) — флагманским активом компании является CW Copper Project — медно-золотой проект площадью 2,9 тыс га, расположенный в 100 км к северу от Камлупса, Британская Колумбия,*
https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

РАДИОАКТИВНЫЕ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ТЕМЫ:

Недропользование, МСБ, ГРР, описание месторождений, технологии освоения и переработки, инвестпроекты.

FORTUNE BAY CORP. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА УРАНОВЫХ ПРОЕКТАХ «МУРМАК» И «СТРАЙК» НА СЕВЕРЕ САСКАЧЕВАНА.

3 ноября 2026 г.

В рамках программы было пробурено 24 скважины общей протяженностью 4,5 тыс м, в которых были обнаружены благоприятные графитовые вмещающие породы, разломы и гидротермальные изменения, а также радиоактивность на уровне 300 cps и выше в шести скважинах, в том числе на неглубоких участках, начинающихся на глубине 22,5 м (рис. 1).




Рис. План бурения на проектах «Мурмак» и «Страйк».

В шести скважинах была зафиксирована радиоактивность на уровне 300 имп/мин и выше. При бурении были обнаружены графитовые вмещающие породы, хрупкие структуры и гидротермальные изменения, что позволяет продолжить оценку пр-ний урана.

Сильно графитовые блоки с предполагаемой истинной мощностью до 25 м, контактирующие с более подходящими кварцитом или гранитом. Эти контрастирующие типы горных пород могут обеспечить благоприятные структурные параметры.

Хрупкие разломы и брекчирование внутри или вблизи графитовых образований, обычно связанные с гидротермальными изменениями, включая гематит, хлорит, сульфиды и глины.

Из всех зон с радиоактивностью выше 300 имп/мин были систематически взяты образцы керна и отправлены в геоаналитическую лабораторию SRC в Саскатуне для анализа U_3O_8 и определения многоэлементного состава. Компания сопоставит эти результаты с подробными геологическими данными, чтобы определить приоритетные цели для дальнейшего изучения и оценить дополнительные региональные цели для будущего бурения.

Fortune Bay Corp. *(TSXV:FOR; FWB:5QN; OTCQB:FTBYF) —владеет золото-медным проектом Пома-Роса в штате Чьяпас, Мексика, а также портфелем урановых проектов в бассейне Атабаска в Саскачеване.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ISOENERGY LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР В РАМКАХ LAROCQUE EAST PROJECT НА ТЕРРИТОРИИ М-НИЯ HURRICANE В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА АТАБАСКА.

5 ноября 2026 г.

Результаты подтверждают наличие высокосортной урановой минерализации в нескольких скважинах вдоль южного тренда «Урагана», как в южной части м-ния, так и вдоль простирания

на восток, в том числе в 500 м за пределами м-ния. Анализ содержания урана подтверждает результаты измерения радиоактивности с помощью спектрометра RS-125.

На урановом месторождении Ураган имеется 48,6 млн фунтов U_3O_8 с содержанием U_3O_8 34,5 % и 2,7 млн фунтов U_3O_8 с содержанием U_3O_8 2,2 %. Проект характеризуется относительно небольшой глубиной залегания минерализации — около 325 м, что способствует эффективной разведке и возможности разработки в будущем. М-ние расположено на Ларокском рудном поле — важной региональной структуре, где также находятся другие известные м-ния с высоким содержанием полезных ископаемых, в том числе на совместном предприятии Cameco и Orano — Dawn Lake.

Бурение позволило обнаружить оруденение урана с высоким содержанием металла к востоку от Харрикейна - за пределами существующей площади м-ния в зонах разломов

Более высокие показатели содержания урана были обнаружены в ранее интерпретированной низкосортной зоне - 3,53% U_3O_8 на глубине 3,0 м или 5,02% U_3O_8 на глубине 2,0 м, в том числе 10,8% U_3O_8 на глубине 0,5 м в зоне разлома L в южной части м-ния.

Урановая минерализация подтверждена в 18 из 26 буровых скважин на участке протяженностью 550 м в зоне разлома Харрикейн-Саут (рис. 1)




Рис. 1 План результатов бурения на проекте Larocque East.

Структуры, выступающие на восток в районе Урагана, сгруппированы в три направления: северное направление (незначительные безымянные разломы к северу от м-ния), Главное направление (разломы H и I) и Южное направление (разломы J, K и L).

Целевая область разлома Уэст-Л была в центре программы бурения. Буровые скважины были пробурены для изучения участков с высокой радиоактивностью в зоне разлома L. Эта перспективная структура интерпретируется как зона разлома, а не как отдельный сквозной разлом, в западной целевой области были пробурены скважины для исследования всей ширины структурной зоны (рис. 1). В нижних 150 м песчаника преобладает спектральная минералогия иллита, а в нижних пяти метрах песчаника в большинстве скважин преобладает смесь иллита и хлорита.

Многие из пробуренных скважин показали оптимальное расположение цели, где результаты коррелируют со значительным повышением радиоактивности. Бурение было направлено на расширение запасов м-ния Харрикейн. Было пробурено 26 скважин. Все буровые работы были сосредоточены на южном русле Харрикейн. В пределах южного русла были пробурены шесть скважин в разломах J и K и восемнадцать скважин в разломе L к востоку от м-ния. В ходе бурения была исследована разломная зона L в пределах существующего м-ния и расширена зона повышенной радиоактивности, связанная с минерализацией - 4,21 % U_3O_8 на глубине 3,5 м, в том числе до 11,6% U_3O_8 на глубине 1,0 м на 11 м к западу. В восемнадцати из двадцати шести скважин уровень радиоактивности превышал 350 имп/мин в среднем на протяжении 0,5 м. Недавно полученные результаты анализа на содержание урана во всех восемнадцати скважинах подтверждают, что радиоактивные интервалы в этих скважинах соответствуют значительно повышенному содержанию урана в геохимии.

Геолого-геофизическая информация, собранная в ходе бурения 43 скважин объединяется с уже имеющимися данными по мере обновления геологической интерпретации района Харрикейн

IsoEnergy Ltd. *- продвигает свой проект Larocque East в канадском бассейне Атабаска, где находится м-ние Харрикейн с самыми богатыми в мире запасами урана.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

STANDARD URANIUM LTD. – РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ДЭВИДСОН, БАССЕЙН АТАБАСКА.

05 ноября 2026 г.

Результаты бурения удваивают ширину коридора Thunderbird, пересекают изменения дравита и глины. Детальное каротажирование и структурное моделирование программы на участке протяженностью 6, 7 тыс м позволили удвоить смоделированную ширину структурного коридора Тандерберд и выявить изменения дравит-глинистых пород в зонах Уорриор, Бронко и Тандерберд (рис. 1).




Рис. 1. **а.** - Обзор флагманского проекта «Ривер Дэвидсон»; **б.** - Геологическая карта проекта; **в.** - поисковые геофизические критерии; **г.** - 3D-модели блоков плотности на участках Warrior, Bronco и Thunderbird.

Графитовые зоны сдвиговых деформаций, пересекаемые в пяти скважинах, смоделированы как 10 наложенных друг на друга круто падающих сдвигов, образующих структурный коридор шириной 450 м на протяжении 2,8 км.

Скважины, пробуренные на новых участках, более чем в два раза увеличили известную горизонтальную ширину высокоперспективных графитовых зон сдвиговых деформаций, подобных тем, в которых в регионе сосредоточена богатая урановая минерализация.

Зарегистрировано более 300 м сдвиговых зон, разломов и брекчий с критической хрупкой реактивацией, включая графитовый катаклазит, брекчированный разлом и гидравлические брекчии.

Каолинитовые и гематитовые изменения, сосредоточенные вдоль структур, с дравитом, обнаруженны в пяти скважинах по всем исследуемым направлениям. Богатый магнием гидротермальный хлорит, возможно, судоит, обнаружен вдоль направления Тандерберд.

Аномальная радиоактивность наблюдается в деформированных пегматитовых породах и заполненных гематитом трещинах, прилегающих к зонам хрупко-реактивированных графитовых сдвигов. Сюда входят ранее заявленные показатели до 1650 циклов в секунду для Bronco и 320 циклов в секунду для Thunderbird.

После завершения программы был проведен детальный анализ всех образцов керна и обновленаа структурная модель пробуренных пластов.

Основные наблюдения и выводы по результатам бурения:

- в пяти скважинах была исследована формация Тандерберд на участке протяженностью 2,8 км. Измерения с помощью ориентированного керна показывают, что зоны сдвига простираются с северо-северо-запада на юго-юго-запад и круто наклонены в юго-западном направлении. Зарегистрированные графитовые разломы образуют 10 наложенных друг на друга сдвигов, формирующих глубоко залегающий структурный коридор шириной 450 м в зоне несогласия. Коридор остается открытым на северо-восток в северной части, по падению и простиранию. Отдельные пересечения включают в себя зону хрупко-пластичного графитового сдвига шириной 19 м (на глубине от 306,8 до 325,6 м) и зону графитового сдвига шириной 10 м (от 420,4 до 430,6 м);

- буровые скважины пересекли зоны графитовых сдвигов и разломов, которые определяют структурный коридор Бронко шириной от 250 до 400 м, протянувшийся на 1,3 км. Структуры вдоль разлома Бронко наклонены в западно-юго-западном направлении под углом от умеренного до крутого;

- две скважины пересекают зоны разломов и сдвигов, в том числе 5,3-м брекчию разлома с локальными катаклазитами и умеренными или сильными изменениями глинистых пород (от 474,95 до 480,25 м) и зону хрупко-реактивированного графитового разлома (от 253,0 до 256,4 м). Оба буровых ствола пересекли дравит и многочисленные иллит-каолинитовые глинистые отложения;

- зоны пластического графитового сдвига по всем трем пробуренным направлениям перекрываются хрупкими структурами, в том числе графитовым катаклазитом, брекчией, образованной трещинами, и гидравлической брекчией, а также поздними кварцево-карбонатными жилами;

- хлорит, глина, гематит и силикатные породы сосредоточены внутри структур и рядом с ними. Спектральный анализ выявил дравит с сопутствующими глинистыми изменениями (иллит и/или каолинит) в пяти скважинах по всем трем направлениям, в том числе в заполнении трещин с преобладанием дравита на глубине 222,6 м. Эти комплексы имеют большое значение, поскольку они обнаружены в ореолах изменений в отложениях, связанных с фундаментом, вдоль коридора озера Паттерсон. В пластах на глубине более 300 м под поверхностью несогласия наблюдается обогащение каолинитом. Хлорит, богатый магнием, наиболее распространен в пласте Тандерберд;

- аномальная радиоактивность тесно связана со структурной деформацией. В образцах показания до 1650 имп/мин на глубине от 464,0 до 466,0 м наблюдаются в брекчированных пегматитовых породах с вкраплениями пирита, карбонатными прожилками и гематитовыми изменениями, примерно в 5 м над зоной хрупко-реактивированного графитового сдвига и протомилонитом. 320 циклов в секунду на участке от 356,3 до 356,4 м ограничены трещинами, заполненными гематитом, с видимым смещением в центральной зоне сдвига Тандерберд. Пегматит с вязкостью до 570 сПз залегает на глубине от 493 до 493,5 м, между зоной трещин с графитовым покрытием (от 486,2 до 489,7 м) и зоной хрупко-реактивированного графитового сдвига (от 499,95 до 501,55 м), со слабыми хлоритовыми, глинистыми и карбонатными изменениями и вкраплениями пирита (гидротермальный гематит — важный минерал-индикатор в урановых проектах Атабаски).

Результаты будут сопоставлены со структурной моделью, данными каротажа изменений и геофизических исследований, чтобы определить приоритетные цели для дальнейших ГРР в коридорах Тандерберд и Бронко, в структурах, содержащих дравит, в районе Уорриор-Тренд, а также на более чем 60 км неисследованных проводящих участков в рамках проекта.

Standard Uranium *— проект на реке Дэвидсон в юго-западной части бассейна Атабаска, провинция Саскачеван, площадью 30,7 тыс га.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

CATALYST ONE EXPLORATION CORP. - ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕКТА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ BC REE PROPERTY, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ.

5 ноября 2026 г.

Проект состоит из восьми смежных участков недр площадью 6,2 тыс га, в 85 км к северо-востоку от Принс-Джорджа, Британская Колумбия (рис. 1).




Рис. 1 Положение проектов Wicheeda Rare Earths компании BC REE Property and Defense Metals Corp.

На проектах ведутся ГРР на редкоземельные элементы и ниобий. В основании территории лежат осадочные породы верхнего кембрия — нижнего ордовика группы Кечика, состоящие из алевролитов, известняков, мрамора, аргиллитов и известковых пород, которые прорваны интрузивным комплексом Вичида. Это те же породы, что и на месторождении Вичида. Пласты простираются под углом от 120° до 140° и круто наклонены на северо-восток и юго-запад.

На проекте была завершена программа ГРР, состоящая из детальной магнитной и радиометрической съемки с вертолета, а также отбора проб почвы и горных пород. В ходе обследования был выявлен ряд геофизических объектов, которые могут представлять собой интрузии карбонатита.

Всего было собрано 36 образцов почвы. Образец почвы, взятый с геофизического объекта T1, показал самые высокие значения программы - 0,869% общего содержания оксидов редкоземельных элементов ("TREO") и 478 частей на миллион ниобия. Два образца породы показали фоновые значения.

Рекомендуемые последующие работы включают повторный отбор проб на участках для подтверждения воспроизводимости результатов, исследование фрагментов горных пород в покрывающих породах, ручную выемку грунта для обнажения коренных пород в этом месте и отбор проб почвы на дополнительных геофизических объектах.

Catalyst One Exploration Corp. *—занимается ГРР в рудном районе Уокер-Лейн в штате Невада. Владеет проектом Palmetto Gold, площадью 2,2 тыс акров, в округе Эсмеральда, штат Невада.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

SCOTIA METALS CORP. - НАЧИНАЕТ ПРОГРАММУ БУРЕНИЯ НА ПРОЕКТЕ ACADIA LITHIUM, НА ЮГО-ЗАПАДЕ НОВОЙ ШОТЛАНДИИ.

9 ноября 2026 г.

Это первая прямая проверка компанией наличия лития в коренных породах, который был обнаружен в сподуменовых валунах на поверхности.

Первоначальная программа включает бурение 1000 м (рис. 1).




Рис. 1 Скопление валунов хребта Сподумен у цели Green Wolf.

На пр-нии Грин-Вулф начато бурение шести скважин общей протяженностью 1000 м с трех буровых площадок.

Первая цель - гребень с северо-востока на юго-запад в верхней части скопления валунов хребта Сподумен, где (1) череда валунов, несущих сподумен, резко обрывается на гребне хребта; (2) интерпретируемый ледниковый поток с севера на северо-северо-запад на юг-юго-восток приводит к тому, что валуны поднимаются вверх по гребню; (3) большие вертикальные валуны, выровненные с гребнем, интерпретируются как возможное обнажение; и (4) недавно завершенная наземная радиометрическая съемка показала совпадающую аномалию вдоль того же гребня. хребта.

На территории Грин-Вулф площадью 3 х 1 км были обнаружены пять скоплений валунов из сподуменовых пегматитов. Содержание лития в образцах достигало 3,40% Li_2O. В пределах кластера было отобрано 38 валунов (25 новых): 20 с содержанием более 1,0% Li_2O и три с содержанием более 2,0% Li_2O, максимум 2,72% Li_2O.

Целевой хребет имеет аналогичную ориентацию (северо-восток-юго—запад) и приблизительную ширину северной дамбы на близлежащем м-нии пегматита озера Бразилия, единственном известном м-нии сподумена в регионе.

На Грин-Вулф уже ведутся работы по детальному отбору проб и наземной геофизике (радиометрия и георадарное зондирование), ожидаются полные результаты и новые цели бурения.

В ходе исследований на Грин-Вулф были обнаружены пять цепочек валунов, содержащих сподумен, на участке площадью 3 х 1 км. Отбор проб показал содержание Li_2O до 3,40%. В ходе детальных исследований количество обнаруженных валунов в одном приоритетном кластере, известном как Сподуменовый хребет, увеличилось с 13 до 38, включая 25 новых валунов. В результате отбора проб из всех 38 валунов было получено 20 образцов с содержанием Li_2O выше 1,0%, в том числе три образца с содержанием Li_2O выше 2,0%.

Концентрация крупных угловатых, относительно не выветренных сподуменовых валунов была основным показателем ГРР компании на Грин-Вулф и послужила основанием как для поиска близлежащего коренного источника, так и для решения о начале бурения. Последующее геологическое картирование и наземная геофизика позволят уточнить первоначальные цели последующего бурения.

Первоначальные цели бурения, выбранные компанией, основаны на четырех геологических и геофизических наблюдениях, которые в совокупности указывают на потенциальный источник валунов Грин-Вулф в близлежащих коренных породах.

1. *Резкое прекращение движения валунов*. Скопление валунов резко обрывается у гребня хребта, простирающегося с северо-востока на юго-запад. Исходя из предполагаемого направления движения ледника с северо-северо-запада на юго-юго-восток, компания считает, что хребет может быть источником, из которого были перенесены валуны.

2. *В этом районе ледник переносил валуны на небольшие расстояния*. На близлежащем мнии Брейзил-Лейк были обнаружены сподуменовые валуны на расстоянии от 50 м до 1 км от коренной породы, что подтверждает гипотезу о том, что источник «Грин Вулф» находится недалеко от валунов.

3. *Возможное обнажение*. Крупные вертикально стоящие валуны, ориентированные с северо-востока на юго-запад, были обнаружены недалеко от хребта и могут представлять собой выходы коренных пород, хотя это пока не подтверждено.

4. *Совпадение с радиометрической аномалией*. Наземная радиометрическая съемка по линиям восток-запад с интервалом в 25 м выявила повышенные радиометрические показатели, совпадающие с расположением хребта. Эти показатели могут быть связаны как с гранодиоритом, так и с пегматитом, но их совпадение с окончанием валунов и предполагаемым выходом породы на поверхность является дополнительным аргументом в пользу бурения.

Программа была разработана для проверки геологической интерпретации, полученной в результате картирования поверхности, отбора образцов валунов, топографического анализа и наземной радиометрической съемки. Планируется пробурить шесть скважин общей протяженностью 1000 метров на трех буровых площадках.

Основные цели:

- определить, присутствует ли сподуменовый пегматит в коренных породах под выявленными скоплениями валунов или рядом с ними;
- проверить геологические и геофизические характеристики хребта, простирающегося с северо-востока на юго-запад;
- выяснить, являются ли вертикально стоящие валуны обнажениями коренных пород (выходами на поверхность), связанными с пегматитовой системой;
- собрать геологическую информацию для оценки потенциальной ориентации, мощности и непрерывности любых пересекаемых пегматитовых тел, чтобы ориентироваться при последующих исследованиях.

Результаты бурения будут использованы для уточнения геологической интерпретации и определения объема дополнительного бурения на Грин-Вульф.


Scotia Metals Corp. *(CSE: SMET) — специализирующаяся на приобретении и развитии проектов по добыче лития. Ее основной актив —проект Acadia Lithium (ранее известном как проект L3 Lithium) на юго-западе Новой Шотландии, Канада*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases


APEX CRITICAL METALS CORP. - РАСШИРЯЕТ ЗОНУ TRINITY НА RZM ПРОЕКТЕ RIFT, ШТАТ НЕБРАСКА, США.

10 ноября 2026 г.

Проект Rift расположен в карбонатитовом комплексе Элк-Крик на юго-востоке штата Небраска, США (рис. 1).



а



б

Рис. 1 План бурения на проекте «Рифт» (а) **и** разрез результатов бурения зоныТринити (б).

Компания продолжает расширять минерализованную зону Тринити вдоль двух основных направлений бурения еще на 100 м к северо-западу

Минерализация зоны Тринити теперь прослеживается на протяжении 600 м по простиранию с севера на юг и ~500 м по падению на запад в пределах целевого коридора протяженностью 700 м и остается открытой во всех направлениях. Во всех скважинах были обнаружены широкие интервалы с содержанием РЗЭ более 2,0%, что свидетельствует о том, что мощность и содержание оруденения в зоне сохраняются по мере ее погружения на запад и простирания на северо-запад. Это свидетельствуют о высоком потенциале дальнейшего расширения зоны Тринити.

Кроме того, в результате этих перехватов была выявлена минерализация зоны Тринити протяженностью примерно 600 м в направлении с севера на юг и примерно 500 м в западном направлении по падению пласта в пределах целевого коридора протяженностью более 700 м.

Компания планирует предоставить первую оценку минеральных ресурсов проекта Rift.

Apex Critical Metals Corp. *—специализируется на разработке РЗЭ и ниобия. Флагманский проект компании Rift расположен в карбонатитовом комплексе Элк-Крик в штате Небраска, США.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

RARE EARTHS AMERICAS, INC. - РАСШИРЯЕТ RZM МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА HOMER В ЩЕЛОЧНОЙ ПРОВИНЦИИ ГОЯС В БРАЗИЛИИ.

11 ноября 2026 г.

Компания объявила о результатах анализа восьми новых скважин на проекте Homer, на трех участках — Homer-A, Homer-B и Homer-C.

Вдоль юго-восточной границы комплекса была обнаружена самая высокая доля тяжелых редкоземельных оксидов («HREO»), найденных на сегодняшний день. Оксиды диспрозия и тербия («DyTb») составляют до 8,7% от общего количества редкоземельных оксидов плюс скандий («TREO + Sc») в отдельных образцах. Скважины в этом районе показали повышенное содержание HREO и DyTb, что указывает на формирующуюся зону обогащения тяжелыми редкоземельными элементами вдоль юго-восточной окраины, которая остается открытой для дальнейшего бурения.

Важно отметить, что пробы были взяты только из 22 из 180 запланированных скважин — это примерно 12%. Ожидается получение результатов по более чем 100 скважинам.

Площадь минерализованной зоны увеличилась более чем на 60% и продолжает расширяться: в результате бурения была обнаружена редкоземельная минерализация на площади 3,5 км². Сейчас зона простирается на 4,3 км в длину, что примерно в два раза больше, чем 2,1 км и на 1,7 км в ширину, что составляет всего 10% от магнитной аномалии площадью 35 км², о которых сообщалось ранее. Из 20 скважин, пробуренных в основной целевой зоне, на сегодняшний день получены пробы из 19 скважин, пересекающих минерализованные участки. Бурение еще не определило границы зоны, и компания считает, что она остается открытой для дальнейшего расширения во всех направлениях.

Существенная разница между завершенным бурением и полученными результатами анализов позволяет получить значительный объем дополнительной геологической информации, пока REA продолжает оценивать масштабы, целостность и распределение редкоземельных элементов в системе Homer-A.

В ходе последнего бурения были обнаружены повышенные концентрации DyTb в нескольких минерализованных интервалах, в том числе на глубине 8 м при концентрации 2173 ppm TREO + Sc, содержащей 6.1% DyTb и 5 метров при 3370 ppm TREO + Sc, содержащих 5,1% DyTb. В отдельных образцах длиной 1 м содержание DyTb достигало 562 ppm, или 8,7% от TREO + Sc, по сравнению с максимальным показателем в 347 ppm, или 5,7%.

Все восемь новых скважин пересекли зоны редкоземельной минерализации, которые начинались на глубине всего 12 метров от поверхности. Новая зона имела мощность 12 м и содержала 2405 ppm TREO + Sc, в том числе 6 метров с содержанием 3103 ppm, а в другой скважине — 9 м с содержанием 2350 ppm, в том числе 3 м с содержанием 4110 ppm. Вдоль юго-

восточной окраины самые высокие уровни совпадают с самым высоким содержанием HREO, с интервалами в 4402 ppm TREO + Sc при 71,3% HREO и 5335 ppm при 69,0% HREO, а отдельные образцы в 1 метр достигают 6746 ppm TREO + Sc.

Скважина, пробуренная примерно в 270 м к юго-востоку от ниобий-танталовой зоны, пересекает ниобий-танталовую минерализацию, в отдельных образцах содержится до 1230 ppm оксида ниобия (NB_2o_5) и 72 ppm оксида тантала (Ta_2o_5). Их совпадение с редкоземельными элементами может дать возможность оценить их как потенциальные побочные продукты в будущих технических исследованиях.

С учетом ожидаемых анализов более чем на 100 дополнительных скважинах, REA ожидает значительных результатов, поскольку бурение продолжает определять масштаб, непрерывность и распределение редкоземельных элементов в системе Homer-A.

Самые удаленные друг от друга минерализованные скважины расположены на расстоянии 4,3 км друг от друга в направлении с северо-запада на юго-восток, что примерно в два раза больше, чем 2,1 км, о которых сообщалось ранее, и 1,7 км в направлении с северо-востока на юго-запад. Из 20 скважин, пробуренных в пределах первичной геохимической аномалии, по результатам анализа которых на сегодняшний день получены данные, в 19 скважинах была обнаружена минерализация выше границы выклинивания, и компания считает, что зона остается открытой для дальнейшего расширения.

В нескольких скважинах, пробуренных вдоль юго-восточной окраины щелочного комплекса, наблюдается заметное увеличение доли тяжелых редкоземельных элементов. В многочисленных минерализованных интервалах в этом секторе содержание тяжелых редкоземельных элементов превышает 30% от общего содержания редкоземельных элементов и скандия, а в зонах с самым высоким содержанием тяжелых редкоземельных элементов этот показатель превышает 50%, при этом содержание диспрозия и тербия в отдельных образцах достигает 8,7% от общего содержания редкоземельных элементов и скандия. Компания изучает геологические факторы, влияющие на обогащение, по мере продолжения бурения.

Rare Earths Americas, Inc. *— компания, занимающаяся ГРР и продвижением портфеля проектов по добыче важнейших полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов, в США и Бразилии.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ASARIAN ENERGY LIMITED - ПРОГРАММА БУРЕНИЯ НА УРАНОВОМ ПР-НИИ НАМИБПЛААС НА ПРОЕКТЕ NORASA В НАМИБИИ.

11 ноября 2026 г.

Программа разработана для поддержки обновленной оценки минеральных ресурсов (MRE) проекта «Нораса» и оценки возможности перевода части минеральных ресурсов Намибплааса из категории предполагаемых в категорию подтвержденных.

Новые данные геохимического анализа дополнят исторические данные гамма-каротажа, что позволит уточнить оценку ресурсов и поддержать потенциальную реклассификацию части существующих предполагаемых минеральных ресурсов в категорию выявленных.

Программа бурения реализуется и является первым этапом переориентированной инициативы по опережающим ГРР на пр-нии Намибплаас. Ее основная цель — повысить достоверность имеющихся данных о минеральных ресурсах за счет дополнительного бурения с отбором проб и систематического геохимического анализа. Ожидается, что дополнительные геохимические данные, полученные в ходе текущей буровой кампании, обеспечат более полную основу для оценки содержания урана, тоннажа и характеристик минерализации, что позволит уточнить существующие геологические модели и модели оценки ресурсов. Пр-ние Намибплаас по-прежнему относится к категории предполагаемых. Текущее бурение призвано устранить эти ограничения в получении данных и собрать дополнительную геологическую и аналитическую информацию, необходимую для потенциального повышения статуса части существующего оруденения до категории «подлежащие разработке», в зависимости от результатов и применимых критериев классификации ресурсов (рис. 1).




Рис. 1 Положение пр-ния Намибплаас в 3 км к СВ от м-ния Валенсия.

Планируется пробурить 17 скважин, расположенных параллельно существующей схеме бурения, с азимутом 305^0 и углом наклона 60^0. Скважины предназначены для вскрытия минерализации на глубине до 250 м от поверхности. В каждой пробуренной скважине будет проведен гамма-каротаж, отбор проб для геохимического анализа и исследование траектории скважины.

Ключевыми целями программы являются поддержка пересмотра и уточнения существующего MRE Norasa, повышение достоверности характеристик минерализации урана в пределах проекта и создание более прочной технической основы для будущих ГРР и потенциального расширения минеральных ресурсов проекта Norasa.

Asarian Energy *— цель стать глобальным производителем урана, сосредоточившись на развитии проекта Norasa, в Намибии, Африка.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

NIOBIUMX MINING INC. - РЕЗУЛЬТАТЫ НАЗЕМНОЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ НА НИОБИЕВОМ ПРОЕКТЕ ШИПШОУ, В КВЕБЕКЕ.

11 ноября 2026 г.

Геология и минерализация соседнего рудника Ниобек не обязательно указывают на наличие минерализации в Шипшоу. Радиометрические результаты носят предварительный характер и сами по себе не подтверждают наличие ниобиевой минерализации на территории.

Радиометрические методы позволяют измерить естественное гамма-излучение приповерхностных горных пород и почвы, источником которого в основном являются калий, уран и торий. Эти методы являются признанным инструментом разведки в районе Сент-Оноре.

Была проведена наземная радиометрическая съемка девяти основных участков площадью 514 га[3]. В ходе съемки были выявлены две радиометрические популяции, средняя активность которых составляет от 60 до 80 и от 100 до 120 импульсов в секунду, что свидетельствует о двух различных типах горных пород. Кластеры с низкоамплитудными показаниями были отмечены как зоны, представляющие интерес для дальнейшего изучения. [3]

Карбонатитовые и щелочные системы обычно богаты торием и калием, а соседнее м-ние Ниобек было обнаружено в ходе аэро-радиометрической съёмки время разведки урановых месторождений.

Во время исследования не было обнаружено обнажений: основные участки залегают под перекрывающими породами, что ограничивает возможности наземной съмки. Аэро-магнитная съемка позволяет заглянуть под эти покровы, поэтому следующим шагом станет аэро- магнитная и радиометрическая съемки (магниторадиометрическая) всего участка с высоким разрешением.

Историческое бурение выявило карбонатитовый комплекс Сент-Оноре.

После завершения наземной радиометрической съемки компания приступит к аэромагнитной и радиометрической съемке высокого разрешения, которая охватит весь участок

площадью 2,7 тыс га, состоящий из 48 заявок, и позволит определить и ранжировать цели для бурения.

Карбонатитовая интрузия Шипшоу — одна из пяти карбонатитовых интрузий в зоне Васванипи-Сагеней. Участок расположен в зоне низкой магнитной аномалии — геофизического признака, характерного для этих систем, — выявленной в ходе магнитной съемки с борта самолета.

NiobiumX Mining Inc*. (CSE: NIOX) (OTCQB: NIOXF) (FRA: O7D0) - специализируется на добыче ниобия, в Северной Америке, продвигая проект Shipshaw, площадью около 27 тыс га в регионе Сагеней в Квебеке, характеризующийся скоплением карбонатитовых и лампрофировых даек.*

https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ ГРР

ТЕМЫ:

Научно-методические основы, технологии, методы и методики, технические средства, прогнозно-поисковые комплексы

SEEQUENT EXPLORATION INC. - ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕДР.

3 ноября 2026 г.

Seequent, дочерняя компания Bentley Systems (NASDAQ: BSY), приобрела Eliis, компанию, разрабатывающую программное обеспечение для интерпретации сейсмических данных, чтобы улучшить понимание процессов, происходящих в недрах Земли.

Программное обеспечение Eliis включает в себя платформу для интерпретации сейсмических данных PaleoScan с запатентованной технологией относительного геологического времени и системами на основе искусственного интеллекта. По словам представителей Seequent, программное обеспечение Eliis дополняет их собственный портфель решений для изучения недр, в том числе инструмент неявного моделирования Leapfrog Geo.

Сочетание опыта Eliis в области сейсморазведки с дополнительными геолого-геофизическими технологиями и технологиями изучения пласта ускорит реализацию планов по превращению в ведущую платформу в области технологий изучения недр.

Помимо программного обеспечения, к Seequent присоединится глобальная команда Eliis, состоящая из более чем 100 геологов, технических специалистов и исследователей.

Грэм Грант, генеральный директор Seequent, говорит, что проблемы, связанные с энергетическим переходом и критически важными ресурсами, повышают потребность в более глубоком изучении недр. Для горнодобывающих компаний интерпретация сейсмических данных помогает снизить геологическую неопределенность и обнаружить более глубокие залежи полезных ископаемых.

https://www.canadianminingjournal.com/news/seequent-buys-eliis-to-boost

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ САСКАЧЕВАНА И КОМПАНИЯ HITACHI СОТРУДНИЧАЮТ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИЗА МИНЕРАЛОВ.

5 ноября 2026 г.

Исследовательский совет Саскачевана (SRC) в партнерстве с компанией Hitachi (TYO: 6501) разработал TracePoint — полностью автоматизированный комплекс услуг для поиска ценных минералов.

Рабочий процесс TracePointTM от SRC включает в себя двухлучевой анализатор, который сочетает в себе микрорентгенофлуоресцентный анализ и сканирующую электронную микроскопию с энергодисперсионной спектроскопией.

SRC сотрудничал с техническим подразделением Hitachi Canada в разработке специализированных приборов, программного обеспечения для анализа и интерпретации данных. По словам представителей совета, эта технология является первой в своем роде и предлагает услуги, которых нет больше нигде в мире.

«Объединив опыт и инновации всей группы Hitachi, в том числе передовые решения в области автоматизации, аналитические технологии и анализ данных на основе искусственного интеллекта, смогли создать первую в мире автоматизированную минералогическую платформу, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и точность», — сказал Чад Острандер, президент Hitachi Canada.

Традиционный анализ индикаторных минералов предполагает изучение образцов вручную, часто с помощью микроскопов, для выявления минеральных зерен. Этот анализ используется горнодобывающими компаниями для принятия решений о геологоразведке.

Система включает в себя автоматизированную машину для подготовки образцов минералов и двухлучевой прибор для анализа минералов, который сочетает в себе микрорентгенофлуоресцентный анализ (XRF) и сканирующую электронную микроскопию (SEM)

с энергодисперсионной спектроскопией (EDS). Сочетание этих технологий позволяет получать большие массивы минералогических данных, которые, по словам SRC, можно улучшить с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Подготовка образцов, на которую у самого опытного специалиста ушла бы целая неделя, теперь может быть выполнена за считаные часы», — сказал Майк Крэбтри, президент и генеральный директор SRC.

По словам представителей SRC, для горнодобывающих компаний это означает, что они могут получить больше информации из образцов отложений, чем раньше.

Эта технология значительно повышает вероятность обнаружения м-ний важнейших полезных ископаемых, предоставляя компаниям доступ к информации, которой у них раньше не было. Использование этой технологии для обработки архивных образцов может открыть новые возможности для поисков новых м-ний.

https://www.canadianminingjournal.com/news/sask-research-council-hitachi-partner

FULCRUM METALS PLC - ТЕХНОЛОГИИ EXTRAKT PROCESS SOLUTIONS ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ RZM НА ПРОЕКТЕ ТЕК- ХЬЮЗ В КИРКЛЕНД-ЛЕЙК, ОНТАРИО.

10 ноября 2026 г.,

Технологии Extrakt Process Solutions демонстрируют извлечение трех важных и стратегических минералов, а именно рубидия, стронция и скандия, в рамках своего проекта Teck-Hughes Tailings. Успешное извлечение трех дополнительных критически важных и стратегических полезных ископаемых расширила спектр металлов, добываемых в ходе испытаний на руднике Тек-Хьюз, до шести, включая золото, серебро и теллур.

Неоптимизированное тестирование с упором на критические минералы позволило сохранить сопоставимые показатели извлечения драгоценных металлов, продемонстрировав при этом высокую степень извлечения дополнительных металлов, включая медь, кобальт, никель и марганец, что еще раз подчеркивает широкие возможности технологии компании Extrakt и расширяет потенциальное применение автономной пилотной платформы Fulcrum в различных проектах.

Основные моменты

Новая технология извлечения важнейших минералов: 74,5% стронция, 52,5% рубидия и 47,8% скандия по результатам предварительных двухэтапных лабораторных испытаний.

Чувствительность драгоценных металлов сохраняется при сопоставимом измельчении: 62,4% золота, 85,4% серебра и 91,1% теллура при толщине 80-60 мкм.

Дальнейший рост добычи: новая программа не была оптимизирована; в ходе предыдущей фазы 3 было достигнуто извлечение 78% золота, 95% серебра и 96% теллура.

Расширенные возможности пилотного проекта: оптимизация производства нескольких металлов и последующее извлечение продукта расширяют потенциальное применение автономного пилотного проекта Fulcrum.

Потенциал портфеля: Проект компании Fulcrum по добыче золота из хвостов обогащения содержит сопоставимые показатели по содержанию нескольких важнейших минералов, что подтверждается собственными металлургическими исследованиями.

Новое исследование показало, что на руднике Тек-Хьюз можно добывать еще три критически важных минерала, что открывает новые возможности для получения прибыли наряду с золотом, серебром и теллуром.

Fulcrum Metals plc *(AIM: FMET) (OTCQB:FULMF) — технологическая компания, занимающаяся добычей природных ресурсов, которая разрабатывает масштабируемую платформу для извлечения драгоценных и критически важных металлов на отработанных шахтных рудниках и поддерживает потенциальное восстановление старых шахт.*

https://www.mining.com/press-release?id=6af41768aa83b36e47397fe7